


سيكولوجية الطفل الرافض للمدرسة

الأستاذ الدكتور
رياض نايل العاصمي
أستاذ العلاج النفسي بجامعة دمشق
كلية التربية






للتشر والتوزيع



MOHAMAD KHATAB



للنشر والتوزيع




MOHAMAD KHATAB



MOHAMED KHATAB



MOHAMED KHATAB



للنشر والتوزيع



MOHAMAD KHATAB



للنشر والتوزيع



MOHAMAD KHATAB



MOHAMED KHATAB

**سيكولوجية الطفل
الرافض للمدرسة**



MOHAMAD KHATAB



MOHAMED KHATAB

سيكولوجية الطفل

الرافض للمدرسة

تأليف

الأستاذ الدكتور

رياض نايل العاصمي

أستاذ العلاج النفسي بجامعة دمشق
كلية التربية

الطبعة الأولى

ـ 1436 هـ - 2015

دار الأستاذ العظيم
للتشریف والتوزیع

MOHAMAD KHATAB



رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (1444/3/1444)

155.412

العاصمي، رياض نايل

سيكولوجية الطفل الرافض للمدرسة / رياض نايل العاصمي . - عمان:

دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، 2014

(ص)

ر.ا : 2014/3/1444

الواصفات: /سيكولوجية الطفولة//المدرسة/

* يتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف
عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

جميع حقوق الطبع محفوظة

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو
نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خططي مسبق من الناشر
عمان – الأردن

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher .

الطبعة العربية الأولى

٢٠١٥- ١٤٣٦ هـ



الأردن - عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين

مجمع التسهيون التجاري

هاتف: +96264646208 ، فاكس: +96264646470

الأردن - عمان - شارع الحمام - شارع المكتبة - مقابل كلية القدس

هاتف: +96265713907 ، فاكس: +96265713907

جوال: 00962 - 797896091

info@al-esar.com - www.al-esar.com


ISBN 978-9957-586-37-9 (دمعك)

MOHAMAD KHATAB

MOHAMAD KHATAB

المحتويات

الصفحة	الموضوع
9	المقدمة
الفصل الأول	
مخاوف الأطفال وتطورها	
15	مخاوف الأطفال.....
19	تعريف الخوف والخوف المرضي.....
23	الفرق بين الخوف والخوف المرضي.....
25	العلاقة بين الخوف والقلق.....
30	مخاوف الأطفال وتطورها.....
الفصل الثاني	
مفهوم الخوف المرضي من المدرسة	
38	مفهوم الخوف المرضي من المدرسة.....
45	البداية والانتشار.....
49	الأشكال التصنيفية للخوف من المدرسة.....
57	علاقة الخوف المرضي من المدرسة بالمفاهيم الأخرى.....
57	التمييز بين الخوف المدرسي والهروب منها.....
64	الخوف من المدرسة وقلق الانفصال.....
74	الوضع الاجتماعي والخوف من المدرسة.....
76	ترتيب الولادة والخوف من المدرسة.....
77	الفارق بين الجنسين.....
الفصل الثالث	
أعراض الخوف المرضي من المدرسة	
85	الأعراض الرئيسية للخوف من المدرسة.....
86	الأعراض المصاحبة للخوف من المدرسة.....



الصفحة	الموضوع
86	1. الاكتئاب.....
88	2. ضعف التحصيل الدراسي.....
91	3. الخجل والانطواء.....
الفصل الرابع	
أسباب الخوف المرضي من المدرسة	
96	أسباب خاصة بالطفل.....
98	أسباب تتعلق بالأسرة.....
100	أسباب تتعلق بالمدرسة.....
105	أسباب وراثية وبيولوجية.....
الفصل الخامس	
النظريات المقترنة	
للخوف المرضي من المدرسة	
112	نظرية التحليل النفسي.....
121	نظرية قلق الانفصام.....
132	النظرية السلوكية.....
139	نظرية المرحلتين (الخوف والتجنب).....
140	نظرية اذمات.....
الفصل السادس	
الخوف المدرسي	
"التشفير والتقبو"	
147	أولاً: تشخيص الخوف المرضي من المدرسة.....
176	ثانياً: تطور ومال الخوف من المدرسة.....



الفصل السادس**العلاج النفسي****لخوف الأطفال من المدرسة**

181	الдинاميات النفسية في علاج الخوف المرضي من المدرسة.....
184	العلاج في نظرية التحليل النفسي.....
191	العلاج في النظرية السلوكية.....
217	العلاج القائم على المهارات الاجتماعية.....
	العلاج القائم على المزاوجة بين تقنيات الإشراط الكلاسيكي
218	والإجرائي.....
229	العلاج المعرفي.....
231	العلاج الدوائي.....
233	العلاج من خلال الإقامة في المستشفى.....
234	العلاج الأسري.....

الفصل الثامن**قضايا تشخيصية وعلجية**

239	قضايا تشخيصية وعلجية.....
-----	---------------------------

الملاحق**"أدوات تشخيصية وتطبيقية"**

259	سجل للخوف من المدرسة.....
271	استمارة مقابلة إكلينيكية خاصة بالطفل.....
275	استمارة مقابلة إكلينيكية خاصة بالآلام.....
284	مقاييس الخوف المرضي من المدرسة.....

قائمة المراجع

289	أولاً: المراجع العربية.....
294	ثانياً: المراجع الأجنبية.....



MOHAMED KHATAB

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب

إن من يتتبع اهتمام دول العالم المتحضر بالأطفال والطفولة يدرك تمام الإدراك مدى فهم هذه الدول لما تقدّمه من خدمات وأعمال في هذا المجال على المستوى النفسي والاجتماعي والأكاديمي؛ وذلك بغية تهيئة مناخ نفسي سليم وآمن يتحقق ما تتطلع إليه هذه المجتمعات من نمو أفضل للأطفالها، انطلاقاً من المبدأ القائل إنَّه لا حياة سعيدة ومطمئنة على المستوى النفسي والانفعالي لدى الشخص الراغب دون طفولة سوية ومستقرة، لذلك فإن هذه الدول تحاول أن تقدم كل أشكال الدعم والرعاية للأطفال وخاصة في مراحل نموهم الأولى؛ فهم يقدمون عدداً من المؤلفات العلمية المزودة بالعديد من الإرشادات والتوجيهات لمساعدة الأسرة والمدرسة على تنشئة أطفالها التنشئة السليمة والبعيدة عن الانحراف والاضطراب النفسي باعتبار الأطفال يشكلون عماد آية آمة ومستقبلها وأملها في تحقيق ما يتطلع إليه المجتمع من أسباب الرخاء والتقدّم.

ومما لا شك فيه، أن الأطفال في مراحل نموهم يمرّون بمشكلات كثيرة تعيق نموهم وتؤرقهم النفسي والاجتماعي والتي تكون القاعدة والأساس للكثير من الاضطرابات النفسية الخاصة بمرحلة الطفولة كالتأثير اللازاري والانطواء الشديد، التوحد (المذاتوية Autism) والقلق، والعناد الشارد، والنشاط الزائد، والخوف من الأشياء والمواضف والأماكن؛ كالخوف من الحيوانات والأشباح والظلام والغربياء والخوف من المدرسة... إلخ.

إن الأطفال الذين تملّكتهم بعض المخاوف السابقة معرضون للتصرف بعصبية وانفعال شديد عند مواجهة هذه المواقف مما تعيق توافقهم على المستوى العقلي والاجتماعي، ولكن عندما يعانون الخوف من بعض الأماكن العامة

كالمدرسة على سبيل المثال، فإن الأمر يصبح مشكلة كبيرة تحتاج إلى حلول جذرية؛ لأن المدرسة هي المؤسسة الرسمية الثانية بعد المنزل وهي المسؤولة عن تربية وتعليم الأطفال ثقافة المجتمع بقيمها وعاداتها... فإذا أصبحت مثيرة مخيفاً بالنسبة للطفل فإن هذا يعد مؤشراً سلبياً لاضطراب البيئة التي يعيش فيها الطفل. كما أن الخوف الذي يعاني منه الطفل يعتبر أحد أعداء الشخصية السوية لدى الطفل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التراث السينيولوجي في مجال الطفولة قدم الكثير من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال وما يترضهم من مشكلات، كما قدم الكثير من الأساليب الإرشادية والعلاجية لمواجهة تلك الاضطرابات التي يعانون منها في مرحلة الطفولة إلا أن هذه الأبحاث وخاصة العربية منها لم تهتم بالبحث والدراسة - عن مشكلة حقيقة تواجه الكثير من الأطفال عند التحاقهم بالمدرسة الابتدائية إلا وهي مشكلة خوف الطفل من المدرسة أو رفضه التهاب إليها School Phobia حيث تشير هذه الظاهرة الموجودة عند بعض الأطفال الكثير من التساؤلات لدى الآباء والمعلمين بشؤون الطفل حول حقيقة هذا الخوف، والأسباب الكامنة وراءه، والأساليب العلاجية المثلثة للتخفيف من حداته.

ومن أجل هذا:

خصص الفصل الأول للحديث عن مخاوف الطفولة وتطورها وأشكالها كمدخل للموضوع. وتناول الفصل الثاني الخوف المرضي من المدرسة: مفهومه، وأشكاله التصنيفية وعلاقته بالاضطرابات النفسية الأخرى. كما تضمن بعض الجوانب الديمografية المحيطة بالطفل الخائف من المدرسة، مثل: المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ترتيب الولادة، الفروق بين الجنسين (الذكور/ الإناث) في المخاوف المدرسية. وانفرد الفصل الثالث ببيان الأعراض الرئيسية للخوف من المدرسة وكذلك الأعراض الثانوية الأخرى المصاحبة لهذا الخوف: كالمستوى الدراسي (التحصيلي) درجة الذكاء (حاصل الذكاء) والاكتتاب. وعرض الفصل الرابع

بالتفصيل الأسباب الرئيسية للخوف المرضي من المدرسة، مثل الأسباب المتعلقة بـ الطفل والأسرة المدرسة، والأسباب الصحية والوراثية.

وتناول الفصل الخامس النظريات النفسية المفسرة للخوف المدرسي لدى الطفل وأهمها: نظرية التحليل النفسي ونظرية قلق الانفصال والنظيرية السلوكية، ونظرية الذات. وعالج الفصل السادس الإجراءات التشخيصية لظاهرة الخوف المدرسي من وجهة النظر التكاملية، وتطور وسائل الخوف المدرسي باعتباره المسؤول عن الكثير من اضطرابات سن الرشد كما أكد ذلك جون بوتي. أما الفصل السابع فتناول بعضاً من الأساليب العلاجية تواجهه هذه الظاهرة لدى بعض الأطفال كالأساليب القائمة على نظرية التحليل النفسي والأساليب والفنين السلوكيّة التقليدية (الكلاسيكية) والإجرائية والعلاج المعرفي والعلاج الأسري والعلاجات الدوائية.

وأخيراً فقد تناول الفصل الثامن قضايا إرشادية وعلاجية حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة، دافعية الطفل للعلاج والوقت المناسب للتدخل العلاجي وإجراءات سير العملية العلاجية والمكان المناسب للمقابلة... إلخ.

وقد اختتم هذا الفصل ببعض الإرشادات العامة التي تخص القائمين على تربية الطفل كالأباء والمربيين والمؤسسات المسئولة عنه حول كيفية وقایة أطفالهم من هذا الاضطراب والأساليب العلمية لمواجهته في حال وجوده. كما زود الكتاب بملحق تناول المؤلف فيه بعضاً من الاستبيانات والاختبارات التي تساعد المربيين والأهل على تشخيص هذا الظاهرة تشخيصاً دقيقاً وتميزها من اضطرابات الانفعالية الأخرى وذلك عندما تحدث لأطفالهم.



MOHAMAD KHATAB

وفي النهاية أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون قد ساهمت بجهد متواضع في إثراء المكتبة العربية، ولكل مهتم بالطفولة ومشكلاتها ببعض المعلومات التي تساعده على إلقاء المزيد من الضوء على ظاهرة خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة وأسبابها الظاهرة والحقيقة بهدف نفت الانتظار إلى خطورتها على المدى القريب والبعيد.

وعلى الله قصد السبيل

دمشق في 19/8/2012

الأستاذ الدكتور
رياض نabil العاسمي





MOHAMAD KHATAB



MOHAMED KHATAB

الفصل الأول

مخاوف الأطفال وتطورها

مقدمة:

لما كان الاهتمام بالطفل وبالطفولة من أهم المعايير والمحكمات الاجتماعية والإنسانية التي على أساسها يقاس تقدم الأمم والشعوب في هذا العصر، لذا أكدت الأبحاث النظرية والتطبيقية في مجال الطفولة أهمية مرحلة الطفولة باعتبارها القاعدة والأساس في بناء وتكوين شخصية الطفل وتحديد اتجاهاته في أيامه اللاحقة. وفي كثير من الأحيان أصبحنا نسمع أصواتاً تؤكد أن "الطفولة صانعة المستقبل" ومجدها لبناء المجتمع من خلال إمداده بالكتفاء والطاقة اللازمة لاستمراره وتقدمه. وبناءً على ذلك كان على المجتمع بمؤسساته التربوية والثقافية والاجتماعية أن يركز العناية والاهتمام بمرحلة الطفولة؛ تلك المرحلة الهامة التي يجب فيها إرساء دعائم السلوك السوي لحياة الطفل المستقبلية.

ويمثل معظم الأطفال خلال مساراتهم ببعض المشكلات النفسية، أو بفترات مؤقتة من الضغوطات الانفعالية التي كثيرةً ما تكون جزءاً لا يتجزأ من النمو نتيجة للتغيرات البيولوجية أو الفيزيولوجية، أو لزيادة الضغوط الاجتماعية والأسرية، أو تحدث تغيرات بيئية في محيط الطفل المادي.

وتكون أهمية تناول المشكلات التي تعوق نمو الطفل وتقدمه في كونها لا تنتهي عند سن معينة، وإنما قد تستمر معه إلى مراحل متقدمة من العمر، لذلك فإن آثارها النفسية والاجتماعية والجسدية لا تعود على الطفل فحسب بل على المجتمع ككل، ومن ثم فإن مواجهة مشكلات الطفولة ومعرفة أسبابها وطرائق علاجها تعدّ أمراً هاماً قمني به سائر المجتمعات على اختلاف أنظمتها، وخصوصاً بعد أن ثبتت الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال أن مصدر الكثير من الأمراض النفسية والعقلية عند الراشدين هي صدمات نفسية حدثت لهم في مرحلة

الطفولة، وأن بعض الأمراض والاضطرابات النفسية في مرحلة الرشد، إنما هي امتداد لاضطرابات نفسية نشأت وترعرعت في الطفولة. ويرجع ذلك إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة تكوينية مهمة في حياة الفرد، حيث يتم فيها تشكيل نموه العقلي والانفعالي والاجتماعي والجسدي ... كما تؤثر هذه المرحلة تأثيراً عميقاً في حياة الفرد المقبلة رشد وشيخوخته؛ ففي هذه المرحلة - مرحلة الطفولة - توضع البنود الأولى لشخصية الطفل، وتكون الإطار العام لتلك الشخصية بجوانبها المختلفة.

وقد شغلت الاضطرابات النفسية psychological disorders التي يتعرض لها الأطفال في سنّي حياتهم المبكرة اهتمام القائمين على تربية الطفل ورعايته، سواء من قبل علماء التربية أم علماء النفس أم علم الاجتماع أم الأطباء النفسيين، والتي ترجع الأسباب في معظمها إلى أسباب نفسية وترويجية، وإن تبدت أمراضها في مظاهر خارجية متنوعة مثل: الكتب، السرقة، العنوان، التبول اللازامي، النشاط الزائد، الاكتئاب والانطواء إضافة إلى المخاوف التوحيدية كالخوف من الظلام، الخوف من الآخرين الخوف، من الحيوانات... الخ.

هذا، وتعد المخاوف المرضية أو الفوبيا Phobias بأنواعها المختلفة من أكثر الأعراض العصبية شيوعاً، خصوصاً لدى الأطفال. ويمكن التنبؤ بها خلال مراحل نموهم.

(⁽¹⁾) (748, 23)

ونتيجة ذلك، فإن المخاوف المرضية تمثل الاستجابة العصبية الأولى للأطفال، وبناء على ذلك فقد أكد العديد من العلماء في مجال التربية وعلم النفس أن العصاب (Neurosis) عند الأطفال هو المخاوف المرضية، هذا بالإضافة

(1) يشير الرقم الأول إلى موضع المرجع في قائمة المراجع، بينما يشير الرقم الثاني إلى رقم الصفحة.

مخاوف الأطفال وتطورها

لكونها تمثل نقطة البداية في كثير من الحالات العصبية والذهانية، كما أنها تعتبر عاملاً مشتركاً بين هذه الحالات جميعها.

(27,9)

وفي هذا الصدد يذكر "أتوهينخل" (1969) أن الاستجابات العصبية الأولى للأطفال تتحدى - كقاعدة عامة - صورة هستيريا القلق، حيث يخلط "فينخل" بين "الفوبيا" و"هستيريا القلق" وبعدهما متراودين، بينما يفرق بين عصاب القلق وهستيريا القلق؛ ففي عصاب القلق هناك توتر داخلي عام يترجم عن نفسه في قلق دائم يطفو طليقاً أو في استعداده للقلق. أما في هستيريا القلق فإن القلق يرتبط نوعياً بموقف خاص يمثل الصراع العصبي. فالشخص النسوي أمام الخطر يستحدث نوعاً من الخوف تستفيد منه الآنا، بينما الشخص العصبي يستجيب لخطر واقعي بالذعر بدلاً من أن يشعر بالخوف، فإنه بالطريقة نفسها يستجيب لخطر وهمي بالذعر.

(27,4)

هذا، وقد أوضح "هندرسون وباتشيلور" (1962) Oendrson and Batchelor أن الكثير من الحالات النفسية تبدأ بالمخاوف المرضية، ثم تتطور إلى اعراض العصاب القهري Obsessive – Neurosis، وقد ينتهي بها الأمر إلى اعراض البارانويا، أو الفحص الزوري Paranoia Schizophrania).

وهذا الرأي إشارة واضحة لأهمية المخاوف المرضية في تشكيل الأضطرابات النفسية والعقلية ، إذ يرى زهران إن المخاوف المرضية تمثل (20%) من مجموع الحالات التي تعاني من الأضطرابات العصبية.

لذلك تُعد المخاوف المرضية التي يعاني منها بعض الأطفال من أهم الأضطرابات النفسية في مرحلة الطفولة ، والتي ترك أبعد الأثار غوراً أو أكثر

استمراراً في نفس الطفل. ويقول علماء النفس في هذا الصدد: إن الطفل يولد وهو مزود بتنوعين من المخاوف: الخوف من الأصوات العالية، والخوف من السقوط من مكان مرتفع.

ومع اتساع خبرات الحياة لدى الطفل تأخذ أنواع أخرى من المخاوف طريقها إلى الظهور، كـالخوف:

- من الانفصال عن أحد الوالدين.
- الخوف من الحيوانات.
- الخوف من الموت.
- الخوف من الظلام.
- الخوف من الغرباء.
- الخوف من المدرسة... إلخ.

ولو أمكن استبعاد الخطر الذي يشعر الطفل بأنه يهدد كيانه وأضيقينا على البيئة الآمن والطمأنينة، فإن الخوف المرتبط بشيء ما سوف ينتهي إلى الزوال. أما إذا أصبح الموضوع الذي يهدد كيان الطفل حقيقة واقعة، وعانيا منه أمراً جسرياً أو صدمة نفسية فقد تتشكل في عقل الطفل اللاشعوري عقدة الخوف.

وليس ثمة دليل على أن آية حالة نفسية يمكن أن تنتقل من الأبوين إلى الطفل، ومع ذلك هناك حقيقة لا تقبل الشك وهي أن خوف الآباء يمكن أن ينتقل إلى الأبناء عن طريق: الإيحاء والتقليد، والتأثير اللاشعوري، وبذلك تفترن عقولهم اللاشعورية بالخوف (Fear).

وعلى هذا الأساس، فالخوف حالة انفعالية طبيعية يشعر بها الفرد في بعض المواقف الحياتية المختلفة، فيظهر هذا الخوف في أشكال متعددة ودرجات متباينة، تراوح بين الحذر والهلع والرعب والعجز الكلي في مواجهة الموقف التي أثارت في نفسه الخوف.

وبناءً على ذلك، فكلما كانت درجة الخوف في الحدود الطبيعية المعقولة – وتتناسب مع شدة التثير المؤيد للخوف كأن الفرد سوية، ويتمتع بصحة نفسية سليمة، وأمكنه السيطرة على مخاوفه، ولكن كلما كانت درجة الخوف كبيرة لدرجة يتعدى معها السيطرة عليه بالعقل والمنطق فإنه من المتوقع أن يعاني الفرد الخوف المرضي أو الرهاب.

الخوف الطبيعي والخوف المرضي:

إن الخوف حالة انفعالية طبيعية يشعر بها كل إنسان في بعض المواقف الحياتية المختلفة، فيظهر هذا الخوف في أشكال متعددة نتيجة لخطر حقيقي يهدد حياة الإنسان وسلامته في حالة عدم الاستجابة لهذا الخوف. فالطفل الذي يخاف من النار هو في الواقع طفل يتجنب نفسه خطر الاحتراق والتسبب في أذى ربما يلحق به نتيجة عدم الابتعاد عنها، لذلك فالخوف الطبيعي أسلوب يستخدمه الفرد ليحمي نفسه من الأخطار المتوقعة التي ستحدث له. فهو يساعده على تجنب الواقع في الخطر، لذلك فالخوف العادي هو خوف يحفظ الفرد ويساعده على مواصلة النمو الذاتي والتقدم فيه؛ لأن هذا الخوف يجعل الفرد أكثر حرصاً في عمله وأشد التفافاً إليه من أي شخص آخر، وقد يبعث في نفسه الرغبة في القيام بعمل مبدع خلاق. فالطبيب الجراح الذي يوصل إليه القيام بعملية جراحية خطيرة يتعرف من خلال خبرته – وقبل إجراء العملية – على التواحي المختلفة التي ستمر بها العملية، فهو بعمله هذا يصبح جراحًا ماهراً، ثم أنه تخوفه على سمعته وعلى حياة مريضه يهدف إلى التقدم وإلى زيادة الحبيطة والحدن.

(36,10)

وبناءً على ذلك يعرف الخوف بأنه: حالة انفعالية طبيعية يشعر بها الإنسان في بعض المواقف المختلفة في حياته، ويسلك فيها سلوكاً يبعده عادة عن مصادر الخطر والضرر. (29 ، 316) أو هو استجابة انفعالية تدفع الفرد إلى تجنب

المثير الذي أخافه، أو هو حيلة دفاعية يلجأ إليها الفرد للدفاع عن نفسه بطريقة أو أخرى بغية إبعاد التوتر الداخلي الناشئ عن الموضوع الذي أثار خوفه.

(9,2)

كما ينظر إلى الخوف الطبيعي بأنه خوف موضوعي وعقلاني من خطير حقيقي وموضوعي، وهو مناسب مع الموقف الذي استدعي استجابة الخوف؛ فالطفل الصغير حين يذهب إلى المدرسة لأول مرة، يواجه بعض مشكلات التكيف مع البيئة الجديدة ببعديها المادي والبشري، مما يجعله يشعر بالخوف تجاه المدرسة باعتبارها بيئة غريبة عنه، ولكن هذا الخوف يزول تدريجياً، ويعود الطفل إلى المواقبة إلى النهاب للمدرسة بشكل منتظم، ولا يعاني بعد ذلك من مشكلات تكيفية بهذه الخصوص.

لذلك يمكن القول إن مخاوف الطفل من البيئة الجديدة أو الغريبة أمر طبيعي، لأنها لا يستطيع - حتى هذه اللحظة - التمييز والتحكم الذاتي بانفعالاته، نتيجة لعدم نمو المدارك العقلية لديه بصورة كافية. أما الخوف المرضي فهو عبارة عن خوف من أشياء أو موضوعات لا تشير الخوف بطبعتها عند عامة الناس أو لا تثيره بالدرجة نفسها من الشدة، إذ لا يتفق حجم الخوف مع مقدار الخطير المتضمن في المثير، وإنما يزيد عليه، لذلك فالخوف المرضي خوف لا عقلاني أو غير منطقي يدرك الفرد في قرارة نفسه أنه خوف عقلاني، ولكنه مع ذلك لا يستطيع التخلص منه والسيطرة عليه.

يعرف "الرفاعي" الخوف المرضي بأنه: "خوف مسلط ملح ومتكرر الظهور من شيء أو موقف من غير أن يكون هذا الموقف يثير خوفاً موضوعياً يتناسب مع المثير، وأنه خوف لا تبرره الأسباب الشعورية، يظهر ملحاً في مظاهر الهلع عند الفرد ورغبتة الشعورية في أن يهرب من الموقف الذي أفرزه".

(292, 51)

فالخوف مثلاً من كلب عرف بشراسته هو خوف طبيعي ومعقول، لأن الخوف هنا كان سببه مثير موضوعي، أما الخوف من كلب حتى وإن كان وراء المواجه والقضاء الحديدي، يظهر أنه لا يستطيع أن يتخطاها فهو خوف لا تبرره الأسباب الشعورية وهذه الحالة هي خوف مرضي، وتم تعدّ ظاهرة انفعالية وظيفية هدفها حماية العضوية، بل أصبح الخوف ضررًا من الإزاحة لانفعال معين عن موضوعه الأصلي الذي ابتعد عن ساحة الشعور والوعي.

والإزاحة في الخوف المرضي كما يفسرها "أتو فينخل" تكشف أن الدافع لا يقتصر على تجنب القلق بتجنب المواقف التي يمكن أن تطلق القلق، وقيام البدائل يثبت أن الكبت وغيره من الآليات الدفاعية يستخدم أيضًا، لذلك فإن الطرق التي تسلكها الإزاحة تحددها عوامل متباعدة إلى حد كبير في تاريخ حياة الفرد؛ ولهذا فإن دلالة المخاوف المرضية لا يمكن فهمها بغير دراسة لتاريخ الفرد، وإلى حد ما تتوقف الطرق التي تسلكها الإزاحة على طبيعة الميل المكتبة.

(218 – 215,5)

وبناء على هذه الرؤية تعرف مدرسة التحليل النفسي الخوف المرضي على أنه صورة من صور القلق العُصبي، وأن قوته لا تتناسب مطلقاً مع الخطير الحقيقي الذي ينتج عن شيء أو المثير موضوع الخوف، كالخوف من الحشرات، الفتران، الظلام، المدرسة... إلخ وفي كل حالة من هذه الحالات يكون الخوف غير معقول على أساس أن منبع القلق كامن في "الهو" وليس في العالم الخارجي، وراء كل خوف مرضي رغبة بدائية عند "الهو" في الموضوع الذي يخشى منه، فكان الشخص الذي يبتعد عن الموقف المخيف يرتبط بموضوع الخوف أو يرمز إليه.

أما السلوكيون التقليديون فيعرّفون الخوف المرضي بأنه "رعب مرضي أو خوف غير مناسب مع التهديد الفعلي الذي يمثله هذا الموضوع.

(39, 18)

كما يرون أيضاً أن الخوف المرضي عبارة عن خوف مزاج (Displaced)، وينشأ بطريقة مختلفة عن المخاوف التشريحية. ففي حالة المخاوف التشريحية يكون الخوف تاجماً عن خبرة سينية مباشرة مع الموضوع المخيف، بينما في حالة المخاوف المرضية يكون الخوف مزاجاً من موضوع أصلي إلى موضوع بديل، كان تتم إزاحة الخوف لدى الطفل من الابتعاد عن الأم إلى موضوع خارجي كالدرسة على سبيل المثال، حيث يشعر الطفل بالخوف من المدرسة أو رفضه النزهات إليها رغم عدم تعرضه لآية خبرة مباشرة من جانبيها، وقد يستمر الطفل هذه المخاوف ليضمن البقاء بجانب الأم.

بينما ركز السلوكيون الجدد على التشريح الكلاسيكي في نشأة الأمراض العصبية من بينها المخاوف المرضية، حيث يرى "إيزنوك" (Byzenck، 1978) أن العصاب حالة من الاستجابة التشريحية المفرطة.

أما نظرية التعلم فتري في المخاوف المرضية التي يعاني منها الأطفال هي عبارة عن عادات تم تعلمتها في فترة من فترات حياة الطفل.

وبناءً على ذلك: فالخوف المرضي هو حالة خوف متطرفة وغير منطقية، وقد تتضمن أيضاً توقعاً مستمراً ل موقف مخيف لا يستند إلى أساس واقعي ولا يعرف الفرد سبباً حقيقياً لهذا الخوف، لذلك فهو حالة ملحة ومكدرة وغير منطقية رغم أن الفرد يعرف تماماً - من الناحية الشعورية - أن هذا الموقف المخيف لا يشكل خطراً حقيقياً له؛ وإن هذه الفكرة (غير المنطقية) تجبره على أن يتتجنب هذا الموضوع ويبتعد عنه، ومن ثم فهو يسلك سلوكاً ثهرياً.

يلاحظ من التعريفات التي قدمها العلماء والباحثون في مجال علم النفس والطب النفسي حول المخاوف المرضية أو المخاوف الشديدة تدور - في الغالب - حول نقاط عدة أهمها:

1. إن المخاوف المرضية هي خوف دائم من موقف أو موضوع غير مخيف بطبعته.
2. إن هذه المخاوف لا تستند إلى أساس واقعي أو منطقي.

3. إن هذه المخاوف تقع خارج السيطرة والتحكم بها، أي خارجة عن إرادة الفرد.
4. إنها تؤدي بالفرد الذي يعاني منها إلى تجنب المواقف التي يخاف منها.
5. إنها تفوق في شدتها المثير الذي استدعاها الخوف.
6. إن الخبرة المخيفة المتعلقة بشيء أو شخص أو مكان أو موقف تعمد إلى أشياء عدّة أو مواقف ترمي إلى الموضوع الأول للخوف، بمعنى آخر: إن ظاهرة التعميم تكون واضحة في الخوف المرضي.
7. غالباً ما تبدأ خبرة الخوف المرضي بموقف مخيف حصل أيام الطفولة، وإن الفرد لا يستطيع تذكر حدوث تلك الخبرة، لأنها مكتوبة في اللاشعور (العقل الباطن).

الفرق بين الخوف والخوف المرضي:

ذكرنا آنفاً أن حالة الخوف باعتبارها ظاهرة طبيعية موجودة عند أغلب الناس عندما يواجهون خطأً حقيقة في بعض المواقف الحياتية وأنها ضرورية لحماية الفرد من الأخطار والأضرار التي تهدى سلامته وأمنه. وتحذّلنا أيضاً عن الخوف المرضي وأشارنا إلى أنه خوف شديد لا يبرره الواقع؛ ويصل إلى درجة تدفع الفرد إلى الهروب وتحاشي المواقف المخيفة رغم قناعة الفرد بعدم منطقية هذا الخوف.

وهنا، قد يتبدّل إلى الذهن سؤال مهم، مفاده: هل هناك فروق حقيقة بين كل من الخوف الطبيعي (Fear) والخوف المرضي (Phobia)؟ . ولإجابة على هذا التساؤل يمكن القول: إن العلماء في مجال علم النفس والتربية والطب النفسي قد أكدوا من خلال الأبحاث والملاحظات السريرية أن هناك فرقاً واضحًا بين كل من المفهومين، وأن الخلط بينهما يرجع إلى التشابه بين الأعراض والحالة النفسية التي يكون عليها الفرد عندما يعاني من الخوف والخوف المرضي أو العصبي.

وأهم الاختلافات ملخصاً:

1. إن كليهما (الخوف والخوف المرضي) حالة انفعالية مدركة، ولكن الشدة الانفعالية في حالة الخوف المرضي تكون أشد وأعنف من حالة الخوف الطبيعي.
2. إن ديمومة الآثار الانفعالية للخوف المرضي أطول من الآثار الناجمة عن حالة الخوف الطبيعي، والتي تزول بزوال الموقف أو المثير المسبب للخوف، بينما في حالة الخوف المرضي فإن الآثار الانفعالية لا تزول بهذه السرعة.
3. إن الأمراض الفيزيولوجية المصاحبة للخوف المرضي كزيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتقلص العضلي تكون أشد وأعنف وأكثر ديمومة من الأعراض المصاحبة لحالة الخوف الطبيعي.
4. إن الخوف يغدو عقلياً وواقعاً إذا كان متناسباً مع شدة المثير المولد للخوف بينما يغدو لاعقلياً عندما لا يتناسب مع حجم وكمية المثير الذي ولد الخوف المرضي.
5. إن الأسباب التي تؤدي إلى الخوف المرضي تبدو في أغلب الأحيان غير واضحة المعالم بالمقارنة مع حالة الخوف الواقعي أو المنطقي.
6. إن الخوف الطبيعي أو العادي يزول من خلال توفر عوامل الأمان والسلامة، بينما لا تكفي وجود هذه الوسائل لكي يزول الخوف في الوضع المرضي، ولكنه يستمر رغم وجود عوامل الأمان.
7. إن الفرد الذي يعاني من الخوف المرضي لا يكون قد عانى فعلاً من ضرر وإيذاء من الموقف أو الشيء الذي أخافه مقارنة بالخوف العادي، مثل ذلك الخوف من الشياطين والأرواح الشريرة أو رؤية الدماء.
8. إن الخبرة المؤلمة والمخيفة إذا خرجت من ساحة اللاشعور إلى ساحة الشعور، فإن خروجها يتثير الشعور بالذنب أو الإثم مما يجعل خروجها إلى الشعور مؤلماً للفرد، وهذا الأمر يختلف عن حالة الخوف العادي الذي لا يُظهر شعوراً بالذنب أو الإثم عند الفرد الخائف.

العلاقة بين الخوف والقلق:

أصبح من الواضح أن عصرنا الحاضر يتميز بالقلق Anxiety وذلك نظراً لما يشهده من أحداث وظروف متغيرات متزايدة، بحيث أصبح هذا العصر متغيراً يثير القلق بحد ذاته، بل تحول من مجرد نتيجة إلى سبب يؤدي إلى ظهور الكثير من الأعراض العصبية، حتى أن بعضهم يدعونه (أي القلق) جوهر العصابة ومصدراً لكثير من الأمراض النفسية والجسمية.

والقلق من زاوية أخرى: انفعال إنساني ذو حدة وشدة، ورغم ما هنالك من رجم في الدراسات ووفرة فيها، فلم تختلف البحوث بشأن أي انفعال كما اختلفت في شأنه، فقد تعددت الآراء بصدره، وتبينت وجهات النظر إليه، حيث يرى بعضهم أن القلق انفعال من قبيل التهاب، إذ ينذر بالخطر وسوء المقلب والمآل، فهو أساس المرض النفسي وجوبه، ويصاحب - فضلاً عن ذلك - كل الأمراض الجسمية والأقسام والعلل، بينما يرى بعضهم الآخران القلق هو الدافع وراء بكل إنجاز ضخم، وبالاعتراض على آرائهم هذه بالتحديد من الأمثلة تعبّر عن القلق أمثال تولستوي وفرانكل وهمنغواي وابن رشد وغيرهم، وتالئموا لما أصحابهم من مشقة وضيق، ورغم ما واجهوه من ظلم وقسوة في محياطهم الاجتماعي والفكري إلا أنهم لم يفقدوا الأمل والرجاء بغير أفضل.

(11,1)

ومما تقدم يمكن القول: إن درجة معتدلة من القلق تعدّ صحية وإيجابية في حياة الفرد؛ لأنها تدفعه نحو العمل الجاد والمتقن، والبني على أهداف واضحة، وكذلك لدرء الأخطار الممكنة أو المحتملة التي يتعرض لها (الإنسان) في صراعه اليومي مع الحياة. فالقلق في هذه الحالة هو باعث وحافز إيجابي يساعد في الحفاظ على الذات، والنجاح في مسيرة الحياة... ولكن المشكلة تكمن في ازدياد شدة درجة القلق، وفي استمراره دون سبب واضح أو معقول، لذلك يسمى القلق في هذه الحالة "ـ

قلقًا مرضيًّا "Morbid anxiety" أو "قلقًا عصبيًّا" Neurotic Anxiety لأنَّه قلق مزمن غير مبني على أساس موضوعية، إضافة إلى مصاحبته لأعراض جسمية ونفسية كثيرة دائمة إلى حدٍ كبير.

(19,19)

ويعرف "زهران" (1978) القلق بوجه عام "بأنَّه حالة من التوتر الشامل والمستمر تحدث للفرد نتيجة توقعه لخطر يهدده سواءً أكان خطراً حقيقياً أو رمزاً. وهذه الحالة يصاحبها خوف غامض، بالإضافة إلى بعض الأعراض النفسية والجسمية".

(289,15)

أوهو عبارة عن حالة اندفعالية شديدة يعاني منها الفرد عندما يواجه خطراً واقعاً أو متوقعاً في المستقبل مع تعرُّض الفرد من جراء ذلك لشكل أو آخر من أشكال التهديد في كيانه الشخصي أو الأخلاقي، ومصاحبة هذه الحالة الانفعالية تغيرات فيزيولوجية مختلفة، كزيادة في عدد ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتقلص العضلي وجفاف الفم وأعراض سيكوسوماتية (جسمية ذات أصل أو منشأ نفسي) كالغثيان والقرحة، والاضطرابات المعرفية... الخ.

والقلق في رأي "فينخل" (1969) هو عبارة عن خبرة اندفعالية مؤلمة تنتج عن استثمارات في أعضاء الجسم، وهذه الاستثمارات تنتج منبهات داخلية أو خارجية يتحكم فيها الجهاز العصبي، والقلق مرادف لانفعال الخوف. ولكن فينخل فصل القلق عن الخوف؛ لأنَّ الخوف يفهم منه عادة الخشية من شيء في العالم الخارجي، في حين أنْ هرويد رأى أنَّ الإنسان يمكن أن يخاف من أخطار داخلية كما يخاف من أخطار خارجية.

(242,5)

والمخاوف المرضية أقرب ما تكون للقلق المباشر، ففي حالات المخاوف المرضية يتحدد الخوف بأن يتراكم حول موضوع بعينه، ويمكن للفرد أن يتتجنبه، إلا أن هذا التحديد والتجنب كثيراً ما يفشل وبعدها الطفل عملية تعميم ينتقل بعدها من الخوف من الموضوع ذاته إلى الخوف من كل ما يتصل بهذا الموضوع. وهذه العملية تمثل برأي "شعلان" (1979) نوعاً من الجذب للعودة إلى حالة القلق الشامل التي تجنبها الطفل في الأصل عن القلق رغم أن المخاوف المرضية هي صورة من صور القلق العصبي.

(80, 44)

ويرى "فينخل" أن المخاوف المرضية أو حكماً سماها "هستيريا القلق" تختلف عن القلق؛ فالقلق خبرة انتعالية مؤللة غير محددة المصدر، ومن ثم يصعب تجنبها، وأثناء محاولات الفرد لتجنب التوتر، فإنه يزيح هذا القلق أو يسقطه على موضوع خارجي يتمكن من تجنبه، ومن ثم يمكن رد المخاوف المرضية إلى عملية التجنب (Avoidance).

(252, 5)

وهنا يتبدّل إلى الذهن السؤال التالي:

ما العوامل التي تدفع الطفل الذي يعاني من القلق إلى اختيار طريق الخوف المرضي للهرب من القلق بدلاً من اختيار طريق آخر؟ والإجابة على هذا التساؤل تبدو من خلال أثر الفروق الفردية بين الأطفال وإلى مكانة الخوف الأولى نفسه والصراعات التي يعانيها الطفل، وسهولة هذا الطريق في الهرب، إضافة إلى خبرات الطفولة في هذا الاختيار، فقد يرجع الخوف إلى الصراعات والإحباطات التي عجز الطفل في حلها وإسقاطها لتظهر على شكل مخاوف من أشياء لا تثير الخوف بطبيعتها، أو نقله من موضوع ذاتي إلى موضوع آخر يرمز إليه، كأن يقول: إن الخوف من الأب كما في حالة الطفل "هانز" الذي شخصه فرويد

(عن طريق تقرير الأب) هو خوف داخلي قد تحول ليظهر في شكل الخوف من الخيول، وهناك شكل يرجع فيها الخوف إلى مثيراته الأصلية؛ فالطفل الذي عشه أحد الكلاب وتسبب في إيدائه، ليس من المستغرب أن يخاف من كل الكلاب التي يصادفها في طريقه.

أما نقاط التشابه والاختلاف بين الخوف المرضي والقلق فيمكن إجمالها في الآتي:

أولاً، نقاط الاختلاف:

1. إن كلاماً من القلق والخوف حالة اندفعالية مزصجة تسبب للفرد الضغط والتوتر الداخلي.
2. كل منهما يستثار بوجود خطر يهدد الفرد وسلامته الجسمية أو الشخصية.
3. كل منهما إشارة خطيرة تدعى الفرد إلى استخدام بعض أساليب للدفاع عن نفسه، كالهرب أو المواجهة أو المواربة أو الاستسلام.... الخ.
4. تصبح كلاماً منهما تغيرات هرمولوجية واضحة كارتفاع ضغط الدم تصبب العرق زيادة عدد ضربات القلب، وتغيرات داخلية غير واضحة كزيادة نسبة السكر أو زيادة مادة الأدرينالين في الدم.
5. إن للقلق أشكالاً وأنواعاً منها: القلق الموضوعي الذي يكون مصدره خارجياً وفي هذه الحالة يشبه حالة الخوف من حيث مصدر التهديد للفرد.
6. إن حالة الخوف قد تكون في بعض الأحيان غير متناسبة مع شدة المثير المولد للخوف، فقد يكون الخوف أشد مما يستدعيه الموقف المثير، وبذلك يشبه القلق من هذه الناحية.



ثانياً، نقاط الاختلاف:

أما أوجه الاختلاف بين القلق والخوف فيمكن إجمالها في الآتي:

1. يكون موضوع الخوف معروفاً من الشخص ومدركاً، ولا يكون على هذا النحو في حالة القلق.
2. الأصل في الخوف أن يكون موضوعه موجوداً في العالم الخارجي، ولا يصدق ذلك في كل أشكال القلق؛ فالثير المسبب للقلق في أغلب أشكاله ذاتي وليس له وجود في العالم الخارجي.
3. إن وضوح الخطر في حالة الخوف لا يكون معاذلاً لوضوح الخطر في حالة القلق، حيث يكون الخطر في حالة الخوف أكثر وضوحاً من حيث مصدره الخارجي، بينما لا يكون وضوح الخطر بارزاً في أغلب حالات القلق.
4. إن الفرد الذي يعاني من القلق يضفي أو يسقط من نفسه على الموقف أكثر مما يفعل في حالة الخوف، لأن الشخص القلق يعبر عن استجابته هذه بمعانٍ داخلية، كما أنه يصف العالم الخارجي بهذه المعانى الذاتية.
5. إن أغلب حالات القلق يكون الخطر موجهاً إلى كيان الشخصية، بينما لا يكون هذا الأمر في حالة الخوف.
6. يشعر الفرد في حالة القلق بالعجز نحو المصدر المجهول، ولا يكون هذا الشعور بالعجز منطلقاً في حالة الخوف.
7. حالة الخوف عابدة ومؤقتة، بينما حالة القلق أكثر استمرارية وديمومة.
8. يصاحب كلاً من القلق والخوف تغيرات فيزيولوجية متعددة، ولكن الآثار التي يتركها القلق من الناحية الفيزيولوجية أقوى من الآثار التي يتركها الخوف.

يشكل عاماً، إن قلق الطفل يصبح منفصلاً عن موضوع أو موقف معين في حياته اليومية ويراح إلى موقف ما في شكل خوف مرضي نوعي، كما أن الخوف الذي يشعر به الشخص في وجود موضوع معين أو خبرة بعينها هو في الحقيقة

الخوف المزاح من قلق ناتج عن مكونات داخل البنية النفسية التحتية (الشعورية واللاشعورية) له.

مخاوف الأطفال وتطورها:

هناك شبه إجماع بين العلماء على أن الأصوات العالية الفجائية والأشياء المتحركة، والخوف من الدخول في النوم هي أهم المثيرات الأولى للخوف في الطفولة المبكرة، (أي في السنة الأولى والثانية تربيعياً من عمر الطفل) خصوصاً إذا كان موضوع التعلق، وهو غالباً الأم، بعيداً عن الطفل، ويتقدم نمو الطفل تزداد مثيرات الخوف وتختلف في النوع، ففي السنة الثانية وحتى الخامسة، قد يخاف الطفل من الأماكن الغريبة غير المألوفة ومن الواقع من مكان مرتفع، ومن الغرباء، والحيوانات والطيور التي لم يائفها، كما أن الطفل يخاف مما يخاف منه الكبار حوله لأنه يقلدهم، أي أن الطفل يتتأثر إلى درجة كبيرة بمخاوف غيره (الأباء، الأمهات، الأقران...) سواء كانت واقعية أم غير واقعية، أما مخاوف الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة فتتجلى في: الخوف من الآباء، الخوف من الانفصال، الخوف من المدرسة...

ويمكن إجمال مخاوف الأطفال في موضوعات رئيسية هي:

1. الخوف من الحيوانات (مخاوف حسية) كالخوف من الأفاعي أو الفئران أو القطط أو الكلاب الحشرات أو الخوف للأحصنة ... الخ.
2. الخوف من رؤية السلوكيات العدوانية لدى الآخرين، مثل مشاعر الغضب أو الضرب أو الأصوات العالية أو فقدان التحكم.
3. الخوف من الغرباء.
4. الخوف من الموت والأذى كالخوف من الجروح، مشاهدة العمليات الجراحية، موت الناس وحوادث السيارات.
5. مخاوف ذات شكل أخلاقي؛ كالخوف من العذاب في الآخرة.

مخاوف الأطفال وتطورها

6. الخوف من الظلم وما يرتبط به من مخاوف أخرى كالخوف من الوحدة.
7. الخوف من أشياء غير محسوسة، كالخوف من العفاريت، الأشباح.
8. الخوف من الأماكن: كالخوف من الركوب في المصاعد، الأماكن المزدحمة، السفر بالطائرة، الخوف من المدرسة....الخ

وما يجب ذكره هنا، أن انفعال الخوف عند الطفل يظهر في صورة فزع يبدو على أسرار وجهه، وقد يكون مصحوباً بالصرخ. ثم يتطور في سنواته الأولى – بعد السنة الثانية – إلى الصياغ والهرب المصحوب ببرasha وتغيرات في خلجلات الوجه، أو إلى الكلام المنقطع، وقد يكون الخوف مصحوباً بالعرق الغزير، وزيادة في نبضات القلب، والتتوتر العضلي، أو التبول اللاإرادي في بعض الأحيان.

هذا، ويمكننا الحكم على درجة مخاوف الطفل وشديتها بمقارنتها بمخاوف أغلب الأطفال ممن هم في سنه، فإذا كان هذا الخوف في الحدود المعقولة فإنه يعدّ خوفاً طبيعياً ومفيداً لسلامة الطفل ونموه على المستوى النفسي والانفعالي، أما إذا كان شديداً ومتداولاً فيه، فإنه سوف يضر بصحة الطفل النفسية والسلوكية والاجتماعية والانفعالية عاجلاً أم آجلاً. لذلك فالمخاوف التي يعاني منها الأطفال كثيرة ومتعددة – كما ذكرنا آنفاً – مثل: الخوف من الظلم، الأشباح والعفاريت، الخوف من المدرسة أو رفض الطفل الذهاب إليها.

والخوف من المدرسة School Phobia كثيرة من أنواع المخاوف المرضية التي يعاني منها بعض الأطفال يعدّ سلوكاً مكتسباً يتعلمه الطفل خلال تنشئته الاجتماعية كالحمامة الزائدة، والتدليل الزائد، والخلافات الأسرية، إضافة إلى الخبرات التي يتعرض لها الطفل في المدرسة. وقد يكون الخوف لدى الطفل راجعاً إلى الخوف من الغرباء، وبعد المدرسة عن مكان إقامة الطفل؛ لأن ذهاب الطفل إلى المدرسة يحتوي على صدماتين كما يقول إنجلش وجيرالدبيرسون (1958) وهما: صدمة الانفصال عن الوالدين، والخوف من الغرباء.

لذلك، فإن هناك عددً من الأطفال والراهقين يعانون من مشكلات تتعلق بتوافقهم في البيئة المدرسية، وتتجلى هذه المشكلات في رفض الذهاب إليها أو الخوف منها، ويبعد ذلك بعد الدخول إليها في حالات، وقبل الدخول إليها في حالات أخرى، وهذا ما دفع بعض علماء النفس للقول بوجود نوع من الخوف المُصابي باسم الخوف من المدرسة (School Phobia).

والواقع: إن الخوف من المدرسة موجود لدى بعض الأطفال، حيث يظهر بصورة طبيعية في حالات، وقوى وملح في حالات أخرى، ولكن يغلب فيه أن يكون معتقداً، ولا يمت بصلة إلى شكل مرضي محدد، لأنه ينطوي على عدد من المخاوف والاضطرابات النفسية والشخصية، إضافة إلى وجود أعراض مرضية تلازمه وتصاحبه تكون مختلفة كل الاختلاف عن اعراض المخاوف الأخرى، كما أن أسبابه كثيرة ومترادفة مع بعضها بعضاً، لذلك فقد تحدث الكثير من علماء النفس أمثال "جون بوبي" و"برودوين" مطولاً عن هذا الاضطراب النوعي الذي يعاني منه بعض الأطفال أثناء حيواتهم الدراسية باعتباره المشكلة الانفعالية الأهم من بين المشكلات التي يعاني منها الأطفال، وتساءلوا عن حقيقة هذا الخوف؟ وما أسبابه أو الدوافع الكامنة خلفه؟ وما الأعراض الأساسية البادية في سلوك الطفل الذي يعاني منه؟ وما الأساليب العلمية في تشخيص هذا الخوف؟ وما الطرائق المثلث لعلاجه أو التحقيق من حدته؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت في الغالب موضوع نقاش من قبل الآباء والمعلمين والمهتمين بشؤون الطفل وذلك عندما تواجههم مشكلة كهذه.

لذلك، سوف نحاول في الفصول التالية التركيز على هذا الخوف (الخوف المرضي من المدرسة) على اعتبار أن هذا الذي يعيشه الطفل ليس خوفاً خيالياً، ولكننه خوف موجود عند كل الأطفال باختلاف أعمارهم، ومشكلة موجودة في كل المدارس على اختلاف أنواعها، وأن كثيراً من هؤلاء الأطفال يكونون مرضى بالفعل، لكن عملية اكتشاف وتشخيص هذا الاضطراب تشخيصاً موضوعياً يعد تحدياً كبيراً لدى المشتغلين في مجال الصحة النفسية على امتداد الوطن العربي، وذلك لتنوع

العوامل التي تساهم في تفجره، وتداخل أعراض هذه العوامل مع بعضها بعضاً. وبالرغم من أهمية هذا الموضوع بالنسبة لكل أسرة عربية وخصوصاً في بداية ذهاب أطفالهم إلى المدرسة لأول مرة، إلا أن هذا الموضوع لم يلق الاهتمام الكافي بالبحث والرعاية. كذلك آثر الباحث تسليط الضوء عليه، لعل من يجد فيه المعرفة والفائدة التطبيقية في مساعدة أبنائه في الانضمام في المدرسة.





MOHAMED KHATAB

٢

مفهوم الخوف المرضي

من المدرسة





MOHAMED KHATAB

الفصل الثاني

مفهوم الخوف المرضي من المدرسة

مقدمة:

تكثر المخاوف عادة في مرحلة الطفولة المبكرة نتيجة لعدم قدرة الطفل على إدراك العالم الخارجي وفهم ما يدور فيه وهذا أمر طبيعي؛ فهناك الخوف من الحيوانات والخوف من الظلام والخوف من الغرباء والخوف من الوحيدة ... إلخ. وهذه المخاوف سرعان ما تزول وتختفي بشيء من التوجيه والرعاية والإرشاد، لكن بعض المخاوف قد تظهر في مرحلة الطفولة المتوسطة بصورة تختلف عن مخاوف الطفولة المبكرة من حيث شكلها ونوعها، وخطورتها، واستمرارها أو ديمومتها حيث ترتبط هذه المخاوف بالواقف الجديدة التي يتفاعل معها الطفل، كالمدرسة بوصفها بيئة جديدة بالنسبة له.

وأكثر المخاوف انتشاراً في مرحلة الطفولة المتوسطة هي الخوف من المدرسة school phobia أو رفض الذهاب إليها، والذي يظهر عند التحاق الطفل بالمدرسة في حالات، أو بعد الدخول والاستمرار فيها في حالات أخرى، ويعبر هؤلاء الأطفال عن خوفهم هذا من خلال الصعوبة في المواجهة على الذهاب إلى المدرسة والذي يمكن ملاحظته في سلوكهم كمظاهر الاحتجاج والرفض والعناد والبكاء أحياناً، والندى بحجج غير مقنعة أحياناً أخرى وذلك عند إراشتهم الذهاب إلى المدرسة. ويقتربون هذا الاحتجاج - في كثير من الأحيان - باضطرابات اجتماعية ووجودانية حادة تفضي إلى أعراض مرضية بدنية مثل: الصداع وألم المعدة أو الغثيان أو القيء... إلخ.

ويذكر "كيلي" (1973) أن المخاوف المدرسية التي تظهر عند بعض الأطفال تجبر عن نفسها بطريق وأساليب متنوعة وبدرجات متباينة من الشدة والحدة، وأن هذه المخاوف تتوقف على عوامل متعددة منها:

1. عمر الطفل.
2. مستوى نضجه.
3. دور الحضانة التي مرّ بها.

فالأطفال الصغار الذين يلتحقون برياض الأطفال قد يكونون ويتعلقون تعلقاً شديداً بأمهاتهم، في حين يظهر الأطفال الأكبر سنًا هلعاً جداً في سلوكهم بالإضافة إلى مشاعر أخرى مثل الخوف من أذى قد يصيبهم أثناء ذهابهم إلى المدرسة أو بقائهم بها، لأن ذهاب الطفل إلى المدرسة يعدّ تغييراً مفاجئاً في حياته إذ ينتقل من مناخ الأسرة القائم على الارتباط العاطفي الطيب إلى مناخ المدرسة المشدد نوعاً ما. كما أن الطفل عند ما يواجهه لأول مرة في حياته، مناخاً كذاك الذي وجده في المدرسة كالنظام الصارم والأعداد الكبيرة من المرشدين والتلاميذ... كل هذا يعدّ مبرراً قوياً لخوف الطفل من المدرسة.

والخوف من المدرسة كغيره من أنواع المخاوف الأخرى التي يتعرض لها بعض الأطفال هو عبارة عن سلوك متعلم أو مكتسب يتعلمه الطفل خلال تنشئته الاجتماعية كالحمامة الزائدة والتدليل الزائد والخلافات الأسرية وقلق الأم على طفلها وشدة تعلقها به والخبرات غير السارة التي يتعرض لها الطفل في المدرسة... إلخ.

مفهوم الخوف من المدرسة:

يلاحظ في الطفولة المتوسطة (من السادسة حتى الحادية عشرة) بعض الانخفاض في حدة المخاوف البدنية المرتبطة بسلامة البدن، فتتجدد أن خوفهم من المرض أو الجراثيم يقل، كما يقل خوفهم من الأطباء، ويلاحظ أيضاً انخفاض في شدة الخوف من الكلاب والظلام.. إلخ

يمكنا القول إن هذا الخوف يزداد في هذا السن، وقد يكون عدم الاستحسان والنبذ من جانب الآباء عاملاً مساهماً في خوف الطفل من المدرسة، ويظهر في

مفهوم الخوف المرضي من المدرسة

مقدمة الصورة: الخوف من الفشل الدراسي أو الخوف من المعلمين أو الخوف من التلاميذ الكبار...

والخوف من المدرسة هو أحد مخاوف الطفولة الذي جذب الكثير من الانتباه والاهتمام، ليس لكونه معيقاً لننمو الطفل من الناحية النفسية والاجتماعية والانفعالية فحسب، بل لكونه خوفاً حقيقياً وتجنبياً صارماً لا يزول مع مرور الوقت في كثير من الأحيان.

وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء في تحديد هذا المفهوم، فمنهم من أطلق عليه مصطلح "رفض المدرسة School Refusal" ومنهم من أطلق عليه مصطلح "قلق الانفصال Separatism anxiety" ومنهم من عده شكلاً من أشكال "الهروب من المدرسة Truancy".

وقد وصفت الأبحاث المبكرة مصطلح عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة بمصطلح "الهروب من المدرسة"؛ فقد رد "كلاين" (1897) Kline هروب الأطفال من المدرسة إلى غريرة الهجرة المشابهة لهجرة الطيور والحيوانات في بعض الفصول.

(7 - 6.62)

بينما وصف "برودوين" (1932) Broadwin الهروب من المدرسة على أنه غياب متعمد من المدرسة رغم عدم وجود أسباب واضحة لذلك، حيث اعتبر أن الصعوبات التي تسبب في غياب الطفل عن المدرسة هي اعراض لاضطرابات في الشخصية يعني منها الأطفال ذوي "العصاب القهري" أو الذين لديهم شخصية عصابية من نوع العصاب القهري (Obsessive Neurosis).

وقد لاحظ "برودوين" أن هؤلاء الأطفال يخافون من شيء مرعب يحدث لأمهاتهم، مما يجعلهم يسرعون إلى المنزل للأطمئنان على أمهاتهم من أجل تخفيف القلق الذي يعانون منه. كما أن هؤلاء الأطفال يصرخون في أحياناً أخرى بأنهم خائفون من المدرسة أو خائفون من المعلم. أو خائفون من الأطفال الأكبر منهم

سن، إلا أن برودوين قلل من شأن هذه التصريحات كمبررات للحديث عن مزيد من الأحصنة ذات الصبغة الانفعالية العميقية الجنون.

(253, 65)

ويبدو أن الملاحظة الأولى التي قدمها برودوين حول خوف الطفل من حدوث مكروه لأمه أثناء وجوده في المدرسة ثبتت صحتها في كثير من الدراسات بعد ذلك، مثل: دراسات يونج، ميلاني كلاين (1932)، ويونج (1913)، وهذا يعني أن ما يبدو أنه خوف من المدرسة هو في الحقيقة خوف من مغادرة المنزل وترك الأم لوحدها.

هذا، وبعد "برودوين" أول من وصف الخوف من المدرسة، وكان توقيت متاخر يعده شكلًا من أشكال الهروب من المدرسة. ويعرف الطفل الخائف من المدرسة بأنه "الطفل الغائب عن المدرسة لفترات زمنية متقطعة بدءاً من أيام عدة أو شهور ولغاية سنة أو أكثر، وفي معظم مرات الغياب يكون الوالدان على علم بذلك". وقد مهدت الدراسات المبكرة من قبل "هيلي" (1915) و"بيرت" (1915) الطريق لتقديم الدليل بأن الخوف من المدرسة يشبه الهروب منها مع ضبط والدي فقير وبلادة عقلية وعجز في القدرات المزاجية، وتفكك أسري. أما "بيرت" فقد استخدم مصطلح الخوف من المدرسة بعد الحرب العالمية الأولى بقليل ليصف رد فعل الأطفال الذين ظهرت عليهم علامات الرعب والعنف الشديد عند إحضارهم إلى المدرسة لأول مرة. كما أفادت البحوث العلمية التي أجرتها بيرت في توضيح هذا المفهوم بخلال الحرب كان كثيرون من هؤلاء الأطفال الذين أخذتهم أمهاتهم إلى الملاجئ القريبة من المدرسة للاحتماء من الغارات الجوية، عانوا الخوف من المدرسة فيما بعد.

وقد لاحظ "بارترج" (1939) Partrige أن هناك مجموعة من الأطفال سماهم بالعصابيين Psychonerotic الذين يختلفون عن المراهقين من المدرسة، في أنهم كانوا مطيعين ومتكيفين بشكل جيد ويحبون المدرسة، والمشكلة الحقيقية التي كانوا يعانون منها هي فقدان الارتباط العاطفي بين الوالدين والطفل.

(2, 13)

مفهوم الخوف المرضي من المدرسة

هذا، وبعد "جونسون وفولشتاين، زويريك وسفنس" (Johnson 1941) من أوائل الذين استخدمو مصطلح الخوف المرضي من المدرسة بهذا الاسم؛ وذلك ليصفوا به ردود أفعال القلق المزمن لدى الأطفال، والذي يعدّ نتاجاً لاستمرار تغيبهم عن المدرسة، كما أكدوا أيضاً أهمية التمييز بين الهروب من المدرسة والخوف منها.

(2,81)

وتؤكد جونسون (Johnson 1957) في دراسة مبكرة لها أن الخوف المرضي من المدرسة ما هو إلا خطأ في تسمية زملة (مجموعة) معينة من الأعراض، وحقيقة الأمر: إنها تعبر عن قلق الانفصال الذي يحدث ليس فقط في مرحلة الطفولة الباكرة ولكنه يحدث أيضاً في السنوات التالية لهذه المرحلة. ثم آتي بعد جونسون عدد من العلماء الذين شكلوا مصطلح الخوف المرضي من المدرسة أمثل: "جولدبرج" (goldenberg 1953) وتالبوت (Talpot 1957) إلا أنهم لم يشيروا إلى الخوف المرضي من المدرسة ككيان ذوعي مستقل يمكن من خلاله تفسير ظاهرة الإحجام عن الحضور إلى المدرسة، وقد اعتقد هؤلاء العلماء أن سبب الخوف المرضي من المدرسة هو في الغالب اضطراب عاطفي، وميول وسواسية وهستيرية وذهانية.

(607,97)

بينما أشار باترسون (Patterson 1965) أيضاً إلى أن أغلب العلماء الذين درسوا حالات الأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة يتتفقون مع فكرة جونسون في أن المثير الذي يكشف عن ردود أفعال القلق عند الطفل لا ينبع من المدرسة ذاتها، بل يتمثل إلى حد ما في الموقف المعتبرة عن آثار انفصال الطفل عن والديه وبخاصة الأم.

(8,40)

تعريف الخوف المرضي من المدرسة

شغلت مشكلة رفض الطفل للمدرسة اهتمام الباحثين والمعالجين النفسيين في كل المجالات التي تُعنى بالأطفال والراهقين منذ نشأة هذه الظاهرة كموضوع بحث لدى العلماء في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث كانت كل صور الغياب المستمر عن المدرسة تعدّ هروباً حتى الأربعينيات من القرن الماضي، ثم تطور هذا المصطلح ليأخذ مفهومه الحالي كخوف الطفل من المدرسة تمييزاً عن ظاهرة الهروب أو قلق الانفصال عن الموضوع (الأم في الغائب) أو الغياب المبرر عن المدرسة.

و قبل الحديث عن الخوف المرضي من المدرسة أو رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة والذي يشكل موضوع بحثنا لابد من الحديث عن أشكال الغياب لدى الأطفال عن المدرسة: فقد يفشل الطفل - في العادة - في الذهاب إلى المدرسة نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب ذكر منها:

• الغياب المرخص به:

يشير إلى أولئك الأطفال الذين يبقون في المنزل بموافقة والديهم، وإدارة المدرسة بسبب أمراض حقيقة يعاني منها الطفل أو أحد الوالدين مما يستدعي من الطفل البقاء بجانبهم لرعايتهم.

• الحجز الوالدي المسموح به:

فقد يقرر والدي الطفل في بعض الأحيان بقاءه في المنزل بناءً على طلبهم، وذلك لمساعدةهم في مصاريف المنزل، أو العمل معهم في الزراعة أو التجارة أو ما شابه ذلك.

• التسرب من المدرسة:

غياب غامض من المدرسة كالفشل المدرسي.

• الهروب من المدرسة،

مفهوم الخوف المرضي من المدرسة

هو عبارة عن تغيب الطفل عن المدرسة لأيام كثيرة، قد تكون متقطعة أو مستمرة دون عذر شرعي، حيث يتظاهر الأطفال المتغيبون بأنهم يذهبون إلى المدرسة، إلا أنهم يتجهون إلى أماكن غير المدرسة كالجلوس في الحدائق العامة بدون علم الأهل والمدرسة بذلك، بمعنى آخر: إن الطفل الهاوب من المدرسة هو الذي يمضي الوقت المدرسي بعيداً عن المدرسة والمنزل (كالتجول في الشوارع والحدائق العامة على سبيل المثال)، بينما الطفل الرافض للمدرسة أو الخائف منها هو الذي يمضي معظم الوقت في المنزل.

والخوف المرضي من المدرسة School Phobia أو رفض المدرسة Refuse أو فوبيا المدرسة، هو عبارة عن اضطراب عصبي خاص بمرحلة الطفولة يشير إلى رد فعل عصبي تجاه المدرسة، بحيث يرفض الطفل النزهاب إلى المدرسة رغم إصرار والديه إلا أنه يفضل البقاء في المنزل، مع ظهور أعراض نفسية وهizioлогية ترافق حالة الخوف هذه لحظة إجباره للذهاب إلى المدرسة كالغثيان أو آلام الرأس...

ويعرف لال ولال (1979) الخوف المرضي من المدرسة (فوبيا المدرسة) بأنها عبارة عن حالة عصبية تتميز بأعراض الخوف والقلق الحاد، وغالبية الأطفال الذين يعانون من الخوف لا يستطيعون التعبير عن الأسباب الداعية لخوفهم.

(98 – 96,89)

هذا، ويصف "جون بولبي" (John Polley) (1991) الأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة بأنهم يرفضون الالتحاق بالمدرسة، ويظهرون قلقاً حاداً عندما يجبرون للذهاب إليها، ويكون عدم ذهابهم إلى المدرسة معروفاً لأبويهما، وتصاحب حالة الرفض هذه أعراضًا نفسية - بدنية (سيكوسوماتية) من نوع آخر

مثل: ألام البطن أو الشعور بالوهن الجسدي أو الغثيان رغم عدم وجود أدلة عضوية لهذه الشكاوى البدنية.

(193, 11)

ويعرف "أبو عوف" الخوف المرضي من المدرسة بأنه عبارة عن "خوف الطفل الشديد أو الحاد من الذهاب إلى المدرسة، ويبقى القلق الذي يرتبط بال موقف المدرسي قوياً وشديداً لدرجة أن الطفل لا يمكنه البقاء بالمدرسة، ويعمل بكل الطرائق والأساليب للعودة إلى المنزل والبقاء فيه".

(5, 41)

ويعرفه "فريدمان وأخرون" (1970) Freedman بأنه عبارة عن خوف الطفل الصغير المفاجئ من المدرسة، ورفضه الذهاب إليها، وينظر فريدمان إلى هنا الخوف إليه على أنه مظاهر قلق الانفصال Separation Anxiety.

أماهيسا (1984) Hisa فيعرف الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل بأنه خوف شديد ومباغٍ فيه وغير منطقي تجاه المثيرات والمواقف المدرسية المزعجة مثل: كبر حجم المدرسة، صعوبة الامتحانات، الفشل المتكرر، علاقات غير سوية مع الأقران والملئين، ضغط من قبل الوالدين على الطفل نتيجة لعدم تحقيقه لطموحاتهم، وضعف القدرات العقلية ... الخ.

(132, 97)

ويبدو من هذا، أن الخوف المرضي من المدرسة هو عبارة عن خوف شديد غير منطقي مرتبط بذهاب الطفل إلى المدرسة، والذي تنتج عنه فترات انقطاع كافية أو جزئية عن المدرسة، وقاصد هذا الخوف اضطرابات انفعالية ووجدانية شديدة تظهر في صورة أعراض مرضية كالخوف الحاد والمزاج المتقلب، والاتجاهات السلبية نحو المدرسة، وشكواوى جسمية دون أساس عضوي لها كأوجاع الرأس الغثيان والألم

البطن يلجا إليها الطفل كوسيلة دفاعية عندما يجبر على النهاب إلى المدرسة من قبل الوالدين وذلك لتأكيد بقائه في المنزل.

يتضح من التعريفات السابقة ما يلي: إن الخوف المرضي من المدرسة يتسم في القالب بالشدة، وأنه خوف غير معقول، ولا تبرره الوسائل المنطقية تجاه مكان غير مخيف بطبيعته كالمدرسة، كما أن الطفل الذي يعاني من الخوف المرضي لا يمكن تفسير أسباب خوفه، إضافة إلى مصاحبة هذا الخوف بعض الاضطرابات الجسمية والنفسية المتعددة.

الانتشار والبداية:

تشير التقديرات العشوائية التي تقوم على أساس نتائج الدراسات التي تم إجراؤها في عيادات الإرشاد النفسي إلى أن طفلاً واحداً بين كل ألف طفل يشخص بأن لديه رهبة أو خوف من المدرسة، وتحتفل هذه النسبة من منطلقة تعليمية إلى أخرى. وقد ذكرت صحيفة "الجارديان" في عددها الصادر 1959/11/23 أن عدد الأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي يتزايد كل عام؛ إذ أنه في منطقة تعليمية يبلغ عدد أطفالها حوالي (5) الف نسمة لا يعرض منهم على قسم الإرشاد النفسي للطفل إلا عشرون طفلاً فقط يعانون من الخوف المرضي من المدرسة. وبؤكد هذا الازدياد ما قاله رئيس الجمعية الوطنية البريطانية للخدمة الاجتماعية للطفل أمام المؤتمر السنوي للجمعية عام (1956) بأنه علم بوجود حالات متزايدة من الرفض للذهاب إلى المدرسة لدى الأطفال أكثر من قبل، وتساءل: لماذا نترك طفلاً من أسرة فاضلة، وله أبوان فاضلان، ولديه الإمكانيات المادية الجيدة حتى يتحول فجأة إلى طفل غير سوي؟

وقد ذكر "نيرستين" (Nursten) (1958) أن (8٪) من الأطفال الذين تم تحويلهم إلى قسم الإرشاد النفسي للطفل بمقاطعة "يورشكير" Yorkshire في مدة عامين كانوا مصابين بالخوف من المدرسة، لكن تقريراً آخر صدر في العام نفسه

أشار إلى انخفاض هذه النسبة إلى (3%) في مقاطعات "مانشستر" Manchester و"ليفربول" Liverpool. أما "بيرن" Burne (1966) فذكر وجود (12) حالة من بين تلاميذ المدارس البالغ عددهم (4000) طفل، ومعنى ذلك وجود (12) حالة لكل (300) طفل. بينما قدر "تشازان" Chazan بأن الخوف من المدرسة يبلغ تقريباً (10%) من عينة بسيطة دائمة في عدم الحضور إلى المدرسة. وفي العالم العربي أشارت الدراسة التي أجراها المؤلف عام (1995) إلى وجود (45) حالة من عينة قوامها (900) طفلاً تعاني الخوف المرضي من المدرسة بنسبة قدرها (5%).

وعلاوة على ذلك توجد بعض الأدلة حول نسب انتشار الخوف المرضي من المدرسة تعد غير واضحة بسبب:

1. عدم وجود دراسات مسحية تحيط إحاطة شاملة بهذه المشكلة.
2. عدم وجود العيادات النفسية المنتشرة في المراكز التعليمية حتى تتمكن من حصر وتشخيص حالات عدم الذهاب إلى المدرسة عند الأطفال.
3. ومن جهة ثالثة عدم رغبة كثير من الآباء الإفصاح عن مشكلة الخوف المدرسي لدى أبنائهم.
4. كما تثبت أنه من الصعب تقدير مدى انتشاره بين الأطفال، لأن معظم التقديرات كانت مبنية على مقابلات مع الأطفال من كل الأعمار، وكان هؤلاء الأطفال محولين إلى عيادات الإرشاد النفسي فقط، لكن النسب التي تم تسجيلها حتى الآن تتراوح ما بين (1 – 8%) بالنسبة لعينة شاملة من الأطفال فوق سن العاشرة والذين يذهبون إلى عيادات الإرشاد النفسي بانتظام.



وتبيّن الدراسات في هذا المجال أن رفض المدرسة لدى الأطفال يظهر بوضوح

في ثلث مراحل من العمر المدرسي هي:

- الأولى: عند دخول الطفل المدرسة أو بعدها بقليل، أي بين سن الخامسة والسابعة.
- الثانية: تبدأ من سن الحادية عشرة إلى سن الثانية عشرة من عمر الطفل.
- الثالثة: تبدأ من سن الرابعة عشرة، وهذه المرحلة ربما تختلف عن المراحلتين السابقتين في نوع ودرجة المشكلة النفسية، حيث تكثر فيها حالات الاكتئاب والقلق.

وهذا يعني: إن النتائج المترافقنة في نسب انتشار ظاهرة الخوف المرضي عند الأطفال من المدرسة لا تعني أن الخوف من المدرسة ينتشر في منطقة دون أخرى. وهناك ثلاثة احتمالات ممكنة – على الأقل – لتفصير ذلك.

الاحتمال الأول:

إن عدد الأطفال الذين يذهبون إلى مراكز الإرشاد النفسي للطفل بسبب موضوع الخوف من المدرسة أو أية مشكلات نفسية أخرى يعتمد من ناحية على العلاقات الشخصية بين المعالجين النفسيين في العيادة وكل من المدرسين وأولياء الأمور، ويعتمد من ناحية ثانية على مدى الاهتمام الذي يبذله هؤلاء جميعاً في التعامل مع هذه المشكلات؛ فالمعالج النفسي المحبوب يستقبل حالات أكثر من زميله غير المحبوب، ويزيد العدد كثيراً إذا عرف هذا المعالج أنه مهمتهم بشكل خاص بالأطفال الذين يرفضون الذهاب إلى المدرسة.



الاحتمال الثاني:

وهو أنه عندما تعقد المقابلة الأولى في العيادة بين المعالج والطفل، فإن السبب الذي يفسر المعالج على أساسه المشكلة قد لا يكون هو السبب الحقيقي لل المشكلة التي تواجه الطفل. ومن هنا يختلف التشخيص من معالج لأخر؛ فالطفل الذي يحوال إلى العيادة بسبب اضطراب عصبي قد لا يبلل فراشه إلا نادراً (التبول اللارادي)، ومع ذلك يرفض دائمًا الذهاب إلى المدرسة، والطفل الذي يعاني الخوف من المدرسة ربما يكون قد هرب من المدرسة مرة واحدة لوجود صعوبة في القراءة.

الاحتمال الثالث:

وهنا يثارسؤال مفاده: ما الذي يجعل بعض المعالجين يسجلون حالات الخوف من المدرسة أكثر من الحالات الأخرى.⁶

وللإجابة على هذا التساؤل: فقد يرى العلماء النفس الذين لهم إسهامات عظيمة في هذا المجال أن الصعوبة الرئيسية تتجلّى في التمييز بين الخوف من المدرسة والهرب منها، فما يشخصه معالج نفساني على أنه خوف من المدرسة قد يعده معالج آخر هروباً من المدرسة، وإنعكس صحيح، فقد وجد علماء النفس بأن العمر الذي يبدأ فيه ظهور الخوف من المدرسة يحدث بشكل أساسي بين (5 – 10) سنوات، حيث أشار "هير سوفا" و"دافيدسون" و"سميث" إلى أنه في بريطانيا يظهر ببداية الأضطراب غالباً في عمر (11) عاماً، وبعد ذلك مع حالات تظهر فيها أعراض الخوف من المدرسة بين (5 – 7) سنوات و(11 – 14) سنة.

فقد لاحظ "بلاج ويول" (1986) بأن الخوف من المدرسة يظهر خلال المدى العمري هذا، ولكنهم وافقوا على أن هناك فترات يكون فيها الخوف من المدرسة في الذروة، وهذه الفترات هي من (5 – 6) سنوات، من (11.12 – 13) سنة ومن (13 – 14) سنة، مع ذلك: فقد تتنوع التقديرات بشأن انتشار الخوف المرضي من المدرسة وفقاً للعينة المدرسية، فوجد كينيدي (Kennedy 1965) (17) حالة لدى كل (100)

مفهوم الخوف المرضي من المدرسة

طفل ممن هم في سن المدرسة وذلك في السنة الواحدة، ففي بريطانيا فقد قدر تشازان (1962) بأن الخوف المرضي من المدرسة يقدر بـ(1%) لعينة كاملة من الحاضرين في المدرسة خلال مدة عشر سنوات، وهناك بعض الدلائل تشير بأن حالات عديدة للخوف المرضي من المدرسة عند الأطفال تبدو غير مكتشفة نتيجة لعدة عوامل.

ومما تقدم نلاحظ أن ظاهرة خوف الأطفال من المدرسة لها أهميتها الخاصة لدى المشتغلين في مجال علم النفس والإرشاد النفسي في الدول الغربية بدليل وجود (4500) مقالة منشورة باللغة الانكليزية تطرقت إلى خوف الطفل من المدرسة، إضافة إلى الدراسات العلمية التي تناولت هذه الظاهرة بالدراسة سواء من خلال عقد المؤتمرات العلمية أم البرامج التلفزيونية المخصصة لهذه الغاية، لذلك يجب أن تتوقع مزيد من الاهتمام والانتباه والرعاية، ومزيداً من الحلول العلمية لهذه الظاهرة في البلاد العربية في السنوات القادمة على المستوى التشخيصي والعلاجي.

الأشكال التصنيفية للخوف المدرسي:

يأخذ الخوف المرضي من المدرسة بين الأطفال أشكالاً عددة تختلف فيما بينها في عدد من الجهات، وتتفق فيعدد آخر، وإذا فحصنا جهات الاختلاف والاتفاق، يمكننا الوصول إلى عدد من الأنواع يمكن النظر إليها من زوايا متعددة، ومن هذه الجهة، فقد حاول عدد من الباحثين والمهتمين بظاهرة رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة (الخوف المرضي من المدرسة) وضع تصنيف لها، يعتمد على مسار الخوف وبدايته وحالته (حاد - مزمن) أو شدته والعلاقة بين الوالدين والسن...الخ.

ونذكر من بين الباحثين الذين استطاعوا وضع تصنیفات لهذه الظاهرة: "هاهن وبيك" (Hahn and Peak 1957) و"كينيدي" (Kennedy 1965) و"هيروسف" (Hresov 1961 - 1970)، و"سميث" (Smith 1970)، و(بيرج) (Birch).

Berg ولذلك سوف نتحدث بشكل مختصر عن أهم التصنيفات الخاصة بالخوف المرضي من المدرسة كما جاءت في أدبيات البحث النفسي والتربوي والطبي.

أولاً: تصنيف هاين وبيك الثنائي؛ (Hahn and Peak 1957)

استطاع هذان الباحثان إيجاد تصنيف للأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة، وذلك من خلال دراسة قاما بها على (21) حالة من الأطفال الذين يشكون الخوف من المدرسة، حيث استخلصوا وجود نوعين من المخاوف المدرسية هما:

النوع المُصابي (Neurotic)؛

يتسم أطفال هذا النوع بكونهم أطفالاً صغاراً وأغلبهم من البنات، والذين ظهروا ردة فعل دراماتيكية، وبداية عاجلة لحالة الخوف، وأن هؤلاء الأطفال كانوا متكيفين بشكل حسن، وتتجلى المشكلة الرئيسية لهم بوجود عقدة من جهة الأم.

النوع المزمن (Chronic)؛

يكون أطفال هذه المجموعة أكبر سنًا من المجموعة الأولى، وقد تبين أنهم يعانون من اضطرابات اضطرابية أكثر وضوحاً من النوع الأول. إضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأطفال ظهروا تاريخاً مرضياً أساسياً من أمراض الخوف المرضي من المدرسة وخططاً واضحاً من المدرسة.

(197 – 196, 107)



ثانياً: تصنيف كينيدي الثنائي (1965): Kennedy

طور كينيدي (Kenndy, 1965) تصنيف هاين وبيك من خلال دراسته لثنت الحالات من الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة، حيث تم تقسيمهما إلى نوعين أساسيين استناداً إلى:

1. العمر.
2. البداية.
3. الشدة.
4. العلاقة مع الوالدين.

وهذان النوعان هما:

النوع الأول: الحاد (Acute) يتسم هذا النوع بـ:

1. النوعية الحالية تكون الأولى.
2. تكون البداية يوم السبت يسبقها مرض الطفل في الأيام السابقة.
3. تكون البداية حادة.
4. يتعرض لها الأطفال صغار السن تسبباً.
5. يصاحبها تعبير الاهتمام بالموت.
6. تكون صحة الأم معتلة جسدياً أو يكون هذا ما يعتقده الطفل أو يتوهمه.
7. يوجد اتصال قوي وشديد بين الوالدين.
8. الوالدان متواافقان.
9. يتفهم الوالدان دينامييات الأمور بسهولة.



الفصل الثاني

النوع الثاني، المزمن (Chronic) :

1. النوبة الحالية تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
2. تكون البداية يوم السبت يصاحبها مرض شديد للطفل.
3. تكون البداية بسيطة.
4. يتعرض لها الأطفال الأكبر سنًا بشكل نسبي.
5. لا يصاحبها تغيير الاهتمام بالملوّت.
6. صحة الأم لا تسترعي اهتمام الطفل.
7. اتصال ضعيف بين الوالدين.
8. لا يتفهم الوالدان ديناميّات الأمور بسهولة.
9. الأم عصبية والأب مضطرب الشخصية.
10. لا يبدي الوالد (الأب) أي اهتمام بالمنزل والأطفال.

(108, 173)

ثالثاً، تصنیف هیرسو夫 الثلاثي الأبعاد (Hersov 1960 – 1961) :

اما هيرسو夫 (1960 – 1961) فقد قسم الخوف المرضي من المدرسة إلى ثلاثة أنواع وذلك بحسب العلاقات داخل الأسرة، وهي على الشكل التالي:

النوع الأول:

الأم متسامحة، الأب مستكين والطفل في البيت ملتحٍ وكثير المطالب والطفل في المدرسة خجول وجبان.

النوع الثاني:

الأم متسامحة والأب مستكين والطفل في البيت مطيع والطفل في المدرسة خجول.

النوع الثالث:

الأم متسامحة بشكل زائد، والأب هادئ، الطفل في البيت عنيد، الطفل في المدرسة ودود.

ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:

النوع الثالث	النوع الثاني	النوع الأول	
متسامحة بشكل زائد	متسامحة	متسامحة	الأم
هادئ	مستكين	مستكين	الأب
ودود	خجول	خجول وجبان	الطفل في المدرسة
عنيد	مطبع	ملحاح وكثير المطالب	الطفل في البيت

رابعاً: تصنيف سميث (Smith 1970)

حلل سميث (36) ستة وثلاثين حالة تعاني من الخوف المرضي من المدرسة، إذ قسمهم إلى ثلاثة أنواع كما يلي:

النوع الأول:

الأطفال الذين أظهروا قلق الانفصال عن آبائهم حتى سن ثمان سنوات

النوع الثاني:

وهذا النوع يمثل الخوف المرضي الحقيقي من المدرسة، ويوجد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثانية سنوات وما فوق، ولم تظهر المشكلات لديهم من قبل، ويستمر هذا الخوف والقلق من المدرسة حتى ما بعد المدرسة.

النوع الثالث:

ويضم هذا النوع المراهقين الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة، إلى جانب أشكال أخرى من الأضطرابات مثل الاكتئاب الانسحاب الاجتماعي المرتبطة غالباً بخوف الطفل من فشل الدخول إلى مرحلة المراهقة بأمان.

(23, 62)

خامساً: تصنيف يول وهيرسوف وتريزدر Yule Hersov And Treseder

اقترح يول وهيرسوف وتريزدر (1980) إمكانية وجود أنواع أخرى من الخوف المرضي من المدرسة لدى الأطفال بناءً على التطبيقات العلاجية التي استخدموها في علاج هؤلاء الأطفال، وهذه الأنواع هي التالية:

النوع الأول:

قلق الانفصال ويحدث عند التحاق الطفل بالمدرسة لأول مرة.

النوع الثاني:

يحدث لأولئك الأطفال الرافضين للمدرسة لأقل من أسبوعين

النوع الثالث:

يحدث لدى الأطفال بعد وجود تغيير في المدرسة، أي انتقال الطفل من صفات إلى آخر، أو من مدرسة إلى أخرى، وذلك نتيجة انتقال سكن الأسرة إلى منطقة أخرى بعيدة عن مدرسة الطفل الحالية.



النوع الرابع:

وهذا النوع يتعلّق بخوف الطفل من الأطفال الأكبر منه في المدرسة والذين يحاوّلون إيتّهاء الطفل أو السخرية منه نتيجة لضعف تحصيله أو ملابسـه قديمة وبالية. ويحدث هذا النوع للأطفال الذين استمرّوا في المراقبة على حضور المدرسة لـدة تسع سنوات، وهي مشكلة كبيرة، حيث تكشف عن حالة من الاختناـب النفسي الشديد أو الفصام يعاني منه الطفل.

(24.62)

سادساً: تصنيف مارين (1969) :Marne

أما مارين فقد استطاعت أن توسيـع نطاق التصنيـف ذو البعـدين إلى أربـعة أبعـاد بهـدف تسهـيل عمـليـتـي التـشـخيصـ والـعـلاـجـ، وـهـنـهـ الـأـبعـادـ هـيـ التـالـيـةـ:

البعد الأول: قلق الانفصال (AnxietySeparation),

ويتناول الأطفال الذين يعانون من قلق الانفصال، وهم الذين لديـهم خـبرـةـ قـليلـةـ بالـذهـابـ إـلـىـ المـدـرـسـةـ أوـ رـيـاضـ الـأـطـفـالـ، وـيـظـهـرـ هـؤـلـاءـ الـأـطـفـالـ سـلوـكـيـاتـ أوـ اـضـطـرـابـاتـ مـزـاجـيـةـ مـخـتـلـفةـ عـنـدـمـ يـتـمـ حـثـهـمـ مـنـ قـبـلـ الـوالـدـيـنـ عـلـىـ الـذهـابـ إـلـىـ الـمـدـرـسـةـ مـثـلـ: الـبـكـاءـ، وـالـتوـسـلـ لـلـوالـدـيـنـ بـعـدـ رـغـبـتـهـ الـذهـابـ إـلـىـ المـدـرـسـةـ وـالـإـغـمـاءـ الشـكاـوىـ الـجـسـمـيـةـ مـخـتـلـفةـ كـعـوـجـعـ الرـاسـ أوـ لـمـ الـقـدـمـيـنـ أوـ وـجـعـ فـيـ الـبـطـنـ، يـسـتـخدـمـهـاـ الـطـفـلـ كـوسـيـلـةـ دـفـاعـيـةـ لـلـبقاءـ بـجـانـبـهـ مـنـ يـتـعـلـقـ بـهـ الـطـفـلـ وـخـاصـةـ الـأـمـ، وـهـنـهـ الـسـلـوكـيـاتـ يـزـوـلـ تـأـثـيرـهاـ وـفـعـالـيـتهاـ مـعـ مـرـرـ الـأـسـابـعـ الـقـلـيلـةـ الـأـولـىـ لـالـتـحـاقـ بـالـمـدـرـسـةـ الـابـدـائـيـةـ.



البعد الثاني: قلق بسيط الشدة (Mild acute anxiety)

وهو نوع من القلق يحدث للأطفال الذين انتظموا في الذهاب إلى المدرسة لفترة سنة أو سنتين ولم يظهر عليهم أي أعراض تتعلق برفض المدرسة فيما مضى، ولكن بعد هذه الفترة يعاني الطفل من قلق حاد وفجائي نحو المدرسة، حيث تصاحب هذه البداية السريعة والمباغتة أعراضًا تشبه أعراض الخوف المرضي من المدرسة ولكنها بسيطة وأقل خطورة.

البعد الثالث: القلق الشديد المزمن (Severe Chronic Anxiety)

وهذا البعد أو الفئة ينطبق على الأطفال ذوي الأعراض الشديدة في سلوكياتها تجاه المدرسة ورفض الذهاب إليها وغالباً ما تتطور هذه الأعراض المرضية لتصبح اضطراباً واضحًا يظهر في سلوك الطفل عندما يصل إلى مراحل متقدمة.

البعد الرابع: القلق النهائى (Psychosis Anxiety)

إذ يبدو هذا القلق على بعض الأطفال الذين تظهر لديهم أعراض الخوف المرضي من المدرسة كمعرض من أعراض ذهان الطفولة.

(67, 44)

وأخيراً يمكن القول: إن هؤلاء العلماء وغيرهم قد أكدوا الاهتمام بمشاعر واتجاهات الطفل الخاصة تجاه الخوف المرضي من المدرسة والأعراض المصاحبة له مثل: القلق الشديد والتعلق المفرط بالأشخاص المرتبط بهم وفقدان الشهية للطعام، والغثيان والقيء وشعوره بأنه طفل مهملاً لا قيمة له، وكذلك نظرة الأسرة الصريحة أو الضئدية نحو النظام التعليمي في المدرسة والأساليب العلمية المتبعة فيها.

علاقة الخوف المدرسي بالفاهيم الأخرى:

ما لا شك فيه أن السلوك الذي يبديه الطفل أثناء رفظه للمدرسة يشبه من قريب أو بعيد أشكالاً أخرى من الرفض للمدرسة، من حيث السلوك والأعراض والحجج اللامنطقية التي يعبر عنها الطفل، ولذلك سوف تحاول أن تفرق من الناحية الإكلينيكية بين هذا المفهوم والمفاهيم القريبة الشبه به.

أولاً، التمييز بين الخوف من المدرسة والهروب منها:

يختلف مصطلح الخوف المرضي من المدرسة عن مصطلح الهروب من المدرسة (الزوغان truancy)، فالطفل الهارب من المدرسة هو طفل لا يحب المدرسة، ويتحاشاها بصورة اعتيادية ومتكررة، إنه يهرب منها إلى مكان غير المنزل كالتجول في الطرقات أو في الحدائق العامة بشكل هرדי أو مع أقرانه الهاربين مثله، وقد دفعه إلى ذلك في كثير من الأحيان روح المقامرة، ومحاولة اكتشاف أفقاً أبعد من العالم الذين يتحرك فيه، وذلك دون علم الأهل (الأب، الأم) عن غياب ابنهم من المدرسة. وهؤلاء الأطفال غالباً ما يتظاهرون أمام الأهل أنهم يذهبون إلى المدرسة، ولكنهم في الواقع عندما يحين وقت ذهابهم إليها، يخرجون متوجهين إلى مكان آخر، ولكنهم في المدرسة يقضون فيه وقتاً ينتهي الدوام المدرسي، وعند هذه النقطة يرى كثير من علماء النفس أمثال: شيفر وميلمان (1989) وبلاج (1987) أن الطفل الهارب من المدرسة هو طفل متغيب عن المدرسة لأيام كثيرة، قد تكون متقطعة أو مستمرة دون حدود شرعية، مثل: المرض الجسمى أو العقلى، سوء الأحوال الجوية كالبرد القارس أو الحر الشديد دون معرفة الأهل بذلك أيضاً.

(492:27)



MOHAMAD KHATAB

ويعتقد بعض العلماء أن هناك أسباباً كثيرة تدعو هؤلاء الأطفال للهرب من المدرسة؛ فقد يكون الطفل مصاباً بمرض نفسى أو عقلى، أو قد يكون ناتجأ عن إشباع حاجة تأكيد الذات والتفاخر أمام الزملاء، فقد يكون تشجيع بعض الأطفال سبباً في الهروب من المدرسة، وقد يكون ناتجاً عن خلافات وصراعات بين الوالدين أو بين أحد الوالدين والطفل وخصوصاً الخلافات الشديدة التي يصعب حلها كالطلاق على سبيل المثال، مما يجعله غير قادر على متابعة دروسه في المدرسة بهدف التخلص من الواجبات الكثيرة المطلوبة منه، وقد يكون التفوق العقلى عاملاً من عوامل الهروب، إذا يشعر الطفل الهارب بالقليل لعدم وجود المتعة في الدروس التي يتلقاها في المدرسة، كما يشعر أن المعلومات التي يأخذها من معلميه في الفصل أقل من المعلومات التي لديه، أو قد يكون الهرب من المدرسة نتيجة الخوف من العقوبة التي يتلقاها من المدرسة لتقصيره وإهماله في أداء الواجبات المدرسية.

(713 – 712، 86)، (192، 191، 11)، (48، 29)

وفي هذا المجال قامت دراسات علمية عديدة مثل: دراسات بلاج ويول (Blagg and Yule 1978) وكوبر (Cooper) وهيرسوف (Hersov) هدفها توضيح الفروق بين الأطفال المهاجرين من المدرسة والأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إليها (الخوف من المدرسة)، حيث أظهرت نتائجها أن هناك ارتباطاً قوياً بين ظاهرة الهروب من المدرسة والسيطرة الزائدة من جهة الأبوين، وبين الهروب والجو الأسري المضطرب مثل الخلافات المستمرة بين الأبوين (الأم والأب) أو أية ظروف اجتماعية غير مناسبة، كما أن الظروف المدرسية لها أهميتها في هذا الصدد، وكذلك تأثير جماعة الأقران (الشلة). ومع أن المقترنات التي قدمها انتصار التحليل النفسي لتفسيير ظاهرة الخوف المرضي من المدرسة لم تساعد المعالجين النفسيين كثيراً في مساعدة هؤلاء الأطفال في المواجهة على الحضور إلى المدرسة، فلا تزال هناك أسئلة هامة تطرح نفسها حول هذا الموضوع مثل: هل هناك رد فعل يتنسم بالخوف من المدرسة ويختلف بما يعرف بالهروب منها؟ وإذا وجد شكى فيمكن أن تحدده و تعالجه؟.

أما أهم المعايير التي قدمها أتباع هذه المدرسة في التفريق بين الطفل الخائف من المدرسة School Phobia والطفل الذي يهرب من المدرسة هي:

إن الطفل الخائف من المدرسة يبقى قريباً من أمه عندما يكون خارج أوقات الدوام المدرسي، أما الطفل المهارب من المدرسة فإنه في هذا الوقت يكون خارج المنزل في الشوارع، والحدائق العامة ... إلخ.

وقد كانت المقارنة الأولى بين هذين الشكلين من عدم الذهاب إلى المدرسة ما قام به "وارن" Warren (1948) من خلال إجراء مقارنة بين ثمانى حالات تعانى حالة الهروب من المدرسة و(12) حالة تعانى الخوف المرضي من المدرسة، حيث توصل إلى أن الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يتسمون بأذىهم:

1. عصبيون.
2. قلقون بشكل حاد ومتكرر.
3. يعتمدون في كثير من الأحيان على آباءهم في قضاء حاجاتهم.
4. كما أنهم كانوا دائمي التحدي لأبائهم ولا يطيعونهم أحياناً ولكنهم لم يكونوا يهربون من المنزل ولم يكن لديهم أي ميل للانحراف كما هو الحال عند الأطفال المهاربين من المدرسة.

أما فيما يتعلق بالظروف المادية والتحصيلية: فقد كانت أحوال أسرهم المادية ونتائجهم في التحصيل الدراسي أفضلي إلى حد كبير من ظروف الأطفال المهاربين من المدرسة.



أما المناخ الأسري السائد لدى هؤلاء الأطفال، فقد بيّنت المقارنة التي أجرتها "هيرسوف" مجموعة من الفروق أهمها:

1. إن الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة كانوا ينحدرون في الغالب من أسر تكثر فيها اضطرابات الانفعالية، وإن أهمياتهم من النوع المتساهل، بينما آباء هؤلاء الأطفال كانوا سلبين وغير مهتمين بشؤون الطفل.
2. أما الأطفال الهاريين من المدرسة فكانوا غالباً من عائلات كبيرة العدد وغير مستقرة ولا تحترم الأعراف والتقاليد والقيم الاجتماعية السائدة بما فيه الكفاية.

ويمكن الإشارة إلى هذه المقارنة أن الأطفال الخائفين من المدرسة يعانون اضطرابات انفعالية نتيجة لاضطراب الكيان الأسري الذي ينتمون إليه، بينما الأطفال الهاريون من المدرسة يعانون من مشكلات اجتماعية وهذه المشكلات إما أن تكون في الأسرة أو في الوسط الخارجي سواء مع الزملاء أم في المدرسة، لذلك يلجأ الطفل إلى الهروب إلى أماكن أخرى غير المدرسة ليتحقق في ذلك المكان إشباع حاجاته الخاصة. وتأكيداً لهذه النقطة قام "كوبير" (1962) Cooper بتحليل استبيانات أجرتها لجان إرشاد الطفل، إذ أظهرت النتائج أن هروب الطفل من المدرسة هو في الواقع مشكلة اجتماعية وليس نفسيّة. وبناءً على هذه النتيجة كان التعامل مع هذه المشكلة التي تظهر عند الأطفال من خلال مؤسسة الخدمة الاجتماعية وليس من خلال المؤسسات الإرشادية، ثم قام بإجراء مقارنة بين مجموعتين كانوا يرفضون الذهاب باقتضان إلى المدرسة، أخذت إحدى المجموعتين على أساس المعلومات الواردة في ملفاتهم في لجنة إرشاد الطفل، والتي تفيد بأنهم يدخلون في عدد الأطفال المصابين بالخوف من المدرسة، بينما أخذت المجموعة الأخرى من سجلات إدارة الخدمة الاجتماعية في المدرسة، والتي كانت تعدادهم متغيرين، وقد تم أيضاً اختيار مجموعتين ضابطتين، وعقدت مقارنة بين المجموعات الأربع فيما يتعلق: بحجم العينة والفصول التابعة لها ونظام إدارة المدرسة وطرق

التدريس وأسلوب التثواب والعقاب المستخدم في تلوك المدارس والعلاقة بين المدرسة والمنزل. وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: عدم وجود فروق جوهريّة بين المدارس التي يحضرها أطفال من المجموعتين الخوافيف والهاربيّة وكانت هناك بعض الأدلة على أن رفض الذهاب إلى المدرسة يحدث عندما يغير الطفل المدرسة أو الصدف. كما وجد بشكل عام أن كلاً من المتهربين والأطفال الذين يعانون من الخوف المدرسي لم يعانون تغييرات كثيرة في تلوك الأبعاد السابقة بالمقارنة مع المجموعتين الضابطتين. أما فيما يخص القدرات العقلية والتحصيلية لمؤلف الأطفال؛ فقد أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة أكثر ذكاءً وتحصيلاً مقارنة مع مجموعة الأطفال الهاربين من المدرسة؛ فقد بلغ حاصل ذكاء الأطفال الخالفين من المدرسة (104) بينما حصل الأطفال الهاربون على (85) درجة.

إننا بدورنا نتفق مع النتيجة الأولى، فالأطفال الذين يعانون الخوف المدرسي يعانون اضطراباً فيما يتعلق بالإدراك الأسري العاطفي والوجوداني، فهم الأطفال المدللون في نظر أمهاتهم وأبائهم، لذلك نجد أن الرابطة العاطفية بين الطرفين قوية وزيادة اهتمام الأهل بالطفل من حيث إشباع حاجته النفسية والجسدية. بينما في حالة الأطفال الهاربين من المدرسة فهناك مشاغل كبيرة محاطة بالأسرة، تجعل الأسرة في كثير من الأحيان تعزف عن الطفل لأن هناك عدداً كبيراً من الأطفال ولكل حاجة الخاصة، والأسرة غير قادرة على تأمين هذه الحاجات النفسية والجسمانية للطفل، لذلك عندما يذهب الطفل إلى المدرسة لا يوجد هنا الإشباع الذي افتقده في بيته الأسري وهذا يقع الطفل في صراع وإحباط يظهر في وجه إشباع حاجاته النفسية، لذلك تراه يلتجأ إلى البيئة الخارجية كحمل أخير لعله يجد فيه الإشباع المفقود للحاجات الأساسية، بينما الطفل الذي يعاني الخوف المدرسي يرى في المدرسة أنها غير قادرة على إشباع حاجاته المشبعة كالاتي داخل المنزل؛ لذلك تراه يستخدم أساليب دفاعية متعددة للبقاء في المنزل.

وقد أكد هذه النقطة كل من بلاج (1989) وبيول (1986) حيث صرحا بـ أن الأطفال الهاريين لديهم خبرات مؤلمة واضطرابات في المنزل مقارنة بالأطفال الخائفين. وقد لا حظ بلاج أن (74٪) من الأطفال الهاريين من المدرسة أتوا من بيوت مضطربة، وإن (50٪) من آباء هؤلاء الأطفال متوفين أو منفصلين عن الأسرة أو هاربين من المنزل كأسلوب علاجي.

يتضح من نتائج هذه الدراسات أن هناك تبايناً واختلافاً في تشخيص وأسباب المشكلة التي يعاني منها كل من الأطفال الهاريين من المدرسة والأطفال ذوي المخاوف المدرسية من حيث: العلاقات الاجتماعية، والمناخ الأسري والقدرات العقلية والتحصيلية.

ويمكن إجمال الفروق الجوهرية بما يلي:

أولاً: الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة:

1. هؤلاء الأطفال يتغيبون في العادة عن المدرسة دون عذر شرعي.
2. يقضون وقت تغيبهم عن المدرسة في البيت ويجانب الأم.
3. والدهما في الغالب على علم بتغيبهم عن المدرسة.
4. يتميزون بالغياب المتصل عن المدرسة لفترات قد تطول أو تقصير.
5. يتمتعون بتحصيل دراسي في حدود المتوسط كما تسجلها تقاريرهم المدرسية وقدرات عقلية جيدة.
6. يعاني الغالبية العظمى من اضطراب انفعالي وشخصي.
7. لا تظهر عليهم في الغالب أية تصرفات سلوكية شاذة كالسرقة أو التحرير ... إلخ.



ثانياً، الأطفال المتهربون من المدرسة:

1. تغيب هؤلاء الأطفال عن المدرسة دون عذر شرعي.
2. يقضى هؤلاء الأطفال وقت تغيبهم عن المدرسة بعيداً عن البيت مثل الشوارع والحدائق العامة.
3. أباء هؤلاء لا يعلمون تماماً عن تغيب طفليهم عن المدرسة.
4. مستواهم التحصيلي وقدراتهم العقلية دون المتوسط.
5. يذهبون إلى المدرسة على فترات متقطعة.
6. يعني معظمهم ضعفاً في التوافق الاجتماعي.
7. يمارسون بعض السلوكيات المضادة للمجتمع كالسرقة أو العدوان أو التحرير أو الأفعال الجنسية المحرمة.
8. يفتقر هؤلاء الأطفال إلى إشباع حاجاتهم النفسية في كل من البيت والمدرسة، مما يدفعهم لهذا السلوك إلى تعويض النقص الذين يعانون منه.
9. تظهر على هؤلاء الأطفال أعراض عدم الارتباط النفسي عندما يكونون في المنزل أو في المدرسة، لكن لا تظهر عليهم الأعراض الجسمية كالتالي تلاحظ عند الأطفال ذوي المخاوف المرضية من المدرسة مثل: اضطرابات النوم، الالم البطن، وجع الرأس، وذلك حين يتوجهون إلى المدرسة في الصباح.

وأخيراً يمكن القول: إن هذين النمطين من الأضطرابات الانفعالية في الطفولة: الخوف المرضي من المدرسة والهروب من المدرسة لها أسبابهما وعواملهما الخاصة، فالخوف من المدرسة يرتبط بصورة مباشرة بالقلق الشديد والتعلق الزائد، إضافة إلى الإهمال أو التنبذ أو الحماية الزائدة من قبل الوالدين، بينما الطفل الهارب من المدرسة هو طفل لم يلق الإشباع الكافي لاحتاجاته في كل من البيت والمدرسة على حد سواء.



ثانياً، الخوف من المدرسة وقلق الانفصال: Separation Anxiety

قد يعاني بعض الأطفال في باكورة حياتهم من "اضطراب قلق الانفصال" وخصوصاً عندما يبتعد عن أمه أو من يقوم مقامها في تربيته. وفي بعض الأحيان يقلق الطفل لابتعاد أبيه عنه، إذ يقلق على مصيرهما بأنهما سوف يصادان بمكرره وهما بعيدان عنه، وقد تأتي المخاوف من أن هناك مكررها يحدث له، أو أن أحد الناس سيخطفه أو يقتله وهو بعيد عن الشخص المتعلق به.

ومن مظاهر هذا القلق لدى الطفل: الرفض بالتوجه إلى المدرسة والاتصال بها مستخدماً أساليب دفاعية كالتمارض أو الشكاوى البدنية أو الحجج التي لا أساس لها من الصحة من أجل البقاء بالجوار من أمه، وقد يشعر الطفل في هذه المرحلة بالاكتئاب، وقد تبدو عليه مظاهر الانسحاب والعزلة في حالات ابتعاده عن أمه أو من يقوم مقامها.

(540, 538, 37)

أما الصورة التشخيصية لقلق الانفصال كما تحدث عنها منظرو قلق الانفصال وخصوصاً جون بولبي "وغيره من العلماء، فيمكن الحديث عنها في الأمور التالية:

قلق شديد حين ينفصل الطفل عن الشخص الذي تربطه به علاقة طيبة، ويبدو هذا واضحاً من خلال الأعراض التالية:

- أ. قلق غير منطقي حول الابتعاد عن شخص ما متعلق به، والبقاء وحيداً بمعزل عنه، وخصوصاً إذا لم يعذ هذا الشخص أو (موضوع التعلق).
- ب. قلق غير واقعي وغير منطقي حول الانفصال والعزل عن علاقة حميمة، إذ يشعر بأنه سوف يفتقد ذلک الشخص وأنه ضحية لحادث ما.
- ج. رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة والبقاء مع الشخص المتعلق به.

مفهوم الخوف المدرسي من المدرسة

- د. تجنب مستمر للبقاء وحيداً في المنزل والشعور بالاضطراب الانفعالي الشديد إذا افتقد الشخص الذي يرتبط به، أو حين يبقى وحيداً عنه.
- هـ. أحلام وحوابيس تتعلق بالانفصام عن الشخص المتعلق به الطفل.
- وـ. شكاوى جسمية أيام المدرسة مثل: الصداع وألم البطن أو وجع في الرأس أو ألم في الساقين ... الخ.
- زـ. الضعف الجسدي الواضح (الهزال) بسبب الانفصام عن الشخص المتعلق به.
- حـ. اضطرابات انفعالية مزاجية وسلوكيات غير سوية مثل: البكاء، والمزاج المتقلب، والتبول اللاارادي وخصوصاً الأطفال الذين لم يتجاوزوا عمرهم السادسة، إضافة إلى التوترات العصبية والملع.
- طـ. انسحاب اجتماعي من الواقع التي لا يجد ضمنها الشخص المتعلق به.
- يـ. رفض مستمر للذهاب إلى النوم دون أن يكون في محيط أو بجانب الشخص الذي هو شديد الارتباط به.

(658,2)

وقد ذكر "كارى" Cary حالة طفل عمره تسعة سنوات تمت إحالته إلى مركز الصحة النفسية من قبل المعلم بسبب عدم قدرته المواظبة على المدرسة. وقد قال الطفل للمرشد بأن حالي تبدوا في خوفه من المدرسة، وقد بدأ منذ شهرين مضيا عندما بدا عليه قلق شديد من المدرسة دون سبب واضح، وفجأة شعر بالمرض، وألم في المعدة، واضطراب في التنفس، والعصبية الزائدة حين يكون موجوداً في المدرسة. وقد تحدث المرشد مع والدته عبر الهاتف، حيث صرحت له بأن طبيب الأسرة لم يلاحظ أي شيء غير عادي عند الطفل، ولكن هذا الطفل يبدي رفضه المستمر في الذهاب إلى المدرسة، ويزداد هذا الرفض كلما اقترب موعد ذهابه إلى المدرسة. وقد عبرت الأم عن سلوك طفلها داخل المنزل بالقول: إنه يشاهد برامج تلفزيونية وأنه مع أخته يقومان بأنشطة متعددة مشتركة كزيارة الأقارب وشراء الحاجات من السوق، وحين سئلت الأم عم إذا كان يقوم بأي نشاط بمفرده، قالت: يشاهد برامج تلفزيونية، وحين سئلت الأم عم إذا كان يقوم بأي نشاط بمفرده، قالت: إن كل

انشطته مع أخيه. وعند سؤالها عن أسباب الحالة أشارت إلى أن عدم ذهابه إلى المدرسة يرتبط بموت والده منذ فترة، حيث كانت تربطه علاقة حميمة به، كما أن موت والده كان عاملاً مؤثراً في نفسية الطفل.

(219,45)

هذا، وينشر قلق الانفصال بشكل واضح بين الأطفال والسبة نسبياً بين الذكور والإإناث. فقد أظهرت نتائج دراسة عباس محمود عوض ومدحت عبد المطيف (1990) عدم وجود فروق جوهيرية دالة بين الجنسين (الذكور - الإناث) في قلق الانفصال.

(97,30)

كما أشار كل من جريينا فرانسيس francis وكينيثيا last "last" و"كاييد ستاروس" (1987) إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين الذكور والإإناث في اضطراب قلق الانفصال. (30, 97) وهذه النتائج عارضتها نتائج دراسات أخرى قام بها "كازادين kazdin" و"هيرسين Herrsen" إذ أظهرت ارتفاع متوسط درجات الإناث نسبياً عن متوسط درجات الذكور في معظم متغيرات قلق الانفصال.

(657, 653, 88)

وقد يحدث هذا الاضطراب لدى الأطفال قبل سن المدرسة، وغالباً بعد حدوث أو موقف نفسي ضاغط، وأنه أكثر حدوثاً لدى الأطفال الذين تربطهم بأسرهم علاقات حميمة ورعاية زائدة، كما لوحظ أنه يلعب دوراً في الخوف المرضي من المدرسة، إذ يعتقد "ايزنبرج Eisnberg" (1958) (1987) ويلاح وغيرهم من علماء النفس أن قلق الانفصال هو السبب في ظهور الخوف المرضي من المدرسة، كما أنه المسؤول عن كثير من اضطرابيات الرشد، كالشعور بعدم الأمان والضياع، والخوف من الأماكن المفتوحة (Agoraphobia).

(61 – 57,16)

إن مصطلح الخوف المرضي من المدرسة حكماً يرى "بالتر" (1985) هو في الغالب مصطلح غير دقيق، لأن السبب الرئيس يتجلّى في خوف الطفل من الانفصال عن والديه أكثر منه خوف حقيقي من المدرسة، وقد يكون هذا الخوف ناتجاً عن مولود طفل صغير في المنزل، أو صراعات أو خلافات بين الوالدين، لذلك يربط هؤلاء مخاوفهم بالمدرسة (مخوف مزاج) بدلًا من خوفهم عن موضوع تعلقهم.

(114,59)

ويختلف مفهوم الخوف المرضي من المدرسة عن مفهوم قلق الانفصال؛ فقلق الانفصال عبارة عن القلق الذي يعتري الطفل في باصورة حياته وحتى مراهقتة من الانفصال عن أحد الوالدين أو كليهما، أو عن القائم برعايته، وهو يرتبط بالخوف من الانفصال عن الأم. (9, 83) فالطفل الذي يعاني قلق الانفصال، لديه إحساس بالخوف من التغيير، واضطرابات وجدانية أشد مما لدى الطفل الذي يعاني من الخوف المرضي من المدرسة.

وبعد قلق الانفصال من جهة أخرى من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الخوف المرضي من المدرسة عند الطفل. فالطفل في هذه الحالة يكون شديد الارتباط والتعلق بأمه، ولكنه عندما يذهب إلى المدرسة يدرك أن هناك شيئاً ممكروهاً سوف يحدث لأمه أثناء وجوده في المدرسة، وذلك لعدم شعوره بالاستقرار أثناء ابعاده عنها ومن ذلك فقد استنتج كثير من الباحثين أمثل بلاج وهيرسوف وهيسا Hisa, 1984, Blagg 1987, Hersov, 1960 أن كثيراً من الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة هم في الواقع شديدو الارتباط والتعلق بأمهاتهم، أو من يقوم برعايتها (الأم البديلة)، وأنهم أيضاً يعتمدون عليهم في كثير من أمور حياتهم اليومية مثل: اللبس، الأكل، النوم، الذهاب إلى رحلة ... وفي المقابل فإن أمهات هؤلاء الأطفال في مثل هذه الحالة يتغاضبن مع أطفالهن بشكل يجعل سلوكيهن تعزيزاً قوياً لسلوك أطفالهن نحوهن، ونحو المدرسة؛ فهن يعملن على

مساعدة أطفالهن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الاعتماد عليهم في إشباع حاجاتهم اليومية. فالطفل الذي يعاني هذا الخوف بإمكانه أن يشبع حاجاته الجسمية بنفسه، ولكنه يفضل أن تقوم أمه بذلك نيابة عنه، حتى يكسب ودها وحبها، ويظل بجانبها دائماً.

(44 - 43, 12)

هذا، ويرى الكثير من علماء مدرسة التحليل النفسي أمثال أوتو رانك O, Rank ان الانفصال عن الألم هو الصدمة الأولى التي تثير القلق الأولي primary anxiety، ويصبح كل انفصال فيما بعد من أي نوع سلبياً لظهور القلق، فالقطام يثير القلق لأنه يتضمن انفصالاً عن ثدي الأم، والذهاب إلى المدرسة يثير القلق لأنه يتضمن انفصالاً عن الأم، فالقلق في رأي رانك إذاً هو الخوف الذي تتضمنه هذه الانفصالات المختلفة.

(35, 25)

وقد عارض هذه الفكرة "سيجموند فرويد" مؤسس مدرسة التحليل النفسي حيث قال: "لم أقم بشرحني لنشوء حالات الخطر المختلفة عن نموذجها الأصلي وهو عملية الميلاد أن أقرّر إن كل حالة مثيرة للقلق فيما بعد، إنما تجعل الحالة السابقة".

حقاً إنه كلما تقدم نحو "الأن" Ego تفقد حالات الخطر السابقة قوتها وتقل أهميتها، بحيث يمكن القول: إن كل مرحلة من مراحل حياة الفرد لها خلودها المناسبة المثيرة للقلق. فخطر العجز النفسي يكون مناسباً لمرحلة الحياة التي يكون فيها الأنما غيراً ناضجاً، وخطر فقدان الموضوع - الألم غالباً - يكون مناسباً للطفولة المبكرة، حينما يكون الفرد لا يزال معتمداً على الآخرين، وخطر الخصاء يكون مناسباً للمرحلة القضيبية، والخوف من الأنما الأعلى "super ego" يكون مناسباً لمرحلة الكمون.

هذا، وتستند البيانات المختلفة التي أجريت على الأطفال الذين يعانون من قلق الانفصال والأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة إلى أن السبب الرئيس للخوف المرضي من المدرسة يرجع إلى قلق الانفصال الذي يشعر به كل من الأُم والطفل عند ذهابه إلى المدرسة، وهذا القلق يتولد عن الرهبة الزائدة والتدليل الزائد الذي يتلقاه الطفل من الأم، فيصبح الطفل متعلقاً بها وهي متعلقة به أيضاً ولا يستطيع أي منهما الابتعاد عن الآخر. ونتيجة لذلك ت تعرض الأم لقلق الانفصال عند ذهاب طفلها إلى المدرسة، لأن الطفل لا يرغب في مغادرة البيت وترك أمه لوحدها. والأم بدورها تخاف من ابتعاد طفلها عنها فتظهر أعراض الخوف من المدرسة واضحة لدى الطفل نتيجة لذلك، والتي تعدّ رمزاً لقلق الانفصال عند الأم. وهذا الافتراض تؤكده الدراسات العلمية في هذا المجال، حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أن قلق الانفصال قد يصل إلى نسبة (85%) لدى معظم الأمهات، وذلك لأنَّ أغلب الأمهات اللاتي لديهن أطفال يشكون من الخوف المرضي من المدرسة، كنَّ يعذبن من قلق ابتعاد أطفالهن عنهن بذهابهم إلى المدرسة. وهذا يشير إلى الدور الذي تلعبه عملية اعتماد الطفل على أمه، وأن قلق الانفصال يسبب له الخوف المرضي من المدرسة.

أما المراحل التي يمر بها الطفل الذي يعاني قلق الانفصال فيصنفها

"بولبي" في ثلاث مراحل هي:

1. مرحلة الاحتجاج.
2. مرحلة الحزن والأسى (اليلاس).
3. مرحلة عدم الاهتمام (اللامبالاة).



الفصل الثاني
اولاً: مرحلة الاحتجاج:

وتبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد انفصال الطفل عن أمه، أو تأخر عنده بعض الوقت، ويمكن أن تدوم من ساعات عدة إلى أسبوع أو أكثر، يشعر الطفل من أثناءها بالضيق الشديد لفقدان أمه، ويفتح بكل الوسائل الممكنة لاستعادتها مستخدماً كل طاقاته، إنه يبكي ويصرخ ويلقي بنفسه على الأرض، أو يرمي لعبه في كل اتجاه.

ثانياً: مرحلة الحزن والأسى:

وهي مرحلة اليأس وفقدان الأمل وفيها يظهر الطفل القلق لغياب الأم عنه، ويفقد الأمل بعودتها تدريجياً، ويتميز سلوكه في هذه المرحلة بانخفاض الحركات النشطة، وهو يبكي برتابية أو بشكل متقطع، وتغلب عليه الانطوائية وقلة النشاط، ويبدو وكأنه في حالة حداد عميق.


ثالثاً: مرحلة عدم الاهتمام واللامبالاة:

يمكن في هذه المرحلة ملاحظة اهتمام الطفل بما حوله، فهو لا يرفض الآخرين، ويقبل الطعام واللعب مع الآخرين، ويميل شيئاً فشيئاً إلى التبادل الاجتماعي وإلى الابتسام. وعندما تعود الأم بعد غيابها عنه فإنه لا يكرث بها ويبقى بعيداً عنها وكأنه لا يعرفها من قبل، ويبدو فاقد الاهتمام بها وكان عودتها لا تعنيه.

(192,41)



والمخطط التالي يوضح المراحل التي يمر بها قلق الانفصال بما يلي:



يبدو من المخطط أن القلق الذي يظهره الطفل نتيجة لغياب أمه عنه يثير فيه الاحتجاج والرفض لهذا الغياب، وعندما تطول فترة الغياب يشعر الطفل باليأس وفقدان الأمل بعودة الأم مما يثير في نفس الطفل شعوراً باليأس والحزن، وبعد ذلك يمر الطفل بمرحلة عدم الاهتمام واللامبالاة لهذا فقد، ويصبح غير مكترث بغيابها أو في حال عودة الأم إليه.

يلاحظ من هذا العرض أن المظاهر الإكلينيكية لقلق الانفصال تظهر من خلال:

- الرغبة في البقاء في المنزل بجانب الأم.
- الشعور بالضياع والقلق من المواقف المفاجئة الجديدة.
- الشعور بالقنوط واليأس والاكتئاب، الكوابيس التي تدور حول الانفصال.
- إدراك الطفل للشقاق الوالدي أو الخلافات والصراعات بين الزوجين.
- وتشمل الأعراض الاكتئابية المصاحبة لقلق الانفصال:
 - الشعور بالحزن.
 - فقدان الشهية للطعام.
 - عدم الرغبة في ممارسة الألعاب مع الأقران والأقارب.
 - قلة النشاط والحيوية.
- الأعراض الجسمية مثل الصداع بالإضافة إلى الأرق وأحياناً الأحلام المزعجة التي قد تتطور إلى كوابيس.

كما تشمل الأعراض الرغبة في البقاء بالمنزل وخوفه من ترك المنزل الذي يحوي في طياته خوفاً من أن يترك أحد الوالدين المنزل، حيث يعتقد الطفل أن بقاءه في المنزل على الأقل سوف يمنع هذا المكروه، وقد يكون هنا الشعور حقيقياً أو متوهماً من قبل الطفل. فحين يستمع الطفل إلى شجار الوالدين بصورة خاصة، وإن كان لهذا الشجار معنىًّا أو متكرراً، يستشعر الطفل في ذاته هاجساً بالتهديد من انفصال الوالدين وابتعادهما ولو لفترة، وهذا من شأنه أن يخلق لدى الطفل حالة من الشعور بالضياع.

وفي هذا السياق تتفق الأعراض الإكلينيكية لقلق الانفصال - المشار إليها آنفاً - مع ما اشتغلت عليه البنية العالمية لقياس قلق الانفصال الذي وضعه عباس محمود عوض ومدحت عبد الحميد عبد اللطيف (1990)، حيث وجدا أربعة عوامل تُعد المسؤولة عن قلق الانفصال عند الطفل وهي:

1. الأعراض الاكتئابية المصاحبة لقلق الانفصال.
2. الشعور بالتهديد من الانفصال عن الوالدين.
3. خوف الطفل من ترك المنزل.
4. إدراك الطفل للخلاف الوالدي.

(117-97, 30)

أما فيما يتعلق بنقاط التشابه بين قلق الانفصال والخوف المرضي من المدرسة، فقد يرى بعض الباحثين في هذا المجال أمثال "بلادج" (1987) و"إيزبيرج" (1958) و"جون بولبي" (1973) و"Eisenberg" (1958) بقولهم أن قلق الانفصال الذي يعني منه الطفل نتيجة تعلقه وارتباطه بأمه، هو السبب الرئيس المسؤول عن خوف الطفل أو أنه عرض رئيس من الأعراض المكملة لذلك الخوف.

ومن هذه النقطة يرى هؤلاء الباحثون أن المظاهر الإكلينيكية لكل من الخوف المرضي من المدرسة وقلق الانفصال تتشابه إلى حد كبير؛ كالتالي: رغبة في

مفهوم الخوف المرضي من المدرسة

البقاء في المنزل، الخوف من الظلام، الذعر الشديد، ظهور بعض الأعراض الاكتنابية والشكواوى الجسمية، والخوف من الأماكن المفتوحة.

(598 - 595, 95)

إلا أن قلق الانفصال من زاوية أخرى يختلف عن الخوف المرضي من المدرسة؛ حيث أن الطفل الذي يعاني قلق الانفصال لديه إحساس بالخوف من التغيير، القلق الحاد، الأعراض البدنية المختلفة ذوياً ما عن اعراض الخوف المرضي من المدرسة، بداية اضطراب تكون أبكر من بداية الخوف المرضي من المدرسة، واضطرابات وجدانية تكون أشد مما لدى الطفل الخائف من المدرسة.

والجدول التالي يوضح هذه الفروق:

الخوف المرضي من المدرسة	قلق الانفصال	
يبدأ في العادة في سن السادسة أو السابعة	يبدأ اضطراب بالظهور بدءاً من السنة الثانية والثالثة	البداية
تكون أشد وطأة وتواترها تغيرات فيزيولوجية	تكون أخف وطأة	الأعراض
أقل حدة	أكثر حدة	القلق

ويفيد الصدّد أشار "لاست" last (1987) إلى مايلي؛ ليس كل الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يظهرون قلق الانفصال، وليس كل الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يظهرون قلق الانفصال، وليس كل الأطفال الذين يعانون قلق الانفصال يعانون من الخوف المرضي من المدرسة.

(656 - 653, 88)

الوضع الاجتماعي والخوف من المدرسة:

أظهرت نتائج بعض الدراسات أن الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة موزعون بالتساوي بين الجنسين (الذكور - الإناث)، وأنه لا توجد علاقة بين خوف الطفل من المدرسة والطبيقة الاجتماعية، وإن المشكلة ليست لها علاقة بعمر الأخوة أو ترتيب الولادة.

بينما أسفرت دراسات أخرى عن نتائج متضاربة بل متناقضة مع نتائج الدراسات الأولى إذ وجدت تلك الدراسات أن بعض الأطفال الذين يعانون خوفاً مرضياً من المدرسة يأتون من أسر ذات مستوى اجتماعي / اقتصادي عالي مقارنة بالآخرين من المدرسة.

(33 – 32,69)

وتفق هذه النتيجة مع ما ذهب إليه لال ولال (1979) حيث قالا: إن الأطفال الذين يهربون من المدرسة ينحدرون من عائلات وخلفيات اجتماعية واقتصادية عليا، وهذا الأمر جعلهم يفترضون ما يلي: إن الوالدين من هذه الطبيعة يمكن أن:

- أ. يكون تدريهم توقعات مدرسية لأطفالهم، وبهذا يضعون ضغوطاً أكبر على أولادهم من أجل إبراز هذه التوقعات لدى أطفالهم.
- ب. يكون الآباء أكثر تعليقاً وارتباطاً بأطفالهم، وبهذا يكونون أكثر قلقاً واستياءً لجعلهم يحضرون إلى المدرسة.

اما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وجد أن معظم الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة ينحدرون من الطبيقة الاجتماعية المتوسطة؛ ولكن الأمر ليس كذلك في بريطانيا، فمثلاً آباء الأطفال الذين يشكون من الخوف المدرسي والذين تم وصفهم من قبل نيرستين (1962) وتشازان

Chazan (1960)، كانوا عملاً مهرة أو نصف مهرة، والذين وصفهم "مورجان Morgan" ينحدرون من كل الطبقات الاجتماعية (العليا، المتوسطة، الدنيا) بلا استثناء، بينما الذين وصفهم "هيرسوف" (1960) كانوا من الطبقة الاجتماعية العليا.

(254,66)

ويهدف إجراء مقارنة بين الهاريين من المدرسة والخائفين منها فيما يتعلق بحجم الأسرة والطبقة الاجتماعية، وجد "هيرسوف وكوبر" أن الهاريين من المدرسة غالباً ما ينحدرون من أسر ذات حجم أكبر ومستوى اقتصادي واجتماعي أقل من تلك التي ينحدر منها الخائفون من المدرسة.

اما "بلاج ويول" (1986) فقد أكد صحة هذه النتائج فيما يتعلق بحجم الأسرة، ولكن لم يجدوا اختلافاً ذا شأن بين مجموعاتهم الخائفة والهاриة فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي، وبينما في الغالب أن اختلافات الطبقة الاجتماعية في دراسة "هيرسوف وكوبر" كانت بسبب العينة المنحازة، حيث أخذت من الحالات الموجودة في الطبقة الوسطى.

وعلى النقيض من ذلك، فإن دراسة بلاج ويول (1986) تضمنت كل حالات الخوف من المدرسة التي تحدث في منطقة جغرافية معينة خلال فترة زمنية محددة. رغم ذلك فقد عقب كل من بلاج ويول على وجود فروق كبيرة جداً بين الخائفين من المدرسة والهاريين منها فيما يتصل بمستويات البطالة بين الآباء والأمهات، فالبطالة كانت نادرة عند أهالي المجموعة الخائفة بنسبة (1.8%) فقط من العاطلين عن العمل مقارنة بالمجموعة الهاриة، حيث وصلت نسبة البطالة بين أهالي الهاريين من المدرسة (26.7%). وقد لوحظ اتجاه مشابه في عدد العاملات أيضاً معظم أمهات الخائفين من المدرسة كان لديهن أعمالاً بدوام كامل أو جزئي و وكانت النسبة (67.2%) مقارنة بأمهات الهاريين والتي كانت النسبة (47.3%).

(173, 1.8)

ترتيب الولادة:

يبدو من الدراسات المتعددة أن هناك اختلافاً وتضارياً في نتائجها من حيث أهمية الدور الذي يلقى على الطفل الأول والأخير من حيث ترتيب الولادة في عدم رغبته في الذهاب إلى المدرسة. إذ أكدت بعض الدراسات أن معظم الأطفال الخائفين من المدرسة هم الأطفال الأكبر سنًا أو ذوي الترتيب الأول أو الثاني بين الأخوة، وبعضها الآخر أكد أن هؤلاء الأطفال هم الأصغر سنًا في الأسرة، وذوو ترتيب أخير بين الأخوة. كذلك اختلفت الدراسات التي أجربت في هذا المجال لمعرفة ترتيب الطفل الذي يعاني الخوف المدرسي بين أخيه، هل هو الطفل ذو الترتيب الأول أم هو الطفل ذو الترتيب الأخير، أم الطفل ذو الترتيب المتوسط؟.

اما الدراسات التي أكدت أن الطفل الأخير أو ما قبل الأخير في ترتيب أخيه هو الأكثر شيوعاً ويعاني الخوف من المدرسة بالمقارنة مع أخيه الأكبر سنًا منه، فقد وجد "تشازان" (1962) من خلال دراسته التي أجراها على (33) طفلاً يعاني الخوف المرضي من المدرسة أن هناك (21) طفلاً ترتبيهم الأخير بين الأخوة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه "نزل رود" (1984) Nessel road في دراسته التي وجد فيها أن أكثر من ثلث العينة كانوا أطفالاً صغاراً.

ومن جهة أخرى وجد "وارنر" (1964) Warnecke أن الأطفال ذوي الترتيب الأول في الولادة كانوا يعانون الخوف المدرسي بنسبة (90) من أفراد عينته المكونة من (47) حالة أي الأطفال الأكبر سنًا في الأسرة كما لاحظ هيرسوف (1960)، وبلاج ويول (1986) Blagg, Yule أن معظم الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والذين تمت دراستهم من قبل هؤلاء الباحثين كانوا من الأطفال الأكبر سنًا في الأسرة أو الوحيدين في الأسرة.

اما في مجال الدراسات العربية، فقد وجد المؤلف نسبة قد تصل إلى (8%) من أفراد عينته البالغة (45) طفلاً وطفلة يعانون الخوف المرضي من المدرسة كان

ترتيبهم الأخير أو قبل الأخير بين أخوتهما، ونسبة (4%) من هذه الحالات كان الطفل الوحيد في الأسرة أو طفل وحيد بين إخوات عدة أو اخت بين إخوة عدة. ويمكن تفسير ذلك بأن الطفل ذا الترتيب الأخير في الأسرة يكون في الغالب أكثر تدليلًا ورعاية من قبل الوالدين والأخوة لكونه كما يسمى بالعامية (آخر العنقود)، وهذا ما يجعل الطفل في كثير من الأحيان يتمسّك بوالديه ويحاول البقاء بجانبهم، لأنهما في نظره مصدرًا أساسياً لإشباع رغباته وتحقيق متطلباته ومصدر آمنه وسعادته، لذلك نرى أن المدرسة بابعها المختلفة ومصادرها المتعددة غير قادرة على إشباع حاجاته المتعددة كما تقوم الأسرة بذلك، ولذلك نراه يلجأ إلى استخدام أساليب دفاعية للبقاء في البيت ويجنب من يرتبط به.

الفرق بين الجنسين:

يمكن أن يحدث الخوف المرضي من المدرسة لدى الأطفال الذكور والإناث وفي أي عمر، وأنه شائع في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية. وهنا يتبارد السؤال التالي: هل توجد فروق دالة بين الذكور والإناث في إظهار خوفهم من المدرسة؟ وللإجابة على هذا السؤال، فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية في هذا المجال أنه لا توجد أية فروق بين الذكور والإناث في درجة خوفهم من المدرسة، كما أشارت النتائج إلى أن حالة الخوف من المدرسة موزعة بين الذكور والإناث. وقد تم ذلك من خلال الدراسات التي أجرتها "بلاج" (1979) على (71) طفلاً وطفلة من أطفال المرحلة الابتدائية الذين يشكون الخوف المرضي من المدرسة، والدراسة التي أجرتها عباس محمود عوض وزميله (1990) على (100) طفل وطفلة من تلاميذ الصفين الخامس والرابع الابتدائي والتي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة بين الجنسين (الذكور الإناث) في الخوف المرضي من المدرسة. (29, 42) والدراسة التي أجرتها "ولد هوجل" (1956)، و"العاسمي" (1995) والتي أشارت نتائج كل منها إلى عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في درجة الخوف المرضي من المدرسة بمتغيراته المختلفة: الخوف من الامتحانات، الخوف من الأصدقاء، الانطواء والعزلة، التعلق الوالدي (20).

بينما أظهرت دراسات بعض الباحثين فروقاً دالة في درجة الخوف من المدرسة بين الذكور والإناث، وجاءت هذه الفروق لصالح الأطفال الذكور. وقد تم التأكيد من ذلك من خلال الدراسة التي أجرتها "هيرسوف" و"جينا" (1984) والتي أظهرت نتائجها أن الأطفال أكثر معاناة للخوف من المدرسة مقارنة الإناث. أما في مجال الدراسات العربية فقد توصلت الدراسة التي أجرتها "كميليا عبد الفتاح" (1980) على (77) طفلاً وطفلة من رياض الأطفال وأطفال الصف الأول الابتدائي بمدينة القاهرة إلى أن الذكور أكثر خوفاً من الإناث، بينما أظهرت نتائج دراسات أخرى أن الإناث أكثر خوفاً من الذكور مثل دراسة "خلدون الزبيدي" (1983) التي أجرتها على (900) طفلاً من تلاميذ المدارس الابتدائية في مدينة بغداد حيث أشارت نتائج دراسته أن مخاوف الإناث كانت أكثر حدة من مخاوف الذكور فيما يتعلق بالخوف من الامتحانات والخوف من الطبيب عند زيارته للمدرسة والذهاب إلى المرافق الصحية الخروج إلى الفسحة أثناء فترات الراحة.

وتوصلت دراسة "لينتز" (1985) إلى النتائج التالية: إن هناك فروقاً دالة بين الذكور والإناث في المخاوف المتعلقة بالعقاب البدني سواء في البيت أم في المدرسة، وإن هذه المخاوف ظهرت بدرجة أكثر حدة لدى الإناث منها لدى الذكور.

(81,84), (985 – 981,87)

وقد نفذ "مرسي" (1988) دراسة حول المخاوف الشائعة لدى أطفال المدارس الابتدائية في مدينة دمياط، وذلك من خلال استبيان لرصد مخاوف الأطفال، وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين متوسط مخاوف الذكور من الأطفال، وأن هذه الفروق جاءت لصالح الإناث مقارنة بالذكور، حيث تجلت مخاوف الإناث في: موت الأم (94٪)، موت الأب (88٪)، الخوف من الثعابين (80٪)، الفشل في الامتحانات (78٪). أما مخاوف الذكور فكانت كالتالي: موت الأم (78٪)، موت الأب (74٪)، الخوف من الثعابين (44٪)، الفشل في الامتحانات (6٪)، الموت المفاجئ (4٪)، كذلك قدمت هايزة عبد المجيد اليوسف دراسة مقارنة حول

مفهوم الخوف المرضي من المدرسة

مخاوف الأطفال هي كل من الريف والحضر، حيث تكونت العينة من (587) طفلاً من أطفال المدرسة الابتدائية بواقع (296) من الذكور و(291) من الإناث، بمتوسط عمرى قدره (10) سنوات، وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية:

أظهرت أطفال الريف مخاوف أكثر من أطفال المدن من خلال الذكور، كما أظهرت الإناث مخاوف أكثر من الذكور في كل من المدن والريف، حيث أظهرت بنات المدن مخاوف من: المدرسة الحشرات، الحيوانات، مقارنة بينات الريف اللواتي أظهرن مخاوف من: الغرباء، الخوف من المرض، مخاوف اجتماعية مدرسية.

ومن جهة ثانية قام العاصمي (2002) بدراسة حول تطور المخاوف لدى أطفال المدارس الابتدائية من الجنسين فتوصل إلى النتائج التالية، إن المخاوف الأكثر شيوعاً لدى الصنفوف الأولى من المرحلة الابتدائية هي التالية: الحيوانات المفترسة، الأشباح، الخوف من الظلام، الخوف من الانفصال، أما مخاوف الأطفال في الصنفوف الأخيرة من المرحلة الابتدائية فكانت: الخوف من الله، الخوف من المدرسة، الخوف من الزلزال، الخوف من الرسوب في المدرسة، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة بين مخاوف الذكور والإناث.

(22,2002)

يلاحظ من الدراسات السابقة أن نسبة المخاوف عند الإناث أكثر منها عند الذكور أي أن الإناث أكثر خوفاً من الذكور، كما تختلف شدة المخاوف تبعاً لشدة تخيل الطفل؛ إذ تتناسب شدة الخوف طرداً مع شدة الخيال، فكلما كان الطفل أكثر تخيلاً كان أكثر خوفاً، لكن هذا الخوف لا ينطبق كثيراً على مخاوف الأطفال من المدرسة، فقد أظهرت الدراسات التي عرضنا بعضها آنفاً أن مخاوف الأطفال الذكور من المدرسة أشد من مخاوف الإناث، إلا أن هذه الفروق تتعلق بعوامل كثيرة: حضارية واجتماعية وثقافية أكثر ما تتعلق بالفارق بين الجنسين.



MOHAMED KHATAB

٣

أعراض الخوف المرضي
من المدرسة



MOHAMAD KHATAB



MOHAMED KHATAB

الفصل الثالث

أعراض الخوف المرضي من المدرسة

مقدمة:

يبدو أن هناك عوامل مهيئة لبداية المخاوف المرضية من المدرسة لدى الأطفال، تتضح في صورة أعراض تسبق أعراض الخوف من المدرسة منها: القلق الشديد والمزاج المتقلب الذي يعاني منه الطفل بسبب مرض عضوي والصراعات الانفعالية الظاهرة كتوهم المرض أو أعراض قهقرية هستيرية وعدم القدرة على التحرر من العلاقة الاعتمادية مع أمهااتهم، الهلع والتفرز المليسي المثير للانتباه، وثورات انفعالية شديدة.

وقد تم وصف الأعراض الإكلينيكية للخوف المرضي من المدرسة من قبل هيرسوف (1960) حيث يرى أنه غالباً ما تبدو المشكلة لدى الطفل على شكل شكاوى مبهمة من المدرسة أو الإحجام عنها بشكل مستمر، ت يصل في نهاية الأمر إلى رفض الطفلذهاب إلى المدرسة ورفضاً كلياً أو البقاء في البيت مكتسباً من والديه أحياناً. وغالباً ما يكون هذا الرفض مصاحباً بعلامات واضحة من: القلق والذعر والتي تبدو في أوضح صورها عندما يحين ذهاب الطفل إلى المدرسة ومعظم هؤلاء الأطفال لا يستطيعون مغادرة البيت والذهاب إلى المدرسة، وبعضهم يستطيع مغادرة البيت متوجهاً إلى المدرسة لكنهم يعودون إلى البيت من منتصف الطريق وبعضهم عندما يكونون في المدرسة يندفعون إلى البيت في حالة من القلق والذعر، والمزيد من هؤلاء الأطفال يصررون على أنهم يريدون الذهاب إلى المدرسة ويستعدون لذلك ولكنهم لا يستطيعون ذلك عندما يحين موعد ذهابهم إلى المدرسة، متذرين بمبررات وجيهة كحيل لكي يتجنّبوا الذهاب إلى المدرسة. فقد تظهر على هؤلاء الأطفال بعض الأعراض المرضية كالصداع وألم البطن والإسهال والتي تكون مبرراً وجهاً لعدم ذهابهم إلى المدرسة.

ومن جهة أخرى فقد تفصح المخاوف المرضية من المدرسة عن نفسها من خلال طرائق وأساليب مختلفة ودرجات متنوعة ومتباينة في الشدة وإن هذا يتوقف على عوامل عدّة منها: سن الطفل ومستوى نضجه، فعلى سبيل المثال نجد الأطفال الصغار الذين يدخلون رياض الأطفال قد ي يكونون ويتصلبون أو يتعلّقون يائسين بأمهاتهم في حين يظهر الأطفال الأكبر سنًا الذعر الحاد والخوف الشديد من شر مرتفع يصيبهم من خلال البقاء في المدرسة، والطفل الذي يعاني من هذا الخوف في العادة لا يستطيع أن يعبر عن ذلك الخوف بصراحة، لأنّه يعلم أن والديه سيستخفان به، ويعتبران هذا الخوف سخافة وفي بعض الأحيان يصبح الطفل ويسخر أو يهدّد بالهروب بغيره أخذ مشاعره مأخذ الجد، وإذا اتضحت له أن الاستعلانة المباشرة بغيره قبلاً عديمة الجدوى فقد يعمد إلى أساليب أخرى ملتوية يراها أكثر فاعلية. فغالباً ما يقبل المرض العضوي كسبب مقنع لرفضه الذهاب إلى المدرسة، كما أنه يرى لذلك قاعدة أخرى هي: الحصول على اهتمام جاد من الكبار، وليس بمستغرب أن يلجأ الأطفال في حالات اليأس والقنوط إلى إظهار هذه الأمراض بما يخدم الغرض المزدوج، فقد يستعين الطفل في بعض الأحيان بعدم رغبته الذهاب إلى المدرسة بالدموع وثورات الغضب التي تؤدي أحياناً إلى سلوك عدواني. وفي حالة إجبار الطفل الذهاب إلى المدرسة قد يتولد لديه الخوف وشحوب الوجه والارتباك وتتصبّب العرق، لكن هذه الأعراض سرعان ما تزول وتحتفي عندما يزول ضغط إجبار الطفل على الذهاب إلى المدرسة.

(62,7)

ويذكر "رين" Raine (1979) حالة طفلة تدعى جودي ذات الترتيب الثالث في أسرتها، كل صباح قبل ذهابها إلى المدرسة تجلس على طاولة الإفطار وتبكى بصمت مشككة من مغض معوي، فهي لا ت يريد أن تأكل، ولا تريد الذهاب إلى المدرسة وتكرر جودي هذا السلوك كل صباح، لكن هذه الأعراض تزول نوعاً ما أثناء الإجازات والعطل الرسمية.

(77+8)

أعراض الخوف المرضي من المدرسة

ويؤكد هذا الرأي ما ذهب إليه "ولند فوجل، هكوليديج وهاهن وهيرسوف (1960) و"بلاج" (1987) في أن انعدام الشكوى من هذه الأمراض الجسمية خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات المدرسية وعطلات الصيف يدعم وجود علاقة بين أسباب هذه الأعراض والمواظبة على الذهاب إلى المدرسة.

(778 – 104,754)

وفي ضوء ما تقدم، فقد أجمع الدارسون لهذه المشكلة على وجود مجموعة من الأعراض العامة لدى الأطفال الذين يعانون أعراض الخوف المرضي من المدرسة وأهم هذه الأعراض:

1. البكاء والتخييب والتسلل إلى الأهل للبقاء في المنزل.
2. شكاوى جسمية (بدنية - سيكوسوماتية) متنوعة مثل أوجاع الرأس(الصداع) دوار الرأس (الدوخة)، ألم في المعدة أو في الأمعاء، عدم القدرة على الحركة وألم في الساقين، الإسهال، الحمى ونزلات البرد، فقدان الشهية لل الطعام، ألم في الحلق.
3. شحوب الوجه واصفراره.
4. ذوبات من الغضب أو استعمال الفاظ تنم عن الغضب أحياناً.
5. استعمال العنف أحياناً كرمي الدمي، أو تحطيم أثاث المنزل.
6. رفض التعاون مع الوالدين حين يجبرونه على الذهاب إلى المدرسة.
7. الصمت وعدم القدرة على الكلام رغم أنه لا توجد لديه أي عيوب في النطق.



الأعراض المصاحبة للخوف المرضي من المدرسة

تصاحب أعراض الخوف المرضي من المدرسة مجموعة من الأعراض النفسية والعقلية والاجتماعية، وأهم الأعراض المصاحبة هي التالية:

أولاً: الاكتئاب (Depression)

اهتم عدد من الباحثين بالحديث عن الاكتئاب لدى الأطفال الذين لديهم أعراض الخوف المرضي من المدرسة، واعتبر هؤلاء الباحثون أن الاكتئاب لدى هؤلاء الأطفال قد يكون عرضاً طارئاً ينتاب الطفل وهو في طريقه إلى المدرسة أو أثناء وجوده في المدرسة، وقد يكون الاكتئاب مرضياً مزمناً في أحياناً أخرى. وقد تم التأكيد من هنا الافتراض بما قاله دافيدسون (1961) إذ أشار إلى وجود علاقة بين أعراض الخوف المرضي من المدرسة والاكتئاب، وتم إثبات ذلك من خلال الدراسة التي أجراها بلاج (1987) والتي وجد فيها أن هناك (17) حالة من أصل (70) حالة تعاني أعراض الخوف المرضي من المدرسة أظهرت وجود اكتئاب لديها.

ويذكر "تشابل" Chable (1955) أن هناك (3/4) من الأطفال الذين درسهم على الأقل لديهم حالات اكتئابية داخلية المنشا لا علاقة للمدرسة أو المنزل بها. وقد فسر هذه النتيجة بأنها راجعة إلى تأثيرات مزاجية طبيعية داخلية المنشا أكثر من كونها ذات علاقة بالجواهير الأسرية والظروف المدرسية، وإن هذا الخوف الذي يعاني منه هؤلاء الأطفال ما هو إلا صورة واحدة فقط من صور الاكتئاب المتعددة (67).

ويعد بعض الباحثين مثل "الجر" Alger (1955) و"تيرمان" tyerman أن أعراض الخوف المرضي من المدرسة هو مجرد عرض من أعراض الاكتئاب، وأن المشكلة الرئيسية التي يعانيها هذا الطفل هي الاكتئاب وليس الظروف الأسرية أو المدرسية والأكاديمية، ولذلك ينبغي عند التعامل مع هذه المشكلة التعامل أولاً مع الاكتئاب الذي يعاني منه الطفل والذي يتجلّى في عدم رغبته في التعامل مع

أعراض الخوف المرضي من المدرسة

الآخرين من الزملاء أو المعلمين في المدرسة أو الزملاء خارج المدرسة، لذلك يفضل البقاء في المنزل ليحمي نفسه من المثيرات الكثيرة التي تعكر صفو هدوئه النفسي.

ومن جهة أخرى عد باحثون آخرون مثل دافيدسون (1961) أن هناك علاقة ارتباطية وثيقة بين الخوف والاكتئاب وأن هناك ثلاثة أرباع الحالات التي قابلها كانت مكتوبة. وقد أسفرت نتائج الدراسة التي قام بها كل من "بيرنسن Bernstein and Garfinkel" (1988) على عينة قوامها (42) طفلًا مراهقاً من يتربدون على العيادات النفسية الخارجية بجامعة مينيسوتا، تراوحت أعمارهم بين (7 – 18) سنة، أن هناك (11) حالة يعانون الخوف المرضي من المدرسة بالإضافة إلى أنهم يعانون من القلق والاكتئاب مع احتمال وجود نمذج عائلي توسيع يتجاوز مع أعراضهم المرضية. وفي دراسة أجراها العاصمي (1995) على مينة قوامها (45) طفلًا يعاني الخوف المرضي من المدرسة مقارنة بـ (45) طفلًا عاديًا من تراوح أعمارهم بين (6 – 9) سنوات، أن هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (1٪) بين أطفال المجموعتين على مقاييس الاكتئاب لصالح الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة. أي أنه بزيادة أحدهما يزداد الآخر، أو أن زيادة أحدهما يؤدي إلى زيادة الآخر، فقد تزداد حدة المخاوف فتؤدي إلى درجة عالية من الاكتئاب.

(74 – 70:64)

وقد عالج "خاند يلوال وباري مورثي" (1987) حالة طفل يعاني من الخوف المرضي من المدرسة إضافة إلى اضطرابات متنوعة، حيث حضر الطفل إلى العيادة النفسية مرافقاً والده بعد أن لاحظ مدرسه أنه لا يستطيع التركيز وكان يكبر أخته الأربعة، كما اتسم سلوكه بالهدوء والطاعة وحب اللعب، ثم بدأ يعاني من أمراض عددة تمثلت في ضعف الشهية للطعام، والسير أثناء النوم، والشكوى من آلام بدنية واضطرابات في النوم، وصعوبة في التركيز، وترك المدرسة أكثر من مرة بلا مبرر، ونسيان ما يتعلم بسرعة. وبعد

ذلك انتابته حالة هياج، وتبين من الفحص الطبي الشامل خلوه من الأمراض الجسمية أما الشخص النفسي، فقد أظهر أنه يعاني من مشاعر الحزن والقلق والقصور النفسي، وضعف تقدير الذات وميول انتحارية. شخصت حالة الطفل على هذا الأساس أنه يعاني من الخوف من المدرسة بالإضافة إلى الاكتئاب. وتم إعطاؤه جرعات من "الامبراجين" (Elmrbramien) وخلال أسبوع بدا الطفل يستجيب للعلاج، ولم يظهر أي اضطرابات نفسية أو قصور في الدراسة، وتحسن سلوكه بصورة عامة، وأصبح عادياً ومواطباً على الحضور إلى المدرسة بصورة منتظمة، ولم تظهر عليه الأعراض الآثنة الذكر أثناء المتابعة التي استمرت نصف عام.

(5 - 85، 1)

ثانياً: ضعف التحصيل الدراسي:

يعني ضعف التحصيل "التأخر الدراسي" المهمة الموجودة بين التحصيل الدراسي للطلاب ومتطلبات المدرسة". وقد جاء في معجم علم النفس الألماني في وصف المقصرين دراسياً: أنهم التلاميذ الذين لا تتناسب نتائجهم مع الحد الأدنى لمتطلبات المدرسة. ويمكن أن يعرف بأنه ضرر كبير أو قليل في نمو شخصية التلميذ عند تحقيق متطلبات الخطة الدراسية.

(176، 49)

وقد تضاربت الآراء حول العلاقة بين درجة التحصيل الدراسي وبين عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة، فيرى بعضهم أن الخوف المرضي من المدرسة لا يقتصر على التلاميذ المتأخرین دراسياً وإنما ينتشر كذلك بين التلاميذ المجتهدين بقدر ما ينתרبین المتوسطين والمتأخرین دراسياً بينما يرى بعضهم الآخر أن هناك علاقة ارتباطية طردية بين الخوف من المدرسة لدى الأطفال والتأخر الدراسي.

.(30 - 22، 52)

ويفسر العلماء ذلك بالقول: إن عملية التعلم ذات طبيعة تراكمية فيها يتعلم الطفل المعلومات القديمة، والجديد من المعلومات بعد امتداداً للمعلومات السابقة ومتصلًا بها. فإذا ثقى الطفل تأييداً وروضَ من والديه، من حيث بقائه في البيت إلى جوارهما وعدم ذهابه إلى المدرسة، فإنه لا يتبع عدداً من الدروس، ونتيجة لذلك سيعاني الطفل من التأخر الدراسي عن بقية زملائه. ويؤيد هذا الرأي كل من تشازان (1962) وبلاج ويول (1987) Blagg and Yule (1987) و هيربرت (1978) Herbert (1978)، الذين يرجعون خوف التلميذ من المدرسة إلى صعوبات في التعلم يواجهها الطفل في مدرسته مما يؤدي إلى فشل التلميذ في الحصول على نتائج جيدة في المدرسة كما أن الجو الأسري الذي يعيش فيه التلميذ مليء بالواجبات الكثيرة ووجود جو عائلي مليء بالتوتر والاضطراب الانفعالي الأمر الذي يؤدي إلى فشل التلميذ دراسياً.

(145, 91)

وقد أسفرت الدراسة التي أجرتها العا سمي (1995) إلى وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والأطفال العاديين في التحصيل الدراسي وذلك لصالح الأطفال العاديين. أي أن الطفل الذي يعاني من الخوف المرضي من المدرسة لديه انخفاض واضح في الأداء المدرسي وانخفاض في الاستعداد الدراسي.

أما الاتجاه الآخر فيرى أن الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يتتفوقون في دراستهم، وبينما أنهم لا يخافون الفشل الدراسي وإنما يعانون قلق الانفصال عن الأم. ويدعم هذا الرأي ما ذهب إليه "ولديفوجل" (1959) في دراسته التي أجرتها على (36) طفلاً من يعانون الخوف المدرسي أن الأداء الأكاديمي لهؤلاء الأطفال مكان مرتفعاً بصورة عامة. فقد حصل (13) طفلاً منهم على أداء أكاديمي مرتفع، وحصل (21) طفلاً على أداء مرضٍ، ولكن وجده أن هاتين كان أداءهما الأكاديمي غير مرضٍ.

(332 – 324:105)

يبدو من خلال العرض السابق أن هناك علاقة طردية بين الخوف المرضي من المدرسة والتحصيل الدراسي، بمعنى آخر: إنه كلما انقطع الطفل عن المدرسة نتيجة لخوفه منها، فإن ذلك يفقده الكثير من المعلومات التي سيطالب بها في الامتحان، وهذا الأمر يجعله في حالة من التشتت الذهني وقت الامتحانات لعدم قدرته على استيعاب المعلومات التي حصل عليها أقرانه في المدرسة وعندئذ يصاحب بالإحباط وبالتالي ستكون نتائج دراسته غير جيدة.

الخوف المرضي من المدرسة والقدرات العقلية:

عند الحديث عن القدرات العقلية (الذكاء) غالباً ما يطرح السؤال التالي:
هل هناك علاقة بين الذكاء وخوف الطفل من المدرسة ؟
وللإجابة على هذا السؤال: نجد هناك رأيين مختلفين حول هذه المسألة.

فاصحاب الرأي الأول يؤمنون بوجود علاقة واضحة بين مخاوف الأطفال ومستوى الذكاء ويدللون على ذلك بالحجج والبراهين المنطقية والتطبيقية، حيث يرون أنه - من المحتمل - أن يكون الأطفال ذوي الذكاء العالي أكثر وعياً بالأخطار التي تحيط بهم من غيرهم من الأطفال، كما أنهم يتمتعون بإدراك أفضل للبيئة المحيطة بهم. أما الأطفال الأقل ذكاءً فإن الخوف من الأحداث الخارقة للطبيعة تكون أكثر شيوعاً لديهم، لأن الوعي كما يقولون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرات الإدراكية.

(20,9)

وبناءً على ذلك فإن الأطفال الأذكياء يدركون الأخطار في وقت مبكر، ويتعلمون عليها في وقت مبكر أيضاً، وبالتالي تكون لديهم مخاوف أقل من مخاوف الأطفال ذوي الذكاء المتوسط. كذلك يرى "ماي جري" (Ma Yjerry) (1977) أن الفرد ذو الذكاء العالي يعاني من الخوف بنسـبـ أقل من الفرد صاحب الذكاء

المنخفض (150، 92 - 159). بينما يشير أصحاب الرأي المخالف إلى عدم وجود آية علاقة بين الخوف المرضي من المدرسة والذكاء، فقد وجد "همب" (Hampe 1973) أن ذكاء الأطفال الذين يعانون خوفاً مرضياً من المدرسة مكاناً موزعاً بينهم بصورة طبيعية كتوزيع نسبة الذكاء بين عامة الناس. وهذا ما أكدته دراسات محل من "وارين جولدينبرج واستنبرج وهيرسوف" في أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يكونون في العادة من الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط.

(20، 62)

يلاحظ مما تقدم أن معظم الدراسات التي تناولت الخوف المرضي من المدرسة وعلاقته بالقدرات العقلية والتحصيلية انتهت إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال يكون مستوى ذكائهم في حدود المتوسط أو فوق المتوسط، كما أنهم يظهرون في الغالب مستوى مقبولاً في التحصيل.

ثالثاً، الخجل (الانطواء والعزلة):

يتعدّد تعريف الخجل في كثير من الأحيان لأن الشخص الخجول محشو بالعناصر الشديدة التعميد التي لا يمكن تمييزها عن القلق الاجتماعي. وأن ثمة تنوع في مصادر الخجل بقدر ما يوجد بين الخجولين ثانياً.

فالخجل إذن هو استعداد وجذاني وانفعالي يتمثل في العلاقات بين الخجول والآخرين، إنه مرض وظيفي يتجلّى بفعل ضرب من عدم التكيف المؤقت أو الدائم. ومن مظاهره:

اضطرابات في الإهرازات مثل: التعرق وخصوصاً الأطراف، جفاف الحلق، توسيع الأوردة السطحية التي يسبب أحمرار الوجه، اضطرابات في الكلام والتنفس، الرعب المصحوب بالضيق الداخلي الشديد والإحساس بالاختناق، ويعقب هذا

الخجل الهروب، ورفض مواجهة أي وضع يعرف الخجول مسبقاً أنه يشير الخجل. فالطفل الخائف من المدرسة يرفض الحضور إلى المدرسة والدخول إلى غرفة الصف والوقوف أمام التلاميذ للإجابة على سؤال طرحة المعلم، لذلك نراه يهرب من هذا الموقف كلياً ويحاول قدر الإمكان تجنب المدرسة والبقاء في البيت بجانب والدته.

وفي هذا الجانب، أكدت الدراسة التي أجرتها "جيمس" (1992) على الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة، هناك علاقة وثيقة بين خجل الطفل ورفضه الذهاب إلى المدرسة. وشدد على الأساليب التربوية الخاطئة التي تنتهجها الأسرة والمدرسة والمجتمع عموماً في التعامل مع هؤلاء الأطفال والتي تعكس على نظرة الطفل السلبية نحو نفسه، والأسرة والآخرين.

(82)

ويلاحظ مما تقدم أنه قد يكون للخجل chame دوراً بارزاً في تكوين مفهوم الطفل نحو ذاته، وقد يكون السبب الرئيس لكثير من الصعوبات الشخصية التي يعاني منها الأطفال وخصوصاً الذين يعانون الخوف المدرسي بصورة حادة. بالإضافة إلى هذه الأعراض المصاحبة للخوف المرضي من المدرسة هناك أعراض أقل أهمية منها ذكر منها على سبيل المثال:

- اضطرابات النوم: كالنوم المتقطع، الأحلام والكتابيس المزعجة التي يدور محتواها عن المدرسة والبيئة الخارجية كمثير مهدد لكيان الطفل.
- الخوف من الظلام: فقد يدعى الطفل الخائف رؤية عيون تحملق به في الليل.
- الخوف من الأماكن المفتوحة.
- الخوف من الحيوانات: كالخوف من القطط والكلاب.
- القلق الشديد وعدم القدرة على التركيز؛ وخصوصاً في الأماكن التي تسبب له الضيق والاختناق.



4

أسباب الخوف المرضي من المدرسة





MOHAMED KHATAB

الفصل الرابع

أسباب الخوف المرضي من المدرسة

مقدمة:

يعجز الآباء في كثير من الأحيان عن إقناع أبنائهم الرافضين للمدرسة بالعودة إليها. لذلك فهم يعانون القلق والتوتر لفهم هذه المشكلة، وفي بعض الأحيان يعجز الأطفال عن إعطاء سبب واضح لبرر سلوك عدم ذهابهم إلى المدرسة. وفي أحيان أخرى، يعطون أسباباً تبرر تصرفاتهم، إلا أن الأسباب التي يقدمها الرافض للمدرسة يمكن أن تحمل الجرح الحقيقي، كأن يدعي الطفل بأن مدرسه قد وبيه أو ضربه وعدم متابعته الدروس أو كتابة الواجبات المنزلية، فعندئذ يصبح الطفل خائفاً خوفاً شديداً من المدرس الذي قدم له هذه الملاحظات، أو قد يدعي الطفل أحياناً وجود مشكلات بينه وبين أصدقائه في المدرسة. وقد يقدم في حالات أخرى تفسيرات مرضية بهدف عدم الذهاب إلى المدرسة كأن يقول لأمه، على سبيل المثال: إن معدتي تؤلمني بشكل حاد وإنني غير قادر على الذهاب إلى المدرسة هذا اليوم.

في الحالات التي يرجع الطفل فيها إلى المدرسة، فإن القلق والخوف يتضجر بنفس القوة التي كان عليها من قبل. كما تظهر الأعراض بشكل أقوى من الأول، مما يشير إلى أن الخوف من المدرسة قد بقي قوياً، وإن الأسباب التي قدمها ما هي إلا محاولة فاشلة للتعبير بما يدور في نفسه من مشاعر الإحباط والقلق والصراع الداخلي.

(37- 22,52)



يتبيّن من خلال العرض السابق أن أسباب الاضطراب غير محددة المعالم بشكل واضح ودقيق، بسبب تدخل عوامل كثيرة بعضها خاص بالطفل، وبعضها الآخر يتعلّق بالبيئة الأسرية، وبعضها الثالث يتعلّق بالمدرسة وما تتضمّنه من مثيرات أو مواقف طبيعية أو بشرية. ومن هنا ذكر العلماء وجود مجموعة عوامل رئيسة تعدّ المسؤولة – في نظرهم – عن خوف الطفل من المدرسة أو رفضه الذهاب إليها. ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

أولاً، الأسباب الخاصة بالطفل:

ينبغي علينا أن نفحص في ضوء المعلومات العلمية التي حصلنا عليها عن تطور النمو النفسي للطفل في سن الخامسة أو السادسة من العمر، وفي هذا السن يعهد بالطفل إلى المؤسسات التربوية العامة أو الخاصة، ويكون مجده إليها لأول مرة خبرة جديدة على المستوى الوجداني والمعاطفي. إنه عانى وقوف نزعته الصلبة للأسرة نتيجة لحبه شخصاً معيناً، أنه استشعر رغبة جامحة في امتلاك هذا الشخص المحبوب (الذي غالباً ما تكون الأم)، وقد أحس بصلته بوالديه، مشاعر الحب والاحترام والإعجاب ومشاعر الماtasse المولدة مع مناقس أقوى منه، كما شعر بالعجز والأثار المؤلمة للفشل، ونتيجة لذلك يقاسي الطفل تحت ضغط التربية والتنشئة الاجتماعية من المخاوف المكدرة والقلق المرهق، وعانياً تغيرات كبيرة داخل نفسه. فالطفل حين يدخل الصدف يكون مهيناً لأن يدرك أنه واحد ضمن أطفال كثري، ومنذ ذلك الوقت لا يمكن أن يتوقع لنفسه مركزاً متزاً. لقد تدرّب بعض الشيء على التوافق الاجتماعي فبدلاً من أن يحاول باستمرار إشباع رغباته الخاصة كما كان يفعل من قبل، فإنه الآن على استعداد لأن يفعل ما يطلب منه، وأن يجعل مسراته وملاذاته مقصورة على تلك الأوقات التي يسمح لها فيها بإشباعها. وبينما الآن اهتمامه بأن يرى كل شيء، وأن يتعرّف على الأسرار الخاصة بمحبيه، يتحول إلى ظلماً للمعرفة وحبّ التعلم. ويدلاً من التأملات والتفسيرات التي كان يتوق لها من قبل، فإنه الآن على استعداد أن يتلقى المعرفة، إلا أنه يفاجئ بأن هذه البيئة مكدرة ومنفرضة لحياته نتيجة وجود متطلبات كثيرة عليه القيام بها. ووجود أطفال

أسباب الخوف / الرضي من المدرسة

أكبر منه قد يسخرون منه أو يضرهونه.. لذلك يتخذ أسلوباً دفاعياً تجاه البيئة المؤلة بالهروب منها والبقاء في المنزل.

(75,6)

ويمكن أن نجمل هذه الأسباب بما يلي:

- ضعف الثقة بالنفس.
- اعتماد الطفل الشديد على والديه.
- القلق الشديد والضيق الذي تهدد شعور الطفل باحترامه لنفسه، بسبب عدم قدرته على التغلب على بعض الصعوبات خارج المنزل.
- المرض المزمن الذي يعاني منه الطفل أو حدث ماريء ألم به.
- عمليات جراحية للطفل استدعت بقاوئه في المستشفى لمدة طويلة.
- الشعور بالنقص والعجز، كالضعف الجسمي أو الإعاقة الجسمية، كالنحافة والسمنة والتشوهات الخلقية المختلفة.
- مشاعر الحرمان والتبذير كما يدركها الطفل من قبل الوالدين. فقد أظهرت نتائج الدراسة التي قامت بها مدوحة سلامة (1987) عن مخاوف الأطفال وإدراكهم للقبول / الرفض الوالدي وجود ارتباط موجب ودال بين ما يدينه الأطفال من مخاوف وبين إدراكهم للرفض من قبل والديهم (48، 54 - 60).
- مرور الطفل بخبرات انقصان هابرة، ارتبطت بأحد أنواع مخاوف النمو التي يتعرض لها الطفل، كالخوف من الهلاك، والخوف من فقدان الأم، والخوف من الغرباء، والخوف من الأماكن المفتوحة، والخوف من الظواهر فوق الطبيعية مثل الأشباح.
- موت أو مرض شخص في الأسرة متعلق به الطفل تعلقاً شديداً.
- الانتقال إلى مسكن آخر في مرحلة الطفولة المبكرة، وعدم استقرار علاقاته الاجتماعية مع أقرانه نتيجة لذلك.
- الخجل والانطواء الذي يجعل الطفل عرضة للأضطهاد والتذمّر من قبل رفاقه في المدرسة.

ثانياً: الأسباب الخاصة بالأسرة:

يوجد إثبات جيد بأن الأطفال الهاربين والخائفين من المدرسة يختلفون في علاقاتهم المرتبطة بالأسرة، فقد ذكرت دراسات كثيرة تكرار حدوث قلق الانفصال لدى الأطفال الذين يعانون من الخوف المدرسي، كما أثبتت "بلاغ ويول" هذه النتائج، حيث كانت مخاوف الأطفال مرتبطة بشكل دال من الهاربين من المدرسة فيما يتعلق بـ:

- قلق الانفصال وعلاقته بكل من الآباء والأمهات.
- قلق أحد الأقارب.
- قلق حول صحتهم وصحة أبائهم.
- تعلم الخوف من أحد الوالدين بشكل مباشر، مثل خوف أحد الوالدين من المواقف الجديدة، وهذا ينمي في نفس الطفل الخوف من مثل هذه المواقف، وخصوصاً عند دخول المدرسة كبيئة جديدة. ويريد هنا الرأي ما وجد من تشابه بين مخاوف الأم ومخاوف طفلها؛ فالطفل يخاف من الأشياء نفسها التي تخاف منها أمه؛ هالام التي تخاف على أبنائها خوفاً شديداً ينتقل خوفها إليهم، ويصبحون عندئذ عرضة للخوف الشديد على أنفسهم.

ففي دراسة قامت بها "بيرت" Burt بعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الثانية، وجدت بأن كثيراً من الأطفال الذين أخذوا من قبل أمهاتهم إلى الملاجئ الواقعة قرب المدرسة من أجل وقايتها من الغارات الجوية، كانوا يخافون من تلك الغارات بالقدر الذي تخاف منها الأمهات وقد ارتبط خوفهم هذا بالمدرسة.

(103, 25)

- احتمال وجود مشكلات عنيفة بين الوالدين (الأب - الأم) كال مشاجرات الدائمة بينها على أنفه الأسباب، وعند ذلك يعتقد الطفل أنه لابد أن يبقى في المنزل حتى يحمي الأم من بطش الأب، وهذا وحده يزيد من اعتماد الطفل على الأم.

ويخشى من اختفاء الأم، ويصبح هذا الشعور عميقاً لا يظهر على السطح إلا حين ينوي الطفل الخروج من البيت والذهاب إلى المدرسة. وينظر وولمان في كتابه (مخاوف الأطفال 1991) أن بنتا في الثامنة من عمرها تعانى الخوف المرضي من المدرسة بشكل حاد، كما جاء في التقرير التشخيصي عنها، وقد كانت ترفض الذهاب إلى المدرسة، فتقتريا كلما حاول والدها إرغامها على ذلك، وكان ذومها مضطرباً إلى درجة كبيرة، تعصف به الكوابيس، ولم يكن السبب الذي قدمته لتفصير خوفها من الذهاب إلى المدرسة، سبباً مقبولاً فيحقيقة الأمر.. فهي ذات يوم استرقت السمع إلى المشادات الكلامية بين والديها، وعرفت أنهما قررا الانفصال؛ ففي وقت متأخر من الليل عشية إصابة البنت بالخوف المدرسي، كان والداها يناقشان قرارهما غير مدريkin أن ينتهيما كانت مستيقظة في فراشها وتستمع إليهما.. وفي ذلك الصباح أخبرتها أمها بأن والدها سينتقل إلى مسكن آخر بصورة مؤقتة.

(170 – 169,9)

- عدم اهتمام الوالدين بالطفل، فيضطر الطفل نتيجة لذلك لرفض المدرسة وعدم الذهاب إليها كمحاولة لجذب انتباه الوالدين.
- المبالغة الشديدة في الحماية والرعاية من قبل الوالدين وخصوصاً الألم للطفل، الأمر الذي يجعل الطفل سريع التأثر في ظل غياب أحد الوالدين عن ناظريه عند ذهابه إلى المدرسة. والدليل على ذلك أن هيرسوف قد لاحظ في دراسته التي أجراها عام (1960) أن نصف أمهات الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة كن يفرطن في تدليل الأطفال بصورة غير عادية، بينما ذهب إلى أن ربع الأمهات كن متسلطات، قاسيات، ومفرطات في ضبط أطفالهن.
- احتمال وجود علاقة عدائية لأشعورية بين الطفل وأمه كمالوف من الانفصال عن بعضهما ويكمحاولة تكث الشعور العدائي بين الطرفين تحاول الأم أن تكون موضوع العاطفة حيث يجبر الطفل على البقاء بجانبها. وقد نظرت

"دافيدسون" (1961) إلى الخوف المرضي من المدرسة على أنه تعبر ودليل على اضطراب العائلة، وأن أمهات الأطفال ذوي المخاوف المرضية من المدرسة يتصنفن بالتناقض الوجوداني، لهذا فهن يخشين من عدواياتهن المكبوتة والتي تظهر غالباً في انفجارات ثورات الغضب، مما يفقدن التوازن الانفعالي في التعامل مع أطفالهن وقد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث يصف الأمهات بأنهن غير ناضجات، وأنهن يعتمدن على أمومة الجدة، وأنهن ميلات لتكرار علاقتهن بأطفالهن بما كانت عليه علاقتهم مع أمهاتهن، رغم ادعائهن وتظاهرهن بأنهن تشجعن الطفل على العودة إلى المدرسة، إلا أنهن يعملن بصورة لا شعورية في الاتجاه المناقض لها.

- مرض الأم أو الأب، أو موقع موت أحد الوالدين في حال وجود الطفل في المدرسة، ومن هذه النقطة اعتبر "لازاروس" (1960) Lazarus أن الخوف من الموت هو النواة والقاعدة الأساسية للخوف المرضي لدى الطفل من المدرسة ومن البيئة الخارجية أيضاً، وفي هذا السياق فقد ذكر حالة طفلة في التاسعة من عمرها.. عبرت بأنها لم تخش أو تخاف من المدرسة ولكنها كانت تخاف أن تموت والدتها قبل أن تعود من المدرسة إلى المنزل، وقد أشارت إلى هذا المعنى فيما بعد" ديفيدسون" (1961) حيث وجدت لدى ثلاثين أماً وأباً من أمهات وأباء الحالات التي تعاني الخوف المرضي من المدرسة توقعاً للموت بدرجة كبيرة، ويشعرون بأنهم مهددون، ويظهرون هذا التوقع للموت بشكل مرضي شديد قبل بدء ظهور أعراض الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل.

ثالثاً: أسباب تتعلق بالمدرسة:

هناك أيضاً أسباب تتصل بالمدرسة على اعتبارها بيئـة جديدة ومصدر خوف للطفل أيضاً، حيث يعجز الطفل في إطارها عن التكيف معها، من حيث التفوق الدراسي، أو من حيث التعامل مع الأقران، وبالتالي يكون النكوص عن هذا الإطار المدرسي سبيلاً من أسباب خوف الطفل المرضي من المدرسة، وقد وجدت بعض الدراسات مثل دراسة كوبير (1966) Coober بعض الأدلة على أن الأطفال

الخائفين من المدرسة يغيرون في كثير من الأحيان مدارسهم وصفوفهم نتيجة انتقال سكن الأسرة من منطقة لأخرى مما يجد الطفل صعوبة في التوافق مع المكان الجديد، والأطفال والعلماء الجدد كبيقة جديدة لم يالوها من قبل. وأظهرت دراسة "نزل رود جينا" (1984) وجود مجموعة من العوامل تعد مسؤولة عن سلوك الرفض عند الأطفال في الذهاب إلى المدرسة وهي: النظام القائم في المدرسة والبعد عن الزملاء والخوف من باص المدرسة وطلاب دراسية كثيرة وخبرة جديدة مع أناس جدد في المدرسة.

(18:94)

أما "كلابين" (1945) فقد قسم خوف الطفل من المدرسة إلى خوفه من المدرس أو من التلاميذ الآخرين أو من العمل الدراسي الذي يتوقع معه الفشل نتيجة لكبر حجم المنهج والموضوعات التي يتناولها وضخامة الواجبات المدرسية الملقاة على عاتق الطفل، وأسلوب الامتحانات التقليدي الذي يعتمد على الحفظ البصري. وهذا التقسيم تحتاج إليه اليوم تحديد نوع العلاج وخصوصاً في الحالات التي يكون فيها الخوف من المواقف المختلفة داخل المدرسة مثل الصعوبات الدراسية الحقيقة، ومع ذلك، قلل كلابين من احتمالات أن يكون الخوف من داخل المدرسة، وفسرت مخاوف الطفل في ضوء تعلقه الشديد بأحد والديه طبقاً لما تقوله "عقدة أوديب".

وقد وجدت بعض الدراسات، أمثال الأبحاث التي قام بها كل من هيرسوف (1960) "بلادج" (1979) "بلاج ويول" (1986)، و"تريستر" (1980) و"إيزينبرغ" (1958)، بعض الأدلة على بعض الأطفال الخائفين من الذهاب إلى المدرسة يغيرون في أكثر الأحيان مدارسهم نتيجة انتقال الأهل إلى بيت آخر، لذلك يجد الطفل صعوبة في التوافق مع البيئة الجديدة ومع الأطفال والعلماء الجدد، ومن الأحداث الصادمة للطفل داخل الفصل وخارجيه مثل الخوف من

الازدحام والخوف من الأماكن المغلقة، والخوف من الامتحانات والخوف للتعرض للضرب من قبل الأقران وبعد المسافة بين البيت والمدرسة.

وأشار تشازان (1962) إلى أهمية العوامل المدرسية في نمو الخوف لدى الطفل، حيث وجد في دراسته التي أجراها على (33) طفلاً يعانون الخوف المرضي من المدرسة أن العوامل المدرسية الأكثراً أهمية في خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة، والتي جاءت حسب تقارير الأطفال، هي كالتالي:

- الخوف من الأطفال الآخرين الأكبر سنًا.
- الخوف من الأذى الذي ربما يلحق به من المدرسة.
- الكره من طريقة إلقاء الدروس.
- الأحداث المسيبة للخوف لدى الطفل داخل غرفة الصف مثل: الخوف من الازدحام، الخوف من الامتحانات، عدم القدرة على الإجابة عن أسئلة المعلم.

بينما وجد "بلاج ويول" (1979) من خلال دراستهما لـ (56) طفلاً يعاني اعراض الخوف المرضي من المدرسة ان (23) طفلاً منهم لديهم صعوبات اكاديمية تحتاج إلى مساعدة علاجية بهذا الخصوص، وأن (42٪) طفلاً لديهم صعوبات تتعلق بأدائهم المدرسي.

ورغم ذلك، فإن الأبحاث الكثيرة في هذا المجال ترى بأن العوامل المدرسية قد تكون أحد مصادر الخوف الرئيسية والأكثر انتشاراً لدى معظم الأطفال، حيث يرى "مردووك وهيرسوف" (1975) و"هيرسوف" (1960) أن سبب الخوف المدرسي لدى الكثير من الأطفال قد لا يكون له علاقة بقلق الانفصال عن الأم كما يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي وخاصة نظرية الانفصال، وإنما يرجع بصورة رئيسية إلى خبرة مقلقة تحدث للطفل داخل أسوار المدرسة. وبؤكد هذا القول الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبين منها أن أطفال المدارس الابتدائية يميلون إلى الخوف في المواقف المدرسية التالية:

- فشل امتحاني.
- ان يذهب الطفل متأخراً إلى المدرسة.
- ضعف في التهجي.
- ضعف في القراءة.
- الحصول على درجات منخفضة في الامتحانات.
- التوبيخ الذي يتلقاه من بعض زملائه ومدرسيه.
- عدم قدرته على منافسة أقرانه في أداء الأعمال المدرسية (كتابة الوظائف، حفظ القصائد، حل المسائل الحسابية... الخ).

(91:243)

ويمكن أن تلخص أهم المواقف المدرسية التي يمكن أن تثير الخوف في نفس الطفل وتجعله غير قادر على الذهاب إليها ورفضها رفضاً كلياً أو جزئياً، بالمواقف التالية:

1. الخوف من المدرسين الصارمين.
2. تعرض الطفل للأيذاء والسخرية من رفاقه في المدرسة.
3. خبرة سيئة تكوين صداقات مع الأقرباء (الأقران).
4. الخوف من الفشل في الدراسة والعقاب الوالدي الناتج عن ذلك.
5. الإحساس بالضعف البدني بالمقارنة مع زملائه، فقد يبدو الطفل تحيل الجسم أو سمين أو قصير أو طويلاً. وفي هذا الاتجاه ذكرت "جيتس" (1976) حالة طفل رفض الذهاب إلى المدرسة وبعد التحليل والتشخيص تبين أن ذلك الطفل كان طويلاً رفيعاً، وأن لديه شعوراً بأنه لو خلع ملابسه أمام زملائه فسوف يظهر بأنه ضعيف الجسم وبالتالي وبالتالي فإنهم سيضحكون عليه.

(77:98)

6. الإحساس برداءة الملابس وعدم نظافتها والتي تسبب الشعور بالحرج والضيق لدى الكثير من الأطفال.
 7. الانفصال عن بعض زملاء المدرسة المحبوبين له سواء من خلال انتقاله إلى مدرسة أخرى أو إلى صفت آخر.
 8. الجو المدرسي المليء بالواجبات والمطالبات الكثيرة.
 9. الخوف من الازدحام والزحام مثل: الأعداد الكثيرة من الطلبة في المدرسة أو في الصفت.
 10. الخوف من الامتحانات.
 11. بعد المسافة بين البيت والمدرسة.
 12. الخوف من سقوط بناء المدرسة.
- كما كشف التحليل العائلي أن مخاوف الأطفال من المدرسة كما يتصورها الآباء تم وضعها في ثلاثة تصنيفات هي:
1. الضرب أو الأذى الذي يمكن أن يلحق بالطفل.
 2. أحداث طبيعية.
 3. الضغط النفسي:
 - أ. الخوف من الضياع والهجران.
 - ب. الخوف من المدرسة.
 - ج. النقد.
 - د. التفاعل الاجتماعي.

وأخيراً، يمكن القول: إن اتجاهات الطفل نحو النظام العام للمدرسة، والاتجاه نحو المدرسين والتلاميذ، والأشياء الأخرى المتعلقة ببيئة المدرسية، والتي يمكن أن يعتبرها الطفل مصدر تهديد لذاته تعتبر من الأمور الأكثر أهمية في مستوى غياب وقرار عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة.

رابعاً: الأسباب الوراثية والبيولوجية:

يرى بعض الباحثين أنه من المحتمل وجود أساس وراثي للخوف المرضي من المدرسة عند الأم أو الأب عندما كانوا أطفالاً صغاراً، وقد دعم هذا الاحتمال نتائج دراسات كثيرة من "جولدنبرج" (1953) و "دايفيدسون" (1961) (Davidson) والتي أكدت على أن أمهات وأباء الأطفال الذين يشكون من الخوف المرضي من المدرسة كانوا يعانون الخوف من المدرسة عندما كانوا أطفالاً صغاراً. (11, 196)

ونتيجة لذلك فقد افترضوا أن هناك علاقة - على أقل تقدير - بين رفض الطفل النهاب إلى المدرسة ورفض آبائهم لها عندما كانوا صغاراً.

وتاكيداً لهذا الافتراض فقد ذكر "شيرمان" (1985) حالة طفلة عمرها (14 سنة) تعاني الخوف المرضي من المدرسة وبعد تشخيص ودراسة الحالة تبين لشيرمان أنه كان لأبوها أعراض مرتقبة بعمله مشابهة لأعراض مخاوف ابنته، وكذلك كان لدى الأم معاناة من الخوف من الأماكن الفسيحة.

(11, 114)

كما أشارت نتائج دراسة "بيرنستين وجارفينكل" (1988) Bernstein and Garfinkel إلى أن آباء وأمهات الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يشكون من القلق والاكتئاب بشكل واضح عن آباء وأمهات المجموعة الضابطة. كما أن هناك نسبة غير قليلة من أخوة هؤلاء الأطفال يعانون أيضاً الخوف المرضي من المدرسة بصورة أو بأخرى، في حين لم يشتك أحد من أخوة المجموعة الضابطة من ذلك.

(74 - 64, 70)

اما فيما يتعلق بالعوامل البيولوجية فقد رأى كل من "سوزا ودى سوزا" Desousa،Desousa الى اختلال في وظيفة الجهاز العصبي المستقل (Autonomic Nervous System)، او قد يرجع إلى التأثيرات الناتجة عن اورام في المخ. وتأكيداً لهذا الافتراض فقد وجد "بلاكمان ووهلر" (1987) اثناء معالجتهم لطفل في الثانية عشرة من عمره، يعاني الخوف المرضي من المدرسة والقلق الحاد، أن الطفل كان يعاني ،علاوة على ذلك ،من ورم مخفي . وبعد اجراء جراحة لهذا الطفل لاستئصال هذا الورم انخفض لدىه القلق والخوف المرضي من المدرسة.

(30-84)

ما تقدم نستنتج أن خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة يرتبط بصورة أساسية، فيما نسميه بمثلث القلق أو الخوف، وهو الجانب المتعلقة بالطفل وتقديره لذاته وإمكاناته، والجانب المتعلقة بالأسرة ومتغيراتها، والمدرسة ومتطلباتها.

وقد يكون العامل الأكبر الذي يسهم في تشكيل الخوف من المدرسة لدى طفل هو العامل المدرسي، بينما يكون لطفل آخر هو العامل الأسري. ولطفل ثالث العامل الذاتي أي الخاص بالطفل، إلا أن هذا لا يعني وجود انفصال وعدم تداخل في العوامل التي تسهم في ظهور هذا الخوف لدى الطفل، وهذا بالتأكيد يحتاج من المرشد النفسي إلى تشخيص دقيق لعرفة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذا الخوف لدى الطفل، والذي سوف نناقشه في الفصل السادس (التشخيص).

وقد تكون هناك عوامل وأسباب تخلق هذا الخوف لدى الطفل في البلاد العربية تختلف عن أسباب المخاوف المرضية لدى الأطفال المغاربة كما اظهرتها الدراسات المشار إليها سابقاً، وربما يكون السبب هنا الاتجاه العام لدى كثير من الآباء حول أهمية العلم والتعليم في هذه البلاد بعد أن طفت العوامل المادية والاقتصادية على كثير من أبناء الوطن العربي، والنظرية إلى المعلم ودوره في العملية التعليمية وصوريته أمام المجتمع من حيث المركز والدخل الاقتصادي. كما يمكن أن

توجد أدسّاب تتعلق بالنظام التعليمي القائم في تلك البلاد ودوره في خلق أساليب قائمة على تنمية الإبداع والتفكير الخلاق في جو ديمقراطي آمن.

وفي نهاية هذا العرض للأسباب المؤدية إلى خوف الطفل من المدرسة، نذكر مثلاً قدمه "بلاج" يوضح فيه الأسباب والعوامل التي دعت الطفل "امبروس" Ambrose للبقاء في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.

أحيل الطفل "امبروس" ابن الرابعة عشر عاماً وعشرة شهور إلى طبيب الأسرة من قبل الوالدين، حيث وجد أن الطفل يعاني من حالة قلق عالم أو معمم Anxiety State Generalised، فقد رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة منذ ثلاثة أسابيع ونصف خلت، وترافق هذا الرفض بشكوى مرضية دون أية أسباب عضوية حقيقة. فقد كان "امبروس" يرفض مغادرة المنزل والالتقاء بالناس، إلا أنه كان يفضل اللعب بالكرة في صباح كل يوم سبт بشكل متكرر. وقد فسر الطبيب حالة "امبروس" بأنه يعاني من قلق مزاجي أو مراقي Temperamentany، إضافة إلى إسهال متقطع وألم بطني منذ أن كان عمره أربع سنوات Anxious حتى تاريخ الفحص الطبي، كما أنه مازال يعاني منذ ذلك التاريخ وحتى الآن (تاريخ الفحص الطبي) من صداع ومشكلات معوية عرضية، وألم في التفوط بشكل مستمر. وقد أشارت النتائج الطبية أن "امبروس" كان طبيعياً من الناحية العضوية وأنه لائق صحياً للمدرسة. أما ما يتعلق بسلوك الطفل في المدرسة، فقد أكدت التقارير المقدمة من المدرسين أن الطفل كان لاماً باليهودية، لكن تحصيله الدراسي كان في حدود المتوسط. كما أظهر "امبروس" دليلاً على وجود اضطراب عصبي يعاني منه، وذلك كما كشف عنه مقياس السلوك الذي أعده يول Rutter & Yule (1968).



أما فيما يتعلق بالمنزل؛ فقد كان ترتيب "امبروس" الثاني بين أخوته الثلاثة، فقد كان الأخ الأكبر في الجيش، والأخ الأصغر كان مصاباً بالصرع. أما أم "امبروس" فقد كانت مرنة وواقعية، وأنها تأخذ كل شيء في خطوة واسعة في تربية أبنائها؛ وبالعكس كان الأب سلبياً وقلقاً أكثر من اللازم.

واظهرت المعلومات التي قدمتها عائلة الطفل عن "امبروس"، أنه قد رفض الذهاب إلى المدرسة كلياً في المرحلة الابتدائية، لكنه بعد فترة أصبح يرفض الذهاب إلى المدرسة بشكل متقطع، وأكد والد الطفل، أن "امبروس" قد أخذ إلى ملجأ عندما كان يعيش في قرية صغيرة حينما ذهب إلى المدرسة لأول مرة، وخلال هذه الفترة انفصل عن والديه ثلاثة مرات متقطعة، في سن السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة من عمره بسبب مكوثه في المشفي. أما من حيث قدرات "امبروس" فقد كان ذكاؤه دون المتوسط، حيث حصل على درجة قدرها (92) في مقياس الذكاء المفظي لوكلسون (1972) ومن جهة زملائه فلم يظهر امبروس أي اهتمام بهما بعد فترة غياب طويل عن المدرسة. إضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك سلسلة من الأحداث ترافقت أو تزامنت مع رفض الطفل للمدرسة، فقد بدأ يرفض المدرسة خلال الفصل الأول من السنة الرابعة، بعد أن قضى شهور الصيف مع جدته التي توفيت قبل ذهابه إلى المدرسة، كما فقدت العائلة في تلك الفترة كلبين وخمسة كلاب قبل أسابيع قليلة من رفضه للمدرسة. وفي الفترة نفسها تزوج أخوه الكبير لكن الزواج لم يكن موفقاً، أيضاً علم امبروس من العائلة أن صديق أخيه قد قتل بطلق ناري، هذه الأمور جعلت الطفل امبروس يرحب في البقاء في البيت بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.



5

النظريات المفسرة

للخوف المرضي من المدرسة





MOHAMED KHATAB

الفصل الخامس

النظريات المفسرة للخوف المرضي من المدرسة

مقدمة:

إن الباحث المطلع على أدبيات المخاوف المرضية من المدرسة يلاحظ أربعة تأثيرات أساسية ساهمت في تفسير سلوك الأطفال الذين يعانون من أعراض الخوف المرضي من المدرسة وهي كالتالي:

التأثير الأول:

جاء من دراسة فرويد الكلاسيكية لحالة الطفل "هانز" ابن خمس سنوات الذي كان يخاف من الأحسنة، حيث صيفت هذه الدراسة في شكل فرضيات الطفل الفردية، والتي تعطي دوراً مركزاً في عملية الإسقاط، وهي تشمل مفاهيم مثل التعلق المفرط، الإشباع المفرط، والتي ترتبط بقاعدة عامة في نظرية التثبيت أو التكوص إلى مستوى من مستويات النمو النفسي.

التأثير الثاني:

جاء من دراسة "جونسون وزملائهما" (1941) حيث بنت رأيها على الخبرة التي تم الحصول عليها من ممارسة الطلب النفسي على العائلة والطفل، وهذه إشارة واضحة على التأثير الأسري وعلى الدور الذي يلعبه أحد الوالدين في إثارة حالة الخوف المرضي من المدرسة والإبقاء عليها حكماً أكد عليها جون بولبي في نظريته حول الانفصال.



التأثير الثالث:

جاء من نظرية التعلم وخاصة آراء "ياتس" (1971) والذي يرى أن الخوف المرضي من المدرسة يفسر على أنه قلق انتقال عن الأم، وتعبيرات عن الاهتمام الزائد من قبل الأم للطفل، إضافة إلى ردود الأفعال المتعلقة بمخاوف الطفل وعدم قدرته الحصول على التعزيزات الاجتماعية في المدرسة مثل التحصيل الدراسي الجيد أو تكوين علاقات اجتماعية طيبة مع الأطفال الآخرين.

(107,234)

التأثير الرابع:

جاء من نظرية الذات والتي ركزت على تصور الطفل لنفسه وما تتمتع به من عناصر قوة أو ضعف.

لذلك سوف نتناول بشيء من التفصيل في هذا الفصل التأثيرات الأساسية التي ساهمت في إلقاء الضوء على تفسير ونشأة المخاوف المرضية عامة والخوف المرضي من المدرسة على وجه الخصوص.

أولاً: نظرية التحليل النفسي:

أصبحت نظرية التحليل النفسي أكثر انتشاراً في العشرينيات من القرن الماضي، حيث أعطت كتابات "فرويد" Freud في النمو الانفعالي للطفل أهمية كبيرة وخاصة التركيز على عقدة أوديب Odeb Comblex والتي تتحدث عن طفل لديه رغبة جنسية لاشعورية لإقامة علاقة مع أمها، وينمو هذه الرغبة بعد الطفولة أن والده منافساً له في حب أمها، ويتمني له الموت أو الأذى.

ومن هذا الشعور بالعداء يتولد صراع آخر هو عقدة الخصاء Castration Complex فالطفل نتيجة خوفه اللاشعوري من إيزاد الأب له يتخلّى عن رغبته الجنسية نحو أمه ويكتون لديه شعور بالتسامي يتحول إلى عاطفة وجдан، وفي الوقت نفسه يحاول أن يتكيّف مع والده ويتقنّص شخصيّته، وبهذه الطريقة يتكون تديه ما يسمى "بالأنا الأعلى أو الضمير". ويرى أصحاب هذه النظريّة أن حدود المخاوف المرضية تكون في مرحلة المكمون (من 6 - 12) مصاحبة لنمو الأنماط الأعلى وأكتماله، وذلك لقدرة الطفل على استخدام العين الدفاعيّة أو الوسائل الدفاعيّة الأولى التي يستخدمها الطفل لحماية الأنماط الخاصّ به: فالطفل هنا يبدأ بمحاولات كسب الصراع إلا أنّ هذا الكسب لا يكفي، فيلجأ الطفل للنقل أو الإزاحة Displacement والتّميّز بـأن يحوّل موضوع الخوف الأصلي إلى موضوع آخر بديلاً، فبدلاً من خوف الطفل من الأب، على سبيل المثال، يخاف من حيوان ما، وبدلًا من الخوف من الخصاء فهو يخاف من عض الحيوان، كما أنّ الطفل يستخدم التّميّز وذلك بأن يجعل موضوع الخوف الجديد يرمي إلى موضوع الخوف الأصلي؛ فالواقف والشخصيات المخيّفة تتّنطوي دائمًا عند الشخص الخائف على دلالة لاشعورية، خاصة وأنّه يرمي إليها بشكل محرّف، إما لغاية رغبة مكبّوتة، وإما إلى عقوبة رغبة مكبّوتة، وإما إلى الأمرين معاً.

(84,44)

ويرى فرويد أن المخاوف المرضية هي مخاوف تبدو غير معقولة ولا يستطيع الشخص أن يفسر منها، ورغم شعور المريض بخواستها إلا أنه يستطيع التخلص منها.

كما يميّز فرويد بين المخاوف المرضية وبين القلق الهائم الطليق، بين قلق المخاوف المرضية يتعلّق بشيء معين، ويختلف قلق المخاوف المرضية أيضًا عن القلق الموضوعي بأن القلق الموضوعي خوف من خطر حقيقي، وهو يبدو خوفًا معقولًا ومنطقياً، بينما قلق المخاوف المرضية ليس خوفًا معقولًا ولا يمكن تبريره.

وقد ميز فرويد بين مرحلتين في تكوين الخوف المرضي هما:

- المرحلة الأولى: كبت للرغبة الجنسية، وتحول هذه الرغبة إلى قلق، ثم تعلق القلق بخطر خارجي معين.
- المرحلة الثانية: تنشأ بعض الاحتياجات ووسائل الدفاع التي تعمل على تجنب التعرض للخطر الخارجي، ويرى فرويد أن القلق لا يسبب العصاب بل إن العصاب يحدث أولاً، إذ يساعد العصاب على كبت الرغبة الجنسية، وحينما تكبت الرغبة الجنسية تتحول الطاقة الجنسية مباشرة وبطريقة هيزيولوجية إلى القلق. وعلى ذلك فليس للقلق أي دور في نشوء الأعراض العصبية.

ويبدو أن المخاوف المرضية، في رأي فرويد تنطوي على سمتين أساسيتين هما:

1. تنفصل عن قاع القلق العام.
2. ليست ذات علاقة باللاشعور أو الكبت، بل ذات علاقة دفاعية بالليبيدو، إذا كانت تبحث عن توظيف لها ولم تفلح في ذلك.

(11.3)

وقد توصل إلى هذه النتيجة من خلال تحليله لبعض حالات المخاوف المرضية مثل: حالة الطفل هائز ابن خمس سنوات الذي كان يخشى الخروج إلى الشارع خوفاً من أن تعصمه الخيول، وحالة الشاب الروسي الذي كان يخاف أن تعصمه الذئاب. وقد استخلص فرويد من الحالتين وحالات أخرى قام بتحليلها أن حالات المخاوف المرضية كلها تصاحبها رغبة جنسية غير مقبولة، ثم إن الخوف من العقاب هو عبارة عن خوف من الخصاء. وقد أبدل "هائز" الخوف من الخصاء وحل محله الخوف المرضي من الخيول. وهكذا توصل فرويد من تحليله لمخاوف المرضية إلى أن القلق العصبي من المخاوف المرضية هو قلق من خطر حقيقي هو الخصاء.

(26-25,26)

وقد لخص "ايدلبرج" حالة هانز بما يلي:

1. إن الخوف من الحصان يرجع إلى حقيقة مؤداها أن الحصان كان الرمز الملاشعوري لأبيه.
2. الخوف من أبيه كان سببه الكراهيّة التي ابتعثها الأب عند هانز الصغير عندما طرده من فراش أمه.
3. كان الطفل عاجزاً عن القضاء على أبيه والنوم مع أمه، وعاجزاً عن التخلص عن هذه الرغبات التي كان هانز يكتتها.
4. نتيجة لهذا الكبت، فإن الرغبات الممنوعة بقيت نشيطة في اللاشعور حيث تظل السيطرة بوساطة الخوف وبالإسقاط تغيرت. "أني أكره أبي إلى "إن أبي يكرهني".
5. إزاحة رغباته على الحصان حيث ذجح الطفل في التخلص من الشعور بالخوف في المنزل.

ومن زاوية الاقتصاديات النفسيّة، فإن كبت الرغبة الليبيدية ابتعثت غرائز التدمير التي كان إفراها بعد ذلك ضد الذات.

(17,25)

وفي حديثه عن تطور الفوبيا، يرى فرويد أن القلق حين يتفجر يتبعه في الأغلب ظهور الخوف المرضي، بمعنى تجنب الموقف أو المدركات المثيرة للقلق. وأحياناً يكون من الممكن تجنب القلق باستحداث خوف ملائم يدفع الآنا شنه بالحد من حريته. عندئذ يمكن أن يصل المرض إلى نقطة مميتة، حيث يكون الخطر القريزي قد تحول كلياً وينجاح إلى خطر خارجي، ولكن في حالات أخرى لا يكون التطور مواتياً على هذا النحو، ففي مراحله الأولى يمكن أن يتعدّد العصاب بعصاب صدمي ثانوي تسبّبه ذوبنة القلق الأولى، فالكثير من القلق تولد - ابتداء من مثل هذه الصدمة - خوفاً من القلق، وتولد في نفس الوقت استعداداً للخوف لأنفذه

الأسباب، مما قد يخلق حلقة مفرغة، وبعض المخاوف لا ينبع في محاولتها للإسقاط فتتضي مستفحلة في نموها.

(246, 5)

كما يتحدث فرويد أيضاً عن مظاهر القلق عند الأطفال، فيرى أنها تحدث مثلاً عندما يكون الطفل وحيداً أو أثناء وجوده في الظلام، أو عندما يجد نفسه مع شخص غريب غير مألوف لديه. ويمكن إرجاع هذه الحالات الثلاث إلى حالة واحدة وهي افتقاد شخص محبوب ومشوق إليه. ويرى فرويد أن الصورة الموجودة في ذاكرة الطفل عن الشخص المحبوب تكون مشبعة بشحنة وجاذبية قوية، ومن المحتمل أن يتخذ ذلك صورة هلوسية في أول الأمر، ولكن ليس بذلك أي تأثير. كما ترى نظرية التحليل النفسي أن المولود يشعر بعجزه وينتظر تأتى الصرخة الأولى (عملاً مناسباً)، ليتحقق له الإشباع، حيث الصرخة تتطلب حضور الآخر (الأم) الذي تريده علاقه مودة وعطف. وانطلاقاً من هذا الموقع تأخذ صرخة الطفل أهميتها فالعجز الأساسي يتكامل مع دعوة وتلبية الآخر لطلباته.

(فرويد، 1983، 152)

إن القلق يظهر كرد فعل لشعوره (بفقدان الموضوع) وهذا مشابه لخبرات الرضيع عند الميلاد (صدمة الميلاد) حيث يظهر القلق الأول، والذي يستحضر في موقف الانفصال عن الأم. فتكرار الخبرات (حضور - غياب) ضروري قبل أن يتعلم أن غيابها دائماً يتبعه حضورها، والأم هي من تشجع على تعلم ذلك الذي هو أساس للطفل، لكن خبرة الطفل قد تعلمه أن الموضوع (الأم) حاضر لكنه غاضب منه، وهنا يكون قلقه بسبب (خطر فقدان الحب)، كما أن حضور الغريب، بدل أمه، يخيقه والخطر هنا يعزى (لحظر فقدان الموضوع) ولكن تعبيرات الطفل وبكاءه تدل أيضاً على شعوره بالألم لعد تمكنه من التمييز بين الغياب المؤقت والفقدان المستمر (إلا بعد تكرار الخبرات).

(فرويد، 1983، 151 – 152)

ويشير فرويد إلى أن الأم هي مصدر التخيف من التوتر الناتج عن الدوافع النفسية للطفل، ويرى أن الطفل يظهر عليه القلق كعلامة للتعبير عن الله ورغبته في عودة الأم، وأن هذا القلق يتتطور عبر عملية التعلم. كما أنه اعتبر أن القلق من شيء معروف يعتبر واقعياً وإن القلق من شيء غير معروف يعتبر عصابياً. وفي ضوء نظريته هذه يُعتبر الأطفال عصابيون.

(Keable, 1997, 50)

لقد تلخص (فرويد) الأهمية المركزية التي أعطاها لحالة (قلق الانفصال) إن القلق هو رد فعل للخطر من فقد الموضوع، أي إن القلق يكون عند توقع الانفصال عن موضوعات الارتباط.

(حب الله، 1990، 305 – 307)

يتبيّن من نظرية فرويد أن أعراض العصاب هي نتيجة لوجود رغبة مكبوتة وعندما يخاف الشخص من حدوث شيء ما، فإن خوفه هذا يشير إلى أنه يريد لهذا الحدث أن يحدث، ولكن الرغبات المكبوتة لا تظهر إلا عن طريق معالجة تقوم على التحليل النفسي. أما "إدلر" Adler فإنه لم يتمناول مشكلة الخوف بشكل منظم غير أنها يمكن أن تلمس ذلك في كتاباته حول فكرة الشعور بالنقص، والذي يتضمن الخوف والقلق. كذلك الخوف في نظر "يونج" Jung هو عبارة عن سيطرة محتويات اللاشعور الجماعي غير المعولة، التي لا تزال باقية فيه من حياة الإنسان البدائية.

ويفسر "رانك" Ranek جميع حالات القلق بأنها قد نشأت منذ لحظة الميلاد أو صدمة الميلاد، وهي عبارة عن تنقيس لانفعال القلق الأولي. والانفصال عن الأم هو الصدمة الأولى التي تثير القلق الأولي، ويصبح كل انفصال فيما بعد من أي نوع سبباً لظهور القلق والمخاوف. فالقطام يثير القلق لأنه انفصال عن ثدي الأم، والذهاب إلى المدرسة يثير القلق لأنه يتضمن انفصالاً عن الأم، وهكذا.

(35, 1989, 26)

وتري آندا فرويد أنه لا يمكن لأي طفل أن يندمج في المدرسة قبل أن يتحول البيبيدو من قبل الوالدين إلى المجتمع، وعندما يتاخر أو يعاف المرور في العقدة الأوديبية، فإنها تتدفق كنتائج للعصاب الداخلي وبالتالي فإن الاختطاب في التكيف مع الجماعة ونقص الاهتمام ومخاوف المدرسة، تصبح النظام اليومي.

(١٤، ٦)

هذا، وقد قام برودوين (1932) بتطبيق نظرية التحليل النفسي على نوع من الهروب والذى يقوم به طفل يعاني من العصاب الوسواسى Obsessional Neurosis بالهروب من المدرسة إلى البيت في حالة من الرعب، وحينما يصل إلى المنزل تبدو عليه حلامات السعادة والارتياح، ولكن عندما يعود أو يرجع إلى المدرسة تبدو عليه علامات القلق مرة أخرى.

وقد وصف "برودوين" كيف أن الطفل أثنت معالجته يبدو وكأنه يجري نحو المنزل لتصوره أن شيئاً مخيفاً يحدث لأمه. كما يرون أيضاً على خوف الطفل من ذلك عندما يكون بعيداً عن أمها، ويعتقد الله يريد أن يكون قريباً منها. وفي هذه الحالة يتولد بداخله صراع بين حبه لأمه واتجاهاته العدوانية نحوها، أو صراع بين الرغبات الغريزية الأولية (اللاشعورية) ومكونات الأذى.

بينما يؤكّد بعض العلماء من أنصار مدرسة التحليل النفسي على حماية الأم الزائدة للطفل ربما تكون في بعض الأحيان انعكاساً لكراسيتها لها. إلا أنه من الحاجات الأساسية للإنسان أن يشعر أنه محبوب ومرغوب فيه، ورغبة الأم – في هذا المقام – أن تشعر أنها لا غنى عنها، هي مجرد استمرار ومبالفة في هذا الاحتياج. وتشعر كثير من الأمهات بالأسف الشديد عندما يرثن أطفالهن قد كبروا وأخذوا بالاستقلال شيئاً فشيئاً، وتقول الأم في نفسها: "إن أفضل الأوقات بالنسبة لي (لأمي) هي عندما يكون أطفالي صغاراً".

النظريات المعاصرة للخوف المرضي من المدرسة

والأم التي تتسم بالحماية الزائدة لطفلها لا تستطيع أن تبتعد عنه وتعامله دائمًا على أنه طفل رضيع، فهي إما أن تتعلق العنان له، أو تسيطر عليه بشكل غير عادي.... ففي الحالة الأولى يميل الطفل إلى الانانية والعدوان، وفي الحالة الثانية يميل الطفل إلى الخضوع، والطفل الذي يخضع للحماية الزائدة يمكن أن يصبح منقطويًا لكنه عادةً ينجح في دراسته، وكيف نفسه مع الواقع عند البلوغ، وربما يرجع ذلك إلى أنه يكون منظماً في نواحٍ معينة مثل عمل الواجبات المدرسية.

بينما ترى جونسون ورفاقها (1941) من خلال الدراسة التي قاموا بها على (8) أطفال يعانون الخوف المرضي من المدرسة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تشكل الأسباب الفعلية - من وجهة نظرهم - المسؤولة عن المخاوف المرضية من المدرسة وهي:

1. قلق حاد لدى الطفل.
2. قلق متزايد لدى الأم.
3. عدم حل مشكلة العلاقة الاعتمادية في مرحلة الطفولة بين الطفل وأمه.

ومن هنا استخلصت جونسون ورفاقها نتيجةً مؤداها أن الخوف المرضي من المدرسة عبارة عن "قلق الانفصال" ناتج عن علاقة اعتمادية بين الأم والطفل لم يتم حلها.

(72 – 71,81)

ويؤيد البعض أمثال "دافيد سون" و"استز" وهايльт" (1961)، Hayhet, Estes And Davidson وجهة النظر التي ذهبت إليها جونسون بالقول: إنه ما يبدو أنه خوف من المدرسة لدى الطفل وما يكون في الحقيقة خوفاً من الانفصال، وقالوا: إن الطفل عندما يكون قلقاً، حين يذهب إلى المدرسة، فذلك لأنه يترك أمه ولأنه في غيابها عنها يتحقق ميلوه العدوانى نحوها، فالقلق هنا - من وجهة نظر دافيدسون ورفاقه، يعكس الكراهية للأم ويكشف الطفل أن أمه تضطهدته. كما ان الطفل الذي

يعاني أعراض الخوف المرضي من المدرسة يتصنف في كثير من الأحيان بالإفراط الزائد بالاعتماد على أمه. فالعلاقة القائمة بين الطفل وأمه تأخذ في أحياناً كثيرة طابع الاعتماد الزائد من جانب الطفل ورغبة مفرطة في تقديم العون والمساعدة من جانب الأم، وهذا ما يسبب لها ولطفلها القلق عندما ينفصلان عن بعضهما بعضاً، كما يجعلها تتضامن من احتياجات طفلها لأنها تشعر في قرارة نفسها أنها غير قادرة على الوفاء به. وغالباً ما تكون للأب اتجاهات مماثلة في حالات الخوف المرضي من المدرسة فيكون الأمر كما لو كان للطفل أمان قلقتان عليه، بدلاً من أم واحدة.

(154,61)

ظمانية الوالدين الزائدة إذاً تمنع الطفل من السيطرة على انفعالاته والتغلب على صعوباته، كما تمنعه من النمو.

وأخيراً يمكن أن نجمل مجموعة من الانتقادات الموجهة إلى نظرية التحليل النفسي في تفسيرها للخوف المرضي من المدرسة.

واهم هذه الانتقادات:

1. إن الكثير من التوضيحات التي قدمتها هذه النظرية لتفسير ظاهرة خوف الطفل من المدرسة أو رفض المدرسة هي عبارة عن حقائق غير واقعية وغير موضوعية، لأن هذه الحقائق التي اعتمدت عليها النظرية التحليلية لم تكن مبنية على البحث العلمي الدقيق وإنما جاءت أوصافاً لحالات من الأطفال يعانون من أعراض الخوف المرضي من المدرسة.
2. استخدام منظرو هذه الاتجاهات في تفسير المخاوف المرضية من المدرسة لدى الأطفال المفاهيم والمصطلحات نفسها التي استخدموها في تفسير مخاوف الكبار ومعالجتهم عند تفسير ومعالجة مخاوف الأطفال.

3. إن الاقتراحات التي قدمت لتفسير سلوك الطفل الرافض للمدرسة هي تفسيرات ذاتية، ولا يمكن تعميمها على كل الحالات التي تعاني الخوف المرضي من المدرسة.

ثانياً، نظرية التعلق ولائق الانفصال:

اهتمت نظرية التعلق لوبلي (Bowlby) بدراسة العلاقة بين الرباط الذي يظهر وينمو بين الآباء والطفل في الطفولة المبكرة، وبين الصحة الجسمية والانفعالية والعقلية للطفل في المراحل التالية. (Woodard, 1996, 32) كما يرى (بولبي) أن الارتباط ناتج عن مجموعة من ردود الفعل الفطرية، التي تعتبر ذات أهمية من أجل الحماية وبقاء النوع. سلوكيات الرضيع مثل البكاء والابتسامة والرضاعة والانتصاق والمتابعة... وتؤدي إلى حد الألم على رعاية الطفل والاهتمام به وتعزيز التواصل بينهما. فالماء - بیولوچیا - مهیأة للاستجابة لإشارات الرضيع، بالمقابل يستجيب الرضيع لرؤية وصوت وإشارات الأم، ونتيجة الأنظمة المبرمجة بیولوچیا يكون كل من الألم والرضيع ارتباطاً متبادلاً.

(Hetherington & Parke, 1983, 222)

لقد سلم (بولبي) وهو يدرس ظاهرة الارتباط بأن سلوكيات الرضع الدالة على الارتباط، تهدف إلى البحث عن الإشباع من خلال الاتصالات الجسدية مع الأم وكأنها حاجة، وأن هذه الاتصالات تؤدي إلى الشعور بالأمان وتخفيض الخوف، بينما يكون الخوف ناتج عن ابتعاد الأم عن الرضيع. حيث إنه كلما زاد الارتباط بين الأم والرضيع، كلما ظهر على الرضيع الخوف من الانفصال عنها والخوف من الغرباء وهذا ناتج عن نمو القدرة الإدراكية للرضيع مما يمكنه من اكتشاف السمات الجديدة أو الغريبة للأفراد والأشياء وبالتالي ارتفاع درجة الخوف من الغرباء مع التقدم في السن. ومظاهر الخوف تدفع الأم إلى الاتصال بالرضيع، فضلاً عن أنها مرتبطة بالتخفيض من الخوف.

يقول بولبي: إنه من مجرد ملاحظة الصفار خلال الحياة اليومية، يتبين أن وجود ألم متداوٍ يجعل الرضيع مسروراً بشكل عام، أو بمجرد أن تناح له حرية الحركة يستكشف عالمه بثقه وشجاعة؛ فنجد أن الرضيع سيكون عرضة للإصابة بالأنسى، والاستجابة لكل أنواع المواقف الغريبة وغير المتوقعة ولو بشكل طفيف بالانزعاج. علاوة على ذلك، فإنه عندما ترحل الأم أو يعتذر وجودها يقوم الطفل بردود أفعال تهدف إلى استردادها أو تسهيل وجودها، ويكون قلقاً حتى يتحقق هدفه.

(بولبي، 1991، 31)

ويتساءل بولبي هل غياب الألم عن الطفل في حد ذاته يثير الخوف لدى الطفل دون أن تكون هناك ضرورة لأي شكل من أشكال التعلم، أم إن مثل هذا الخوف يظهر عندما يربط الطفل غياب الألم بخبرة مخيفة؟ يجيب عن ذلك بقوله: إنه آيا كانت الإجابة عن تلك الأسئلة، فإن الوحدة تحمل مخاطرة عالية بالنسبة للأطفال والأفراد الضعفاء، ويمكن اعتبار استجابة الخوف لغياب الألم، استجابة تكيف أساسية، يمعنى أنها استجابة أصبحت أثناء عملية النمو جزءاً عضوياً من مجموعة السلوكيات للإنسان بسبب مساهمتها فيبقاء النوع. ولكن يعود بولبي فيقول: يستبعد الاعتقاد بفرضية أن سلوك الخوف غيريزي في حالة غياب الألم، بشكل مطلق، وذلك لأن التعلم أساس لتطور أنواع السلوك. وهنديما ينشأ القرد في بيئته الأنواع التي تكيفت تطويرياً مع تلك البيئة فإن الفرصة للتعلم تكون دائماً موجودة.

(William, et al., 1998, 207)

إذا فالتعلم ضروري لتطور السلوك، فمن طريق التعلم الارتكابي يتعلم الرضيع أن وجود الألم يكون مصحوباً بالراحة، بينما يكون غيابها مصحوباً بالضيق، ومن جهة أخرى يكون الرضيع خائفاً بشكل أكثر حدة من المواقف المثيرة للخوف مثل الغرابة أو الاقتراب المفاجئ أو الضجة العالية... عندما تكون أمه غائبة عما لو كانت موجودة، فيربط بين غيابها ودرجة ما من درجات الانزعاج أو الضيق ويدرك

النظريات الفحصية للخوف/الرضا من المرض

ينمو أكثر ميلاً للخوف من الانفصال - سواء أكان الانفصال فعلياً أو متوقعاً وأكثر استعداداً للاستجابة لأى موقف مثير للخوف، بخوف أكثر وضوحاً من الأفراد الآخرين وكقاعدة عامة، يمكن أن تؤدي الخبرة المخيفة والقصص المسموعة إلى ازدياد استعداد الفرد للخوف في مثل هذه المواقف النوعية فقط، بينما يؤدي عدم التأكيد من توفر موضوع الارتباط إلى ازدياد القابلية للخوف من مجال واسع من المواقف، فالفرد وعندما يكون منذ الميلاد تحت تأثير منبهات حب فإنه يصبح مغلقاً تجاه كل المثيرات الأخرى.

(بولي، 1991، 133 – 135)

فيiri بولي أن قلق الانفصال ينبع عنه آلية احتجاج، ويمكن رؤية هذه الآلية في الحيوانات التي تفترض فيها نقص الأدوات المعرفية الضرورية لتعلم أن الانفصال يتضمن إحباطاً لاحتياجاتهم الفسيولوجية، فيؤكد بولي أنه في المرة الأولى التي يحدث فيها الانفصال يبدأ التعود بصورة مكثفة على الخوف، ولكن إذا استشعر الطفل احتمالية زيادة الانفصال ينبع عن ذلك نمط متواصل بشدة من القلق، ويلخص هذه المراحل التي نلاحظها عند مرور الطفل بخبرات الانفصال كما يلي:

1. احتجاج من قبل الطفل يحاول فيه استعادة أمّه المفقودة، وهي المرحلة الأولى من قلق الانفصال.
2. اليأس مع الحرص المستمر على عودة الأم، وهي مرحلة الحزن والحداد.
3. نقص الارتباط حيث يبدو أن الطفل ينسحب ويفقد اهتمامه بالأم، وهي مرحلة دفاعية.

(Keable, 1997,48)



ويظهر الخوف من الغرباء بوضوح أكثر لدى الرضيع الذي لا يرى سوى أمه. حيث الرضيع اعتناد وألف رؤية الأم، فالتعارض بين المألف والغريب هو ما يثير الخوف من الغريب، والخوف من الانفصال عن الأم (المألف). (الكتابي، 2002، 223) فخوف الرضيع من الغريب حسب نظريات التعلم يعود إلى التعود على رؤية المألف والعجز عن التكيف السريع مع كل ما هو غريب وغير مألوفة لها يمكن للملأوف (الأباء مثلاً...) نفسه أن يصبح مخيفاً إذا اتى بسلوكيات وتعابير غير مألوفة وهنا يتولد الصراع، وتلعب جدية المألف وغير المألف دورها، إن اختلاط المألف بغير المألف هو ما يجعل الموضوع مخيفاً. (مبروك ربيع، 1991، 46) إذا قالمبادئ الأساسية في (نظريه التعلم) وهي: التدعيم، التعود، التعميم، الملاحظة، الانفصال، الاقتران الشرطي... تفسر كيف يمكن لخوف الانفصال وخوف الغرباء عند الرضيع أن يتطور إلى أشكال أخرى من المخاوف وإلى مخاوف لا حصر لها.

إن استجابات الرضيع التي ترتبط بالدعم أو الإثابة تتحول إلى استجابات متوقعة مع تقدم النضج الإدراكي، فالطفل يتعلّق بالأم لذاتها ويتوّقع حضورها، لذا يصبح الخوف هنا محتملاً عند غياب الأم أو حضور غريب.

(Hetherington & Parke, 1983, 223)

ثالثاً: نظريات التعلم وقلق الانفصال:

ينتج سلوك الطفل عن عاملين هما: طبيعته البيولوجية، والتعلم الناتج من تفاعل الطفل مع الآخر... فالآخر يكون مصدراً للدعاوى والمخاوف، ونظريات التعلم ترى أن الدافع الأساسي للمألف هو الجوع فيكون الدعم الأولى الذي يشبع هذا الدافع البيولوجي هو الغذاء (الحليب)، تأخذ الأم قيمة إيجابية عن طريق الاقتران بالإشباع وتخفيف الألم وتكون بمثابة دعم ثانوي يكتسب خصائص الدعم الأولى لاقترانه به، ونتيجة التكرار المرتبط بتخفيف دافع الجوع يُصبح مجرد حضور الأم ذات أهمية للطفل فيتعلق بها ونمو الطفل يكتسب الحاجة للتتفاعل والتواصل

النظريات المفسرة للخوف المرضي من المدرسة

مع الأم، وال الحاجة إلى الحب والعطف وال الحاجة إلى الأم، وبذلك تصبح الأم مصدراً للدروع والمخاوف والرغبات.

(Woodard, 1996, 35)

نظريّة جون بولبي للخوف المرضي من المدرسة:

يستخدم جون بولبي "مصطلح رفض المدرسة" أو خواص المدرسة بدلاً من "الخوف المرضي من المدرسة" ليشير من خلاله أن هناك بعض الأطفال يرفضون الذهاب إلى المدرسة أو الالتحاق بها ويظهرون قلقاً أكبر عندما يجبرون على الذهاب إليها، ويكون عدم التحاقهم معروضاً بشكل جيد لأبويهما. ومعظمهم يمكثون في البيت أثناء ساعات المدرسة، وكثيراً ما تصاحب حالة الرفض هذه أعراض نفسية - بدنية (سيكوسوماتية) مثل: العزوف عن الطعام، الشعور بالوهن، آلام البطن، الغثيان...

ويرى "جون بولبي" (1973) أن هناك اتفاقاً واسعاً بين الباحثين على أن ما يخافه الطفل ليس سوف ما يحدث في المدرسة، ولكن ما يخافه هو ترك المنزل، وإن المظاهر غير المناسبة للمدرسة، مثل مدرس صارم أو مضائقته على الطفل من قبل أطفال آخرين ليست سوى تبريرات، حكماً أن الخوف يكون على أشدّه لدى الطفل إما قبل ترك المنزل أو أثناء الذهاب إلى المدرسة.

هذا، ويشير بولبي إلى أن أغلب حالات رفض المدرسة التي تشاهد عند بعض الأطفال هي نتيجة لواحد أو أكثر من نماذج التفاعل الأسري بين الطفل والوالدين، والنماذج التي قدمها بولبي في نظريته "قلق الانفصال" لتفسير هذه الظاهرة هي الآتية:



النموذج الأول:

“تعاني الأم – ونادراً الأب – من قلق مزمن بالنسبة لوضع الارتباط، حيث تبقي الطفل في المنزل ليراقبها”.

أحياناً قد تخاف بعض الأمهات اللواتي يعانين من القلق من بقائهن لوحدهن في المنزل بمفردهن، بعد ذهاب الزوج إلى العمل في الصباح. لذلك قد تلوذ الأم بصحبة طفلها في ظل غياب الزوج، وقد لا تعرف الأم _ أحياناً _ بهذا أمام نفسها، فهي غير مدركة لرغبتها بصورة عامة، حيث أنها تسمح للطفل بالتفبيب عن المدرسة في الأيام الممطرة، أو شديدة الحرارة، أو عندما يتعرض الطفل لأذى حقيقي سخيف في جلده أو يده على سبيل المثال. وفي حالات كثيرة يشعر الطفل بنفس برغبة أمه نفسها، حيث يختلف معاذير وحجج لعدم ذهابه إلى المدرسة.

(2.9,9)

ويذكر بلاج (1987) في كتابه الخوف المرضي من المدرسة حالة طفل عمره عشرة سنوات بقي في المنزل لأكثر من عام كامل عندما كانت الأم مريضة، ورغم أن الأم صرحت في البداية أنها ضفت على ابنها لكي يذهب إلى المدرسة، ولكن وبعد فترة من الزمن صرحت بأنها – في الحقيقة – لم تكن ترغب في ذهاب ابنها إلى المدرسة، لأنه كان بالنسبة لها الشخص الأول الذي أحبته في حياتها وإنها لا تستطيع أن تتخلص منه.

وقد اعتبرت جونسون (Gohonson) (1941) أن الأسباب الحقيقية لرفض الطفل الذهاب إلى المدرسة هي قلق الانفصال الذي ينتج عن علاقة اعتمادية بين الأم والطفل لم يتم حلها.

إن الأم التي تبقي طفلها في المنزل ليقوم بدور الرفيق لها، قد تكون مدركة لهذا العمل أو لا تكون، وكثيراً جداً ما تكون الأم غير واعية بشكل جزئي لما تفعله.

ويعرض "ازينبرج" (1985) صورة واضحة لأمهات عندما يصلن إلى المدرسة مع طفليهن يظاهرن مقاومة شديدة للتخلص عنه بطريقة تجعله قلقاً، وربما يشعر بالذنب بالاستمتاع بصحبة أي أحد آخر غير الأم، وبصف "ويس و Skinner" (1964) أمهات يصرحن بأنهن يحمين أطفالهم من رعب العالم الخارجي، وبينما يفعلن ذلك فإنهن لا يحملن لهم قلقهن الشخصي والزوجي فقط، ولكن يرغبن في دعم ذلك، ولذلك عندما يوجد هذا النوع من العلاقة العائلية فإن الأم تكون قلقة بشدة بالنسبة لتوفير موضوعات ارتباطها، وبصورة لا شعورية تقلب علاقتها (والد - الطفل) الطبيعية وهذا يجعل الموضوع هو والد، وتأخذ الأم نفسها دور الطفل، وكقاعدة يتم تمويه عملية القلب تلك، حيث تصرخ الأم في بعض الأحيان بأن الطفل بحاجة إلى العناية والراحة وأن الطفل هو الذي يحتاجها، وفي الواقع إن ما يحدث هو عكس ذلك تماماً: إن الأم غير واعية أو غير مدربة بنفسها - أن هناك إشباعاً متأخراً لرغبتها في رعاية وعناية خاصة لم تحصل عليها أبداً، أو من المحتمل أنها فقدت أنها أشاء طفلتها وفي الوقت نفسه تمنع طفلها من اللعب في نشاطات المدرسة مع أقرانه.

ويمكن تأويل ذلك بأن الأم التي تعامل طفلها بهذه الطريقة ما هو إلا تكرار لأمها هي نفسها، حيث ترثب الأم من طفلها ليس فقط الرعاية والراحة التي طلبتها من أمها، بل وقد تتصرف نحو طفلها كما لو كان موضوع السيارة فيما هي في لحظة ما قد تستنشط غضباً بما تشعر بأنه رفض من طفلها، كما تفعل تجاه صدود أمها.



ويمكن وصف المعاملة العدائية التي يواجهها الطفل الرافض للمدرسة من والد مضطرب عاطفياً من خلال ثلاث عمليات هامة:

1. إعادة تحويل الغضب الناشيء في البداية عن طريق أمها هي نفسها ضد الطفل.
2. سوء عزو الصفات الرافضة للطفل و/ أو السمات التي تظهر فيها أمها كثيرة المطالب وبالتالي تكون الأم غاضبة على طفلها.
3. قوية السلوك القاخص ضد الطفل على السلوك الغاضب الذي تظهره أمها.

ويفسر بولبي هذه العمليات بالقول: إن الأم تتضامق من عاطفة أمها الصغيفية تجاهها، وأيضاً من المطالب المفرطة التي تمارس عليها ومع هذا تشعر بأنها غير قادرة على التعبير عن غضبها الواضح، لأنها إما أن تكون خائفة من استجابة أمها وإما أن تخاف أن تسبب لها مرضها، وفي كلتا الحالتين فإن الأم لا بد أن تجد - عاجلاً أو آجلاً - شخصاً تفرغ شحنتها الانفعالية، وهذا الشخص هو غالباً الطفل. كما يلاحظ أن التهم التي توجهها الأم ضد طفلها هي تكرار لتلك التي تبيتها بشكل ظاهر أو ضمني نحو أمها. فعلى سبيل المثال، ربما تغير الأم بطفلها أولاً مطالب غير معقولة ثم تلقي بملحوظاتها اللاذعة لمطالبها التي يقوم بها ظاهرياً، عندها يبدو الطفل لملاحظة الخارجي وكأنه يتصرف بشكل مختلف عن أي طفل آخر في مثل سنّه إذا وضع في الظروف نفسها، ونتيجة لذلك فإن الأم تتقولب الطفل على نموذج شخص الارتباط والذي تتوقع سلوكه.

النموذج الثاني:

"يخاف الطفل أن يحدث شيء ما مرعب قد يحدث للأم أو ربما للأب عندما يكون في المدرسة لذا يبقى في البيت ليمنع حدوث هذا الشيء المرعب".

يرى بولبي أن هذا النموذج هو أكثر النماذج تكراراً، ويحدث بالتوافق غالباً مع النموذج الأول ومقرنا به. فقد أظهرت الدراسات التجريبية بأنه من الشائع

الانحرافات المفجعة للخوف المرضي من المدرسة

للاطفال راضاً المدرسة أن يذكروا أن سبب عدم ذهابهم للمدرسة هو الخوف، مما قد يحدث للأم خلال ابعادهم عن المنزل.

ويفسر هذا أن الطفل يضم رغبات عدائية لا شعورية ضد الأم، ويكون خائفاً خشية أن تقدر الرغبات الحقيقة أو أن يعزز مخاوف الطفل إلى خبراته، فعلى سبيل المثال قد يصبح الطفل خائفاً على أنه لأمه ربما تتعرض أو تتموت أثناء غيابه عن المنزل ووجوده في المدرسة، بعد أن يسمع أو يرى مرض أو موت أحد الأقارب وخاصةً عندما تكون الأم نفسها في صحة سيئة.

(17,20)

ويرى وولمان أن الخوف المرضي من المدرسة قد يولده ازعاج الطفل من أن شيئاً فظيعاً قد يحدث للأم أو للأب في غيابه في الظروف العادية، حيث ينظر الأطفال إلى آباءهم على أنهما أقواء وودودون، ويمكن الاعتماد عليهم لذا يعتريهم قلق شديد عندما تبدو على أحد الوالدين أو كليهما الأمراض الحقيقة أو المتخمة، أو عندما يقضون بأسرارهم ويشكون للطفل أو إذا قدموا أنفسهم بصورة مخلوقات ضعيفة، ونتيجة لذلك تقلب الأدوار الاجتماعية؛ فالطفل قد يتزعج على والديه بدلاً من أن يزعجاً هما عليه.

(188,9)

لذلك أشارت تابيوت (1957) إلى هذه الحقيقة مستشهدة بحالة بنت مراهقة اكتشفت فجأة في لحظة تقبيلها لجدتها قبل ذهابها إلى المدرسة مباشرةً بأنها كانت ميتة.

(22,11)



MOHAMAD KHATAB

ويلاحظ من هذا أنه حينما يظهر الطفل الرافض للمدرسة القلق على الوجود والأمن الدائمين لأحد أبويه فإن هذا يكون استجابة مباشرة للأحداث الحاصلة داخل أسرته، ويمكن أن يقال أيضاً بالنسبة لدرجة القلق الزائدة التي تنبع من الخوف من احتمال إدراك الرغبات العدوانية اللاشعورية؛ والتي تنشأ - على الأرجح - كاستجابة لما يحدث خلال المنزل.

النموذج الثالث:

"قد يكون الطفل خائفاً منذهابه إلى المدرسة خوفاً مما يمكن أن يحدث له هو نفسه في حالة ذهابه إليها وعادة ما يكون التفسير هو تهديدات الأبوين له".

تؤكد نظرية التحليل النفسي وفقاً لما يقرره كينيدي على الدور الذي تقوم به الألم في ظهور الخوف المرضي من المدرسة. كما اقر سبرننج (1964، Sperling) وجهة النظر هذه حيث يؤكد أن الخوف المرضي من المدرسة يشيره قلق الانفصال الحاد كنتيجة لخوف الطفل اللاشعوري على حياة أمه الذي يراه معروضاً إياه للخطر ومن ثم تكون حياته هو أيضاً في خطر وأن هذا القلق يمكن أن تنتقل عدواه من الوالدين إلى الطفل الذي يؤدي بدوره إلى ردود فعل وهابية لدى الطفل.

ويذكر دايفيد شيهان (chehan.v.daved 1988) حالة طفلة تعاني الخوف المرضي من المدرسة. كانت "زو" (Zo) في المدرسة تصاب كثيراً بالإغماء، وكانت غالباً ما تشكو من تقلصات في بطئها تمنعها منذهابه إلى المدرسة. كان الأمر يبين وكأنها دائماً في زيارة للطبيب. وقد تعرضت كثيرة للتوصير بأشعة إكس أثناء فحوصها العديدة الطبية، حتى بدا أبوها يخشيان من أن تراكم هذه الآثار فيما بعد في حياتها، ولكن نتائج الفحوص الطبية أظهرت أنه لم يكن هناك شيء غير طبيعي لدى زو، واقتصر الأطباء على أبويها أن زو مجرد طفلة عصبية ولعل هناك مشكلات في المدرسة أو في البيت..

النظريات المفسرة لخوف المرضي من المدرسة

وعندما سأله الأبوين زو إن كانت تستطيع أن تشرح ما بها من أذى، كانت تشرح ببساطة نوباتها وهذا العرض أو ذاك، وحين كانا يصران على استئنافهما الصارمة كانت تختلق لهما أشياء حدثت لها لقد كانت زوجة في حمایتها والأمان في ظلهما ولاج مكانهما مبادلة عادلة، وكانت تخشى في كل ليلة أن تموت في نومها ولذلك كان عليها أن تسوى حساب كل شيء مع ربه، فقد كانت تشعر أن الله وحده هو الذي يستطيع فهم الأمور.

(17,92)

وذكر "تيرمان" (1968) حالة طفل عمره ثلاثة عشر عاما يعاني من الخوف المرضي من المدرسة وقد عبر عن خوفه بالقول: إنه يخاف أن يتوقف قلبه عن الدق ويموت وهو في طريقه إلى المدرسة... فقد قرأ في الصحف حكما يقول بأن الناس يسقطون ميتين في الشارع، وكان يخاف أن يحدث هذا له.

(28,11)

ويرى بعضهم وبخصوصاً "جافريس" Javeris في هذا أن الطفل يستبدل مشاعر الغضب الناجمة عن الصراع التكافلي بين الأم والطفل، ويوجهها نحو المدرسة، و كنتيجة لمشاعر الغضب الشديد التي تصيب الطفل فإنها تظهر بشكل نوبات متضمنة ردود فعل حشوية، والتي تعد شيئاً مفروضاً له، ومن ثم يبدأ مخاوفه من المدرسة ورغبتة في العودة إلى المدرسة.

(4,41)

النموذج الرابع:

"خاف الأم ونادراً الأب من شيء مرعب قد يحدث للطفل ولذا تبقيه في المنزل، وفي حالات عديدة تتفاقم مخاوف الأم أكثر لو كان الطفل مريضاً مرضاناً شديداً أو بدرجة خطيفة".

MOHAMMED KHATAB

ويمكن تفسير ذلك بناءً على نظرية (تحقيق الرغبة) Wish Fulfilment إن ما تخافه الأم هو أن رغباتها العدوانية اللاشعورية ضد طفلها قد تتحقق، وأن الأم تكون مهوممة بطريقة غير مادية من خطر يصيب طفلها لأنها تتذكر مأساة ما وقعت في الماضي.

وقد وصف "إينبرج" أمًا كان قلقه على أمن ابنه متعلقاً جداً باليوت المفاجئ أخيه في سن السابعة عشر عاماً والذي شعر بأنه كان مسؤولاً عنه.

ويبدو من خلال العرض الذي قدمه جون بولبي (1973) للتفاعل الأسري المسؤول عن خوف الطفل من النهايات إلى المدرسة أو رفضه الذهاب إليها، أن العلاقة القائمة بين الطفل وبالتاليه وإدراك الطفل لهذه العلاقة وما يشوبها من صراعات تدور حول العدوان والتوكوس والاعتمادية، والتخييل غير الحقيقي للذات لدى الطفل تلعب دوراً هاماً في ظهور الخوف المرضي من المدرسة، وقد أشار فرويد منذ زمن لهذا الأمر عندما قال: إن قلق الأطفال ليس أكثر من تعبير عن مشاعر فقدان شخص محبوب.

ثالثاً: النظريّة السلوكيّة:

اما التأثير الثالث فقد جاء من اقطاب النظرية السلوكية الذين ينظرون الى الخوف المرضي (الفوبيا) على أنه خوف غير متناسب مع التهديد الأصلي الواقعي الذي يمثله موضوع الخوف، ويتناها نتيجة للاستجابات الشرطية في الموقف المثير للقلق عند تكرار هذا الموقف أو عند حدوثه بشكل شديد مرة واحدة، كما يتم تعميم استجابات الخوف إلى المثيرات المشابهة للمثير الأصلي.

وتعرف المدرسة السلوكية التقليدية الخوف المرضي بأنه (رعب مرضي من موضوع غير متناسب مع التهديد الفعلي الذي يمثله هذا الموضوع، وهو يرون - أي السلوكيون التقليديون - والسون واتباعه - أن الخوف المرضي عبارة عن خوف مزاج ينشأ بطريقة مختلفة عن المخاوف التشريعية. ففي حالة المخاوف التشريعية

النظريات المعاصرة للخوف/المرضى من المدرسة

يكون الخوف ناجماً عن خبرة سينية مباشرة مع الموضوع المخيف، بينما في حالة المخاوف المرضية يكون الخوف مزاحماً من الموضوع الأصلي إلى موضوع بديل، وكان يكون إزاحة الخوف من الابتعاد عن الأم إلى موضوع خارجي مثل المدرسة، حيث يفتعل الطفل هذا الخوف ويستثمره للبقاء بجانب الأم.

(39,17)

ويرى "واطسون" watson أنه تم إيجاد الخوف المرضي تجربياً عن طريق التعلم القائم على الأفعال الشرطية، حيث أطعم تأكيداً على المكانة التي يحتلها كل من الخوف والقلق في تكوين الخوف المرضي، وذلك من خلال إجراء التجربة المشهورة على الطفل "أيلبرت" Aalbert ابن الأحد عشر شهراً، حيث قدم له قارآن وصاحب تقديم الفار صوتاً مزعجاً، واستمر إحداث هذا الصوت في كل مرة يقترب أيلبرت من الفار، وبعد مدة قصيرة لاحظ واطسون ومساعده أن الطفل أصبح يصرخ بمجرد رؤيته للقارآن ويزحف محاولاً الهرب.

وهكذا أوضح واطسون أن اقتراب الصوت المزعج (المثير غير الشرطي) يظهور الفار (المثير الشرطي) أدى إلى خوف الطفل من الفار، وبعد التجربة استنتج واطسون أن الخوف العصبي (المرضى) عند الطفل أيلبرت ينطوي على التهديد الشديد وعلى التعميم بدليل أن أيلبرت أصبح يخاف من كل الأشياء التي تشبه الفار.

(574,70)

ويرى "جوزيف وليه" Wolbe أن مفهوم القلق مرادف لمفهوم الخوف، ولا يوجد أي اختلاف فيزيولوجي بين الخوف الذي يطلقه مثير يرتبط بتهديد موضوعي والخوف غير التوافقي الذي تطلقه مثلاً قطة صغيرة، كذلك يرادف بين الخوف بالمعنى التشريطي والفوبيا متجلهاً بذلك الفرق بين القلق والخوف من تاحية وبين الخوف والفوبيا من ذاتية أخرى.

(58,16)

ويرى "دولارد وميلر" Dolard and Miller أن الخوف القوي هو حافظ متعلم يستثير صراعاً يرتبط باستجابات الهدف نحو حواجز قوية أخرى، كالجنس أو العدوان على سبيل المثال، وحين يبدأ الشخص العصبي من الاقتراب من الهدف الذي قد يؤدي إلى خفض تلوك الحواجز، فإن خوفاً قوياً يشتار لديه، هذا الخوف يستثار بواسطة أفكار تتعلق بأهداف الحافظ، كذلك بواسطة آية محاولات إقليمية ظاهرة.

كذلك ميز "دولارد" و"ميلر" بين التفوبية والمخاوف التشريحية؛ فالتفوبيات خوف مزاح ينشأ بطريقة مختلفة تماماً عن المخاوف التشريحية بشكل مباشر، أما الخوف فيمكن فهمه كاستجابة نفورية تشريحية.

بينما يركز السلوكيون الجدد على التشريح الكلاسيكي في نشأة للأعراض العصبية، ومن بينها المخاوف المرضية حيث يستخلص إيزننك Eyzennk أن الاستجابات العصبية تنشأ على ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى:

تنطوي على استجابات انتفعالية فطرية، إما لحدث أليم وإما لسلسلة من الأحداث الصدمية البسيطة.

المرحلة الثانية:

يتم تشريح الاستجابات الذاتية لموضوعات كانت من قبل غير مثيرة للخوف، فتتصبح نتيجة للتشريح مثيرة للخوف.

المرحلة الثالثة:

انضفاءً لهذا الخوف التشريحي يتحول دون تجنب الموقف المرهوبية ومثال على ذلك ذكر عزيز هنا داود (1991) حالة طفل يخاف بشدة من الكلاب فعندما

النظريات المفسرة للخوف، المرضي من المدرسة

كان يوجد كلب بالقرب منه، تظهر عليه ملامات الخوف الشديد، و كان الطفل يجري ليختفي تحت أحد المقاعد. و سرعان ما اكتشف المعالج النفسي أن الصبي قد تعرض بصورة سيئة للعرض والخريشة، من كلب كبير وأن خوفه من الكلاب - كان من الواضح - نتج من تشريحه مباشر بفعل هذه الخبرة، وبهذه المعلومات أصبح المعالج قادرًا على استبعاد الخوف من الكلاب عن طريق عملية التشريح المضادة، حيث كان يعطي للصبي خبرات سارة من قبل أكل قطعة من الحلوى. بينما ينظر الطفل إلى الكلب على مسافة بعيدة، وعندما أصبحت الخبرات السارة مرتبطة برؤيا الكلب، وضع الكلب على مسافة أقرب، وغدا اتصال الصبي به أكبر.

(33 – 32,34)

كما يرى إيزنر أيضًا أن المخاوف المرضية عادات متعلمة؛ فالذى يخاف بشكل قوى من أشياء معينة كالاماكن المفتوحة مثلاً فهو يعرف بأنه يعاني من الفobia رغم إدراكه أن سلوكه هذا شاذ لا مبرر له، ومع ذلك فهو ماجزتاماً في التغلب على مخاوفه بغض النظر عن الدرجة التي يمكن أن تعوقه هذه المخاوف على ممارسة حياة سوية.

(94,7)

وبناء على ذلك، فإن أصحاب المدرسة السلوكية يرون أن الخوف المرضي من المدرسة قد يتعلمها الطفل من خلال عملية التقليد، أو عن طريق الفائدة والأهمية التي تعود عليه كنتيجة لهذه الاستجابات. فاستجابة التتجنب والابتعاد عن مصادر الخطر يصاحبها المكافأة والإشاع، لذلك يتعلمها الطفل الذي يرغب في أن يبقى ملتصقاً مع أمه يختلف أسبابه للاعتماد عن الذهاب إلى المدرسة، وإذا وافقته أمه يشعر بالكافأة بالبقاء إلى جانبها، وعلى ذلك يتتجنب الطفل الذهاب إلى المدرسة لأن عدم الذهاب يؤدي إلى حصوله على المكافأة، أو على نتائج فرضية بالنسبة له.

(148,33)

والطفل وفقاً لهذا التفسير (نظريه المكاسب الثانوية) يتلقى مكاسب ثانوية بفضل التعزيز من جانب الوالدين أو إحداهما والسامح له في مثل هذا الجو بمعززات أخرى مثل الحصول على بعض قطع الحلوى، أو اللعب في جهاز الكمبيوتر، كما أن أصحاب هذه النظرية يعطون أهمية كبيرة للمدرسة والمعلمين والأقران، وكافة الأنشطة الأخرى الموجودة في البيئة المدرسية من حيث إسهامها في ظهور الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل، ويفسرون ذلك بأن الواقع المدرسي ترتبط شرطياً على المستوى اللغطي تعبيراً عن فقدان الوالدين سواء بالموت أم بالطلاق أم ترك المنزل. ومن خلال هذا التشريع تصبح الأنشطة ذات العلاقة بالمدرسة مثيرات مخيفة تبعث على السلوك الهنروبي لدى الطفل، فالطفل يتجنب القلق المرتبط بهذه المثيرات الباعثة على القلق عن طريق بقائه في المنزل، وانخفاض مستوى القلق يقوي لديه السلوك الاحجمي ويعززه. وينظر بعضهم من أصحاب هذه المدرسة إلى الخوف المرضي من المدرسة باعتباره استجابة لا تكيفية متعلمة ارتبطت ارتباطاً شرطياً Learned Maladaptive Response فقدان الأم.

وأشار ياتس (1970) إلى أن الخوف المرضي من المدرسة ينجم عن:

1. قلق الانفصال وخاصة عن الأم.
2. تعابيرات الاهتمام الزائد من الأم أو من القائم برعاية الطفل.
3. ردود الأفعال المتعلقة بمخاوف الطفل.
4. عدم قدرة الطفل في الحصول على الإثباتات الاجتماعية في المدرسة، كتكوين صداقات حميمة مع الأقران على سبيل المثال.

(225، 107)

كما أن طفل ما قبل المدرسة بحسب رأيه يكون معتمداً على أمه التي عملت كمثير قوي في هذه المخاوف. فالخوف من المدرسة لدى أطفال ما قبل المدرسة ينتج كلقاً واحتتجاجات عندما كانت الأم بعيدة عن الطفل والطفل بدوره يتعلم بأن

النظريات المعاصرة لخوف المرضي من المدرسة

خبرات الانفصال تكون مهزة من قبل الألم كطريقة لبقاء الطفل في المنزل - الذي من المحتمل أن تقود إلى المحافظة على ذاته ضد القلق، وتطور خوف الطفل من المدرسة يعتمد على:

1. قوة قلق الانفصال والاعتماد الناتج عن البيت
2. طبيعة الخبرات المدرسية، وحجم المكافأة والعقوبة التي تقدمها للطفل.

(29, 62)

ويهدد الوالدان طفلهما في بعض الأحيان بالافتراء عنه، وهذا قد يؤدي بالفعل إلى أن يسلك سلوكاً يرضيهم فهو يعمل على تجنب ما قد يسبب له هذا الانفصال من المتاعب وأن هذه التهديدات قد تسبب في نفس الوقت شعوراً بالقلق ناجم عن اعتقاده بأن والديه سيختفيان عنه يوماً من الأيام، وقد ذكرت "هيلين روس" (1961) بنتاً في السادسة من عمرها تصادف أن مرضت أمها في نفسه الذي تركت فيه مريبتها خدمة المنزل، فأصبحت تعاني من انفصالت مزدوج، تنح عنه أن أصبحت الطفلة بحالة قلق استمرت معها وقتاً طويلاً، وفي الثانية عشرة من عمرها رفضت الذهاب إلى المدرسة إلا بعد أن كتبت لها المكان الذي سوف تكون فيه في كل ساعة من ساعات بقاء الطفلة في المدرسة، وقد كانت الطفلة تهرب من حين لاخر لتأكد أن أمها ما زالت تنتظرها.

(30, 53)

وعبر عن ذلك "جارفي وهيجرينز" (1966) عندما لاحظ أن الطفل يقتربن خوفه شرطياً على المستوى اللغطي عندما يعبر عنه بقوله: "إذني أهتقد أمري" وذلك لأن تعبير فقدان الأم يأتي نتيجة لتعليقات الألم المستمرة عن مغادرة أو ترك المنزل بمعنى أن الألم تردد على مسامع طفلها "سوف تأتي في يوم من الأيام من المدرسة ولن تجدني في المنزل".

(15, 76)

يبينما يرى اتجاه آخر من اتجاهات المدرسة السلوكيّة في تفسيره للخوف المرضي من المدرسة إن مرد هذا السلوك لدى الطفل ناتج عن انتقال الطفل من صف لأخر ومن مدرسة لأخرى، وذلك عندما ينتقل الطفل من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية ومن الإعدادية إلى الثانوية، ومثل هذا الانتقال قد يجد فيه الطفل صعوبة في التوافق الاجتماعي وال النفسي مع البيئة الجديدة مع ما تضمنه من متغيرات مادية أو بشرية كالتوافق مع المدرسين الجدد ومع الزملاء الجدد أو مع المدير الجديد، ومع المطالب الجديدة التي يفرضها نظام هذه المدرسة. وعندما يفشل الطفل في الوصول إلى التكيف أو التوافق الناجح مع هذه البيئة فإنه يلجمأ إلى الانسحاب منها والبقاء في المدرسة وذلك كوسيلة مقاومة لتخفيض حدة القلق الذي يعاني منه. و شيئاً فشيئاً يرفض الطفل الذهاب إلى المدرسة بصورة جزئية أو كلية لأنّه لا يستطيع أن يتواافق مع الظروف المدرسية المختلفة التي تشكلها هذه البيئة الجديدة. هذا وقد أظهرت دراسة "هيرسوف ودافييسون" (196). Hershov and Davidson في دراستين منفصلتين، إن اعراض الخوف المرضي من المدرسة قد تظهر مباشرة بعد انتقال الطفل إلى مدرسة جديدة، وذلك لأن المدرسة تشكّل بيئه معقدة تتطلب من الطفل القيام بتكيف مناسب، وإذا فشل فإنه سوف يعاني من القلق والخوف، ومن ثم الانسحاب من المدرسة.

ويذكر "كلاين" (1966) إن صعوبات التعلم والاتجاهات السلبية نحو المدرسين ليست عوامل هامة في خوف الطفل منها وإنما الانطباعات التي شكلها وكونها الطفل عن المدرسة والمدرسين.

(31.1.3)

ويمكن أن نلاحظ من خلال المرض السابق لنظرية التعلم في تفسيرها للمخاوف العامة التي يعاني منها الطفل بشكل عام والمخاوف المدرسية على وجه الخصوص أن هؤلاء الأطفال يرفضون الذهاب إلى المدرسة نتيجة لـ:

النظريات المفسرة للاخوف المرافق من المدرسة

1. تعزيزات سلبية يتلقونها في المدرسة.
2. تجنب المواقف القلقة التي يتعرض لها الطفل في البيئة المدرسية.
3. تعزيزات إيجابية تحدث للطفل خارج أسوار المدرسة وخاصة من قبل الوالدين في المنزل.
4. انتقال الطفل من مدرسة لأخرى نتيجة لظروف خاصة تمر بها الأسرة، والتي يجد فيها الطفل صعوبة كبيرة في التوافق مع المدرسة الجديدة وما تتضمنه من مطالب وعلاقات اجتماعية.

رابعاً، نظرية المرحلتين: الخوف والتجنب Fear and Avoidance

قدمت هذه النظرية من قبل "ماورر" (Mowrer) في عام (1939) حيث اقترح بأن الخوف يستطيع إثارة السلوك وهو ليس فقط رد فعل شرطي لمثيرات مرتبطة بالألم، ولقد ناقش ماورر إلى أبعد من ذلك وقال بأن التخفيف من الخوف يصبح مكافأة إجرائية يتجنب مثير مؤذ وقد أكدت الصياغات اللاحقة لهذه الأفكار بشكل خاص على الصفات المنشورة للخوف.

وقد شكك "سليجمان وجوتون" (1973) في هذه النظرية من خلال نتائج ثلاثة أبحاث لا تتفق مع نظرية المرحلتين، حيث وجدوا أن:

1. استجابات التجنب هي مقاومة للزوال والانطفاء.
2. سلوك التجنب غالباً ما يستمر طويلاً بعد تبديد وتلاشي الخوف.
3. من الصعب تحديد المثيرات الشرطية المناسبة.

كما أكد سليجمان وزميله بأنه إذا تم تعزيز سلوك التجنب، وذلك بالتحفيض من الخوف فإنه يبدو منطقياً توقيع الزوال التدريجي للخوف بمرور الوقت، ويتبع ذلك إضعاف للسلوك التجنبي وهذا لا يحدث دائماً. كما دعم "جريي" (Gray) هذا القول، إن هناك دلائل تجريبية تظهر استمرارية سلوك التجنب بغياب الخوف.

خامساً: نظرية الذات:

إن فكرة الطفل عن ذاته هي النواة الرئيسية التي تقوم عليها شخصيته، كما أنها أساسية في توافقه النفسي والشخصي والاجتماعي؛ فالذات تتكون من مجموعة إدراكات الفرد لنفسه وتقييمه لها، وتحتمل الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن نفسه بأنها ذات ثلاثة أبعاد:

- * أولها: يختص بالفكرة التي يأخذها الفرد عن نفسه وقدراته وأمكاناته.
- * والثاني: يتعلق بفكرة الفرد عن نفسه في علاقته بغيره، فقد ينظر إلى نفسه كشخص مرغوب به أو أنه منبود من الآخرين، حيث تؤثر الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الشخص تأثيراً بالغاً، وذلك لأن صورة كل فرد من ذاته تتكون من خلال نظرية الآخرين إليه.
- * أما الثالث، فهو نظرة الفرد إلى ذاته مكما يجب أن تكون فالطريقة التي ينظر بها الفرد لنفسه تجعله إنساناً متقبلاً لذاته وواثقاً من نفسه، وبينما الطفل يكتون الافتراضات حول نفسه والعالم المحيط به في سن مبكرة واضعاً بذلك نواة مفهومه عن ذاته، وتأخذ تشكيل الافتراضات أشكالاً ثلاثة:
 1. الواقعية: أي نظرة الفرد للأشياء وأي نوع من الأشخاص هو، ونظرته عن العالم من حوله.
 2. القييم: أي تصور المرء وكيف يجب أن تكون الأشياء، هل هي خيرة أو شريرة، مرغوبة أو منبودة.
 3. الإمكانية: أي توقع الفرد لكونية الأشياء وإمكانية تغيرها وللحظروف المواتفة لنمو الفرد والتقدم الاجتماعي.

وتمتد تشكيل الافتراضات الفرد بإطار مرجعى للتفكير والسلوك، يشكل الترشيد الضروري لقيادة سلوكه وتوجيهه الوجهة الصحيحة والإحساس بهويته.

النظريات المعاصرة لخوف المرضى من المدرسة

وتقتضي هذه النظرية بأية أنشطة يقوم بها الطفل داخل المدرسة، مثل علاقته بالعلمين وزملاء فصله، حين يناقشون صلتها به تهديد صورة الذات لدى الطفل، ذلك لأن صورة الطفل عن ذاته تكون متضخمّة، وغير واقعية وتكون حاجته إلى التضيق والتميّز عالية، لذلك فإنه عندما يواجه مشكلات تتحدى مستوى أدائه المدرسي وتجاهله يصبح الطفل متربقاً للشن، أي قلقاً. ويتحدد مقدار قلقه في ضوء حجم جهوده المبذولة للاحتفاظ بصورته عن ذاته بلا اضطراب أو تشويش.

ومعنى ذلك، أن الملامح الرئيسية لهذه المشكلة (الخوف من المدرسة) من وجهة نظر مفهوم الذات، تظهر لدى الأطفال الذين لديهم قيمة عالية لذواتهم وإنجازاتهم. لذلك فهم يحاولون أن يتخلصوا بخيالاتهم الذاتية غير الواقعية، عندما يكونون في موقف تهديدي في المدرسة، ونتيجة لذلك فيإنهم يعانون من القلق والانسحاب إلى موقف آخر، لكي يستطيعوا أن يحافظوا على تخيلاتهم الذاتية النرجسية، ومن الممكن أن يكون هذا الانسحاب مقنولاً لهم كي يتوجهوا إلى البيت Leventhal and Sills (1964) وباقون بجانب الأم، وأشار كل من ليفنثال وسيلز إلى أن الكثير من المثيرات المرتبطة بالخوف، المرضي من المدرسة لم يتم التأكيد إلى أن التي على عقلك كثيرة من أصحاب التحليل النفسي الأهمية فيه خوف الطفل من المدرسة لقلق الانفصال، وتساءلوا لماذا تكون هذه المشكلة في الغالب غير متكررة في السنوات الأولى من حياة الطفل؟ ولماذا لا يكون قلق الانفصال واضحًا في الحالات الأخرى من عمر الطفل قبل ذهابه إلى المدرسة؟ وشدد هؤلاء العلماء على أن الكثير من هؤلاء الأطفال يحافظون على حياة سوية خارج أوقات الدوام في المدرسة وافتراض ليفنثال وسيل أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها هؤلاء الأطفال هي أنهم يعطون قيمة مرتفعة لأنفسهم وتحصيلهم الدراسي وعندما يهدى هذا التقدير المبالغ فيه للذات في البيئة المدرسية، فهؤلاء الأطفال يصابون بالقلق، وبهذا يبدأ الطفل بكاراهية المدرسة والخوف منها والإصرار على عدم الذهاب إليها بكونها تعد من وجهة نظره مصدر تهديد لذاته ..

وأشار "لورنيس Lawrence إلى أن الخوف المرضي من المدرسة يعد نتيجة لفهم مضطرب للذات، و كنتيجة لتقويم ذاتي في المنزل.

هذا فيما يتعلق بأدبيات البحث النظرية التي تناولت تفسير خوف الأطفال من المدرسة، لكن إذا انتقلنا إلى الدراسات التجريبية المتعلقة بهذه المسألة، فقد جاءت النتائج متفقة مع التوجه النظري حيناً ومتناقضه معه أحياناً أخرى. فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات أن هناك علاقة طردية بين مفهوم الذات والخوف، فالأطفال الأكثر خوفاً أظهروا اضطراباً في مفهوم الذات الواقعي والمثالي، وتقبل الذات، وتقبل الآخرين.

(72 – 62,56)

بينما هدفت دراسات أخرى إلى دراسة العلاقة بين الخوف المرضي من المدرسة وتقييم الذات لديهم مثل دراسة "نيكولس وبيرج" (1970) Nichols and Perg والتي خلصت إلى أنه لا توجد فروق دالة في تقييم الذات بين الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والمجموعة الضابطة.

واظهرت دراسة العاسمي (1995) عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والأطفال العاديين في مفهوم الطفل عن نفسه. وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي توصل إليها "نيكولس وبيرج" وتخالف نتائج دراسة ليفتال وسيizer (1964) ودراسة لورينس (1987)، ودراسة يوسف عبد الفتاح (1993). وربما تتفق هذه النتيجة مع المقولات التي ترى أن الملامح الرئيسية للخوف المرضي من المدرسة تكمن لدى الأطفال الذين لديهم قيمة ذاتية بأنفسهم وبأداجياتهم - الذين يحاولون أن يتخلصوا بخيالاتهم الذاتية - غير الواقعية عندما تواجههم مشكلات تتحدى مستوى أدائهم المدرسي ونجاحهم فيه.

النظريات المفسرة للخوف/المرضى من المدرسة

ومن هنا نرى أن نظرية الذات أرجعت السبب الحقيقي الكامن وراء ظاهرة خوف الطفل من المدرسة إلى المبالغة الزائدة في تقدير قدراته وإمكاناته، وليس الخوف من المدرسة بكل ما تتضمنه من مواقف مختلفة.





MOHAMED KHATAB





MOHAMED KHATAB

الفصل السادس
الخوف المدرسي
والتشخيص والتنبؤ

أولاً: التشخيص:

يقصد بالتشخيص في لغة العلاج النفسي "تقدير خصائص العميل وقدراته وإنجازاته وسماته التي تساعد في فهم مشكلاته"، وإن التشخيص يتطلب تحليل المعطيات التي حصل عليها المعالج النفسي، وتنظيمها بشكل متكامل يعتمد أساساً في رسم خطة المعالجة. وتشمل مصادر المعلومات التي يستند إليها الأخصائي النفسي في عملية التشخيص على المقابلات - الفحوص الطبية والاجتماعية، السجلات التعليمية - الاختبارات السيكومترية والاسقاطية، ويتطلب التشخيص أيضاً، عمليات أساسية تشمل على الملاحظة، والوصف الدقيق لتحديد الأسباب - التصنيف والتحليل الدينامي بقصد التوصل إلى افتراض دقيق عن طبيعة وأساس المشكلة.

(47-42)

و غالباً ما يسمى التشخيص الذي يعتمد شكلاً من أشكال التصنيف "بالتشخيص التصنيفي" بسبب إعادة اضطراب المفحوص إلى نوع ما من الاضطرابات النفسية، مما يشتمل التصنيف المعتمد، و غالباً ما يسمى التشخيص الذي يعتمد تقريراً عاماً للأعراض والعلاقات بالتشخيص الدينامي، حيث ينطلق التشخيص من وصف واضح للأعراض والعلاقات والعوامل، وينطلق من وصف مفصل للعمليات النفسية المتمثلة بالصراعات القائمة حالياً ومن تحديد لاحتمالات تطورها في المستقبل.

(128,51)

ويفي العادة يشخص الخوف المرضي من المدرسة بشكل خاطئ، فقد يبدو على أنه صعوبات دراسية يعاني منها الطفل في المدرسة، كفشل دراسي، ضعف في القراءة والحساب، وما إلى ذلك من التشخيصات المختلفة التي يقدمها بعض الدارسين لهذه المشكلة، متناسين بذلك العوامل النفسية والاجتماعية والأسرية الكامنة وراء هذا السلوك كوجود مريض في المنزل أو مولود آخر صغير، أو مدرس صارم في المدرسة، أو خلافات على ما قابلوه من الأطفال في العيادة النفسية أو المستشفى يميّلون في العادة إلى تشخيص الأضطرابات الانفعالية على أنها أمراض عضوية معتبرينها واحدة للأطفال جميعاً دون النظر إلى الفروق الفردية في الشخصية أو الظروف الاجتماعية. وتذلك في أن بعض المرشدين يعدون الخوف المرضي من المدرسة اضطراباً معروفاً، وله أسباب وطرق علاج معروفة. وعلى كل الأحوال فإن معظم الأطفال الذين يرفضون الذهاب إلى المدرسة، لا يذهبون إلى عيادات الطب النفسي وعيادات العلاج والإرشاد النفسي المتخصصة، ولكن يشرف عليهم في الغالب الطبيب النفسي طبيب الأسرة وهؤلاء نادراً ما يكتبون عن طرائقهم في العلاج.

وفي العيادات النفسية يقوم العالج بفحص حالة الطفل ومشكلاته بناء على خبرته الشخصية وعلى ما هو شائع من المشكلات لدى أطفال منطقته أو مدینته، ثم يعطيه العلاج المناسب بناء على هذا التشخيص غير الدقيق. فإذا كان الطفل لا يريد أن يذهب إلى المدرسة أو يخاف أن يترك المنزل، فالتفسير الواضح لذلك هو أنه إما في المدرسة شيئاً لا يحبه، وإما أنه يريد أن يفعل شيئاً آخر وقبل أن نفترض وجود مرض عضوي لا بد أن ندرس جميع الاحتمالات الممكنة وهذا يتطلب مننا فحصاً دقيقاً للطفل وبنته وخصوصاً المنزلي والمدرسية ويرى "شيمي" Chyme (1966) أن صعوبات التعلم والاتجاهات السلبية نحو المدرسين ليست عوامل هامة للخوف من المدرسة لدى الطفل، لذلك فالمرشد قليلاً ما كان يستفسر عن الصعوبات التي يواجهها الطفل في المدرسة، وقليلًا ما كان يتحرى صدق ما يقوله الطفل.

ومن جهة أخرى يفضل بعض المعالجين أن يعرفوا ما إذا كانوا يتعاملون مع موقف حقيقي أم مجرد خيالات يعبر الطفل عنها، وحتى عندما يحاولون

الكشف عن اتجاه الطفل نحو المدرسة بسؤال المدرسین، فهناك مشكلات من الصعب اكتشافها، لأنها ليست هي المهمة في هذه الحالة من وجهة النظر الموضوعية (رأي المدرسة)، وإنما وجهة النظر الشخصية المتمثلة في رأي التلميذ ومشاعره، وبمعنى آخر ليست المدرسة كما يراها الكبار، وإنما كما يراها الطفل الصغير، وتشير نتائج استبيان "كوبير" Copper إلى دور المدرسة المحدود في توثيد الخوف لدى الطفل رغم وجود توترات وضغوط كثيرة في الحياة المدرسية، فالمدرسة هي أول البيئات الهامة خارج محیط العائلة التي ينفصل فيها الطفل عن الأسرة بشكل متكرر، وهي تجبر الطفل على أن يكيف نفسه مع أطفال غرباء وأشخاص بالغين غير مألوفين له، ويتعامل مع أم بديلة، كما يجد نفسه مضطراً على تأدبة واجبات يراها صعبة، وعندما يكبر يتنافس مع الأولاد والبنات الآخرين، ويرىون نقاط ضعفه وجهله، وربما تكون هناك أسباب أخرى متربعة لدى الطفل كان يضطر إلى عبور منطقة فيها كلب مفترس وهو في طريقه إلى المدرسة أو يتغير مدرس الصف، ويأتي مدرس آخر لا يتوافق أو ينسجم معه الطفل، ومن الأسباب أيضاً الانتقال إلى مدرسة جديدة لها نظام أكثر صرامة، أو شعور الطفل بأنه من طبقة اجتماعية أقل من أقرانه، مثل هذه المخاوف من الصعب جداً اكتشافها، لأن المدرس قد لا يتصور أنه ربما يكون شخصياً مخيفاً لبعض تلاميذه، وفي بعض الحالات - مثل الحالة الآتية - قد يعرف الوالدان والطفل سبب الخوف لكنهم لا يقولونه لأنهم يعدونه سراً، فالطفل "إيرك" كان في الثالثة من عمره وكان تلميذاً مجتهداً ومحلاً في المدرسة، وكان محباً بين أساقفته وزملائه، وكان عضواً في نادي الشباب، وفجأة رفض الذهاب إلى المدرسة قاتلاً، إنه يخاف أن يتوقف قليلاً عن النبض وهو في طريقه إلى المدرسة، وكان يرفض أيضاً الذهاب إلى مركز الإرشاد النفسي، وقد يادر المعالج للاتصال به في منزله، وذهب لزيارة فوجده يلعب مسروقاً بقطاره الكهربائي، ويشاهد التلفزيون وكان ينظر وينصرف بشكل طبيعي جداً، واعتذر المعالج أنه ربما كان يتعرض أمام والديه عند الذهاب إلى المدرسة، حيث أخذته بسيارته مقابلة مدير المدرسة وعندما اقتربا (العنزل، المعالج) من المدرسة، شارت ثائرة الطفل، ولو لا أن بباب السيارة كان مغلقاً لقفز منه، رغم أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، وكان من الواضح أنه

كان في مأذق وتمني لو استطاع الرجوع إلى المنزل، ولكن عندما تغير اتجاه السيارة لاحظ المعالج أن ملامح الطفل بدت تظهر عليها بوادر السرور والفرح.

ومن الأسباب الداعية إلى رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة، فقد صرخ الطفل للمعالج بأنه قرأ يوماً في الصحف عن أناس يموتون في الشارع، وأنه يخاف أن يحدث له ذلك، وقالت أمه أنه يأكل وينام بشكل طبيعي ولا يهتم بشيء، ولكنه كان دائمًا مشغولاً بأفكار عن الموت، وكان هو الطفل الوحيد الذي بقي في المنزل بعد أن تزوجت أخته الكبيرة، وكان أبواه يحيان بعضهما البعض ويحبانه، وكان يشعر بالسعادة في المنزل، ولم يكن فيه ما يسبب التوتر، ولم يكن له أصدقاء في المدرسة أو في المنزل، ولكن سلوكه هنا ظل خامضًا ولم يتحسن بإعطائه الدواء Sodium Pentothal، وقد قام الطبيب بإعطائه جرعة من Phenobarbitone تمهيداً للقيام بعملية التحليل النفسي الانفعالي (Abreaction) وأثناء عملية التحليل النفسي وصف "إيريك" حادثة مؤلمة حدثت قبل أسبوع من بداية انشغاله بأفكار الموت ومن الواضح أن والده قد اتهمه بسرقة النقود من جيبه، وعندما انكر الطفل ذلك قال والده أنه سوف يعاقبه ليس على السرقة وإنما على الكذب، وأخبر «إيريك» الطبيب النفسي بأنه لم يأخذ النقود، ولكنه اضطر للاعتراف بأنه أخذنها حتى ليضرره والده، وعندما اعترف، وكانت المرة الأولى التي يكتب فيها - عاقبه والده الذي سحب وثيقته وكتب فيها أنه هو وزوجته قد حرما طفلهما أريكة من الحقوق جميعها، وأنهما يتمنيان أن يؤخذ الطفل إلى أقرب مخفر للشرطة يودع في دار الأحداث. وفعلاً أخذنا الطفل ولكن المخفر مكان مغلقاً لأن رجال الشرطة كانوا يتناولون غذاؤهم، وفي هذه اللحظة أخذ الطفل في حالة خوف وبكاء هستيرية إلى السيارة وقال أبوه إنه ما دام قد ندم على ذلك فيمكنه البقاء في المنزل.

هذه الحادثة لم يذكرها الطفل ولو لا الوالدان في المقابلات الأولى، ولم يتم الكشف عنها إلا بطريقة التحليل النفسي، ومن المؤكد أن الوالدين كانا يامكانهما أن يتذكرا هذه الحادثة، ولكن الطفل كتب هذه التجربة المؤلمة. وبعد انتهاء جلسات التحليل النفسي مع الطفل إيريك، عقدت مقابلة أخرى لمناقشة مشكلات

الطفل مع والديه. وفي اليوم التالي اتصلا بالطبيب النفسي المعالج قائلين: إن إيريك قد تخلص من خوفه من الموت، ومن الشهاب إلى المدرسة، ولم يُرِدْ أية مقابلات أخرى، وقد ذكر مدير المدرسة أن إيريك كان يأتي إلى المدرسة بانتظام.

يبينو من هذا أنه على القائم بعملية تشخيص الخوف المرضي من المدرسة أن يأخذ باعتباره العوامل اللاشعورية الكامنة وراء هذا الخوف والتي تعد مسؤولة بشكل مباشر عنه. من هنا يؤكد الدرسون على ضرورة التشخيص الدقيق للخوف من المدرسة تجنباً للخلط بين أعراض هذا الاضطراب وأعراض اضطرابات أخرى قد تكون مشتركة أو مصاحبة لأعراض الخوف من المدرسة، ومن جهة ثانية أشار كل من كاهن ونورستين وكارول (Kahn, Nursten aed Carroll 1981) إلى أن كل حالة من حالات الخوف المرضي من المدرسة تتضمن مجموعة من التصورات المختلفة عن غيرها مثل: الاعتبار الشخصي الداخلي للطفل والعوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية... لذلك فقد اقترحوا أربعة مجالات كأسباب منطقية لخوف الطفل من المدرسة والتي تجعل كل مرشد قادر على وضع تشخيص دقيق والمجالات الأربع هي التالية:

- العمر الزمني وعلاقته بالعوامل التنموية.
- التفاعل الفعال مع الأهل، الأسرة، المجتمع.
- دينامييات البيئة النفسية الداخلية.
- نظرة الطفل نحو أعراضه كافتراض لأنما أو انسحاب الأنما.

ومن جهة أخرى قام العاسمي (1995) بدراسة بعنوان "دراسة إكلينيكية للأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة" حيث هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل النفسية والأسرية والاجتماعية والمدرسية الشعورية التي تسهم في ظهور الخوف المرضي من المدرسة لدى أطفال المرحلة الابتدائية.

* التعرف على البنية النفسية اللاشعورية للأطفال الذين يعانون من هذا الخوف، وقد صاغ الباحث مشكلة الدراسة من خلال الفروض التالية:

1. يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة والأطفال العاديين على مقياس الاكتئاب، التوافق النفسي العام ببعديه الشخصي والاجتماعي، مفهوم الذات، التحصيل الدراسي.
2. بالإضافة إلى هنا تساءل فيما إذا كانت البنية النفسية للأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة تختلف عن البنية النفسية للأطفال العاديين؟ وذلك كما يكشف عنها تحليل استجاباتهم على اختبار تفهم الموضوع (CAT).

وتكونت عينة الدراسة من (90) طفلاً وطفلة تم اختيارهم من بين (881) طفلاً وطفلة من التلاميد الملتحقين بالصفين الثاني والثالث الابتدائي بمدينة القاهرة، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين (7 – 9) سنوات؛ حيث قسموا إلى مجموعتين:

مجموعة الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والبالغ عددهم (45) تلميذًا وتلميذة بواقع (22) تلميذًا و(23) تلميذة، حيث تم اختيارهم من بين الحاصلين على أعلى درجات الأرياعي الأعلى في مقياس الخوف المرضي من المدرسة، ومجموعة الأطفال العاديين والبالغ عددهم (45) تلميذًا وتلميذة بواقع (18) تلميذًا و(27) تلميذة، تم اختيارهم من بين الحاصلين على أدنى درجات الأرياعي الأدنى في مقياس الخوف من المدرسة. كما قام الباحث باختيار أربعةأطفال من بين (45) طفلاً ممن حصلوا على أعلى المدرجات في مقياس الخوف المرضي من المدرسة بواقع طفلين وطفلتين، وكذلك اختيار أربعةأطفال عاديين بهدف المقارنة، وقد تم اختيار العينة (90) على أساس تجانسها في السن، ومستوى الذكاء، ومستوى التعليم، آباء الأطفال على قيد الحياة والطفل يعيش معهم.

أما الأدوات التي استخدمها الباحث مكانت:

- مقياس كولومبيا للنضج العقلي، إعداد علي السيد سليمان.
- مقياس الخوف المرضي من المدرسة إعداد: الباحث، مقياس الاكتئاب للصغرى إعداد غريب عبد الفتاح غريب - اختبار الشخصية للأطفال إعداد: عطية محمود هنا، مقياس مفهوم الذات للأطفال طلعت منصور، حليم بشامي - اختبار تفهم الموضوع للأطفال إعداد بلاك وبلاك، استمارة تاريخ الحالة إعداد الباحث - استمارة المقابلة الإكلينيكية إعداد الباحث، استمارة المعلم إعداد الباحث. وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
 - وجود فروق دالة إحصائياً بين متospفات الأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة والأطفال العاديين على مقياس الاكتئاب لصالح الأطفال الخائفين من المدرسة.
 - وجود فروق دالة إحصائياً في التوافق العام ببعديه الشخصي والاجتماعي بين الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والعاديين، لصالح الأطفال العاديين.
 - عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والأطفال العاديين في مفهوم الطفل عن ذاته.
 - وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل الدراسي بين الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة والأطفال العاديين في التحصيل الدراسي.
 - أما بالنسبة للفرض الخاص بالجانب الإكلينيكي، فقد أظهرت نتائج المقابلات الإكلينيكية دراسة الحالة، واستجابات الأطفال على اختبار تفهم الموضوع للأطفال (CAT) إن البنية النفسية (الдинاميكية) للطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة تقسم إلى:
 - اضطراب صورته نحو ذاته: حيث اتصف هذه الصورة بالسلبية مع تقدير منخفض للذات.

- اضطراب الصورة الوالدية (الأم - الأب) التي بدت قاسية ومحشة يكتنفها الغموض والخوف.
- اضطراب العلاقة بين أفراد الأسرة (الأم، الأب، الأخوة) بعضهم ببعض وبينهم وبين الطفل الخوافي.

كما أظهرت النتائج أن الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة لديه مشاعر من الحزن والكآبة والخوف من العذوان الخارجي، مع وجود ميل عداونية سواء كانت ضمنية أم صريحة تجاه البيئة الأسرية والمحيطية، كما تبين أيضاً افتقار الطفل للاتزان الانفعالي والوجوداني والشخصي، ومعاناته من مجموعة من الصراعات، ناتجة عن إحباطات وضغوط يتعرض لها في البيئتين الأسرية والخارجية تتجلى في الصراع بين الأنماط والأنا الأعلى، وكذلك الصراع بين نزعة الطفل للاستقلال والاعتماد على النفس وبين التبعية والرضوخ للوالدين كما أظهر الطفل أيضاً ضغوطاً وإحباطات حادة ناتجة عن عدم إشباع حاجاته للأمن والانتماء والحرية.

(1995, 20)

بينما أظهرت دراسة نيفين زبور (1990) التي أجرتها على عشرة أطفال يعانون أكثر من نوع من أنواع الفوبيا في الوقت نفسه، فقد يعاني فوبيا الحيوان وفوبيا النهاب إلى المدرسة، وذلك باستخدام تكنيك الرورشاخ الرسم والرسم الحر وال مقابلة المعمقة.

بالنسبة لمكان الاستجابة، كانت نسبة المكان طبيعية أقرب إلى السواء، ولم يلاحظ ارتفاع أي من النسب باستثناء "ك" وهو ارتفاع طفيف إلا أنه كان من الملاحظ انخفاض «ج» بشكل ملحوظ.



بالنسبة لارتفاع "ل" وهو ما يعكس مشاعر العدوان المتفجرة لدى الطفل إزاء موضوعاتهم وهي تتراوح بين مشاعر عدوان متضجرة بشكلها الفج ومشاعر عدوان مرتكزة في أقوال متحكم فيها نسبياً.

كذلك اتسمت صور الموضوعات بالقسوة والوحشية في مقابل صورة الذات التي ترسم بالإذعان والسلبية كنتيجة لمشاعر العدوان الشديدة المتوجهة للموضوع، كذلك اتسمت الأنماط الأولى بالقسوة الشديدة والفجوة في التعامل مع الرغبات والنزوات.

(37.22, 52)

ويشخص الخوف المرضي من المدرسة بشكل عام من خلال الدلائل التالية:

- قلق شديد مرتبط بانفصال الطفل عن ذويه الذين يرتبط بهم وخاصة الأم.
- قلق شديد مرتبط بإصابة أو أذى سوف يقع للأشخاص المتعلق بهم الطفل أو خوفه من أنهم سوف يتربكونه ولا يعودون.
- الرفض المستمر للذهاب إلى المدرسة والبقاء في البيت.
- الغياب من المدرسة دون سبب وجيه خمس مرات على الأقل في الفصل الواحد.
- البقاء في المنزل مع معرفة الوالدين بذلك.
- يعاني الطفل من الشكاوى الجسمية المتنوعة في الساعات الأولى قبل ذهابه إلى المدرسة مثل: الصداع أو آلام المعدة أو الغثيان أو القيء... إلخ.
- علاقات متكررة من الانزعاج والقلق الحاد مثل: رغبة الطفل في العودة إلى المنزل عندما يكون في المدرسة.
- غياب السلوكيات اللااجتماعية مثل: السرقة أو الكذب أو التخريب.
- المعاناة من كوابيس وأحلام مزعجة تتعلق بابتعاد الشخص المرتبط به أو بمواقف مدرسية متنوعة.

وعلى القائم بعملية التشخيص سواء كان مرشدًا أم معالجًا أم طبيباً نفسياً أن يأخذ باعتباره عدداً من النقاط الهامة مثل:

- القدرة على التمييز بين الخوف الطبيعي والخوف المرضي لدى الطفل، لأن الخوف الطبيعي حالة عادلة يمر بها كثير من الأطفال عن بدء التحاقهم بالمدرسة وذلك عندما يتعدون عن الوالدين لأي سبب من الأسباب، أما الخوف المرضي فهو خوف شديد غير منطقي ولا يمكن تبريره لأن المثيرات أو المواقف أو الأشياء أو الأشخاص التي يخاف الطفل منها في الواقع مثيرات لا تسبب الخوف أو الأذى للطفل في أي حال من الأحوال.
- القدرة على التمييز بين القلق الشديد الذي يعاني منه الطفل الخائف من المدرسة والقلق المرتبط بأمور لا تتعلق بالواقف المدرسية.
- أن يتم التفريق بين رفض المدرسة وكل من الهروب من المدرسة والتسلب المدرسي أو غياب الطفل عن المدرسة نوجوه مريض في المنزل (الأب - الأم) يستدعيبقاء الطفل معه
- كما ينبغي على القائم بعملية التشخيص التركيز على نقطة مهمة وهي أن الطفل الرافض نتيجة للفشل الذي يشعر به، أو يكون متعرضاً لعدوان حقيقي خارج المنزل أو في المدرسة: يجعله يتذرع به ويأخذ هذه حجة له لرفضذهاب إلى المدرسة والبقاء في البيت.
- الحصول على فحص طبي شامل، الغرض منه استبعاد آية أمراض عضوية حقيقة، لأن كثيراً من المعالجين يت肯ون أن مشكلة الطفل سيكوسوماتية، فيكتشون فيما بعد أنها الأعراض الأولى لمرض عضوي فعلي.
- وأخيراً فإن التقصي الدقيق في تفاصيل الأماكن التي يبدي الطفل منها الخوف يمكن أن يساعد على تحديد الأهمية النسبية للمخاوف إزاء المدرسة، والمخاوف تجاه الانفصال، ويلزم الإلحاح على أهمية أن كلا العاملين غالباً ما يوجدان في نفس الحالة، وهنا يحتاج الأمر إلى حكم إكلينيكي تاضج لتقدير الموقف، كما أن المقابلات الشخصية الدينامية مع الأطفال الخالقين من

الخوف المدرسي والتشخيص والتبيه

المدرسة يلزم أن يكملها تقييم اجتماعي دقيق للمنزل، وتتضمن دقيق أيضاً للمواقف المدرسية والأشخاص الموجودين فيها والتي من الممكن أن تشكل عوامل خوف حقيقة أو خيالية بالنسبة للطفل.

والشيء الضروري في هذا المجال هو التأويل الحرريص للأدلة الإكلينيكية، لأن قلق الانفصال لا يمكن الاستدلال عليه ببساطة من الحقيقة التي مؤداها "أن الطفل سينذهب إلى المدرسة إذا ذهبت أممه معه".

ومثال ذلك دراسة لاست فرانسيس وآخرون (1987) Last, et al Francis Separation Anxiety، التي هدفت إلى الكشف عن الفروق بين قلق الانفصال (48 طفلاً) وواقع (91 طفلاً) يعانون قلق الانفصال، فقد اختيرت عينة الدراسة (67 طفلاً) وأقيمت المقاييس (48 طفلاً) يعانون قلق الانفصال (91 طفلاً) يعانون من الخوف المرضي من المدرسة. وقد تم تصنيف المجموعتين وفقاً للتشخيص قائمة الأطباء النفسيين في عيادة معهد "ويسترن" بأمريكا حيث طبق على أطفال العينة قائمة المقابلة للأطفال ومقاييس القلق كحالة وسمة للأطفال ومقاييس القلق الظاهر للأطفال، والمحكم التشخيصي لجمعية الطب النفسي الأمريكي الثالث (DSM – III) وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:

- إن غالبية الأطفال الذين يعانون قلق الانفصال كانوا من الإناث، بينما كانت غالبية الذين يشكون من الخوف المرضي من المدرسة من الذكور.
- كذلك مصاحبة اضطرابات أخرى مع كل من قلق الانفصال والخوف المرضي من المدرسة كالقلق الحاد، (46%) للأطفال الذين يشكون من قلق الانفصال و(37%) للأطفال الذين يشكون من الخوف المدرسي.
- وجود فروق دالة في معدلات القلق بين أمهات الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة وأمهات الأطفال الذين يعانون قلق الانفصال لصالح أمهات الذين يعانون من قلق الانفصال.

كما ينبع على المرشد أو المعالج النفسي أن يأخذ باعتباره مجموعة من الضروريات والقضايا العملية والنظرية عند تشخيصه لحالة الطفل الذي يعتقد أنه يعاني الخوف المرضي من المدرسة، وهذه الضروريات والقضايا هي:

1. القيام باتصالات هذه مع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسين والأطباء والمدرسين والآباء للتتأكد من وجود هذه المشكلة وليست الأعراض المصاحبة لها أعراض مرضية حقيقة لا علاقة لها بعزوف الطفل عن المدرسة.
2. التتأكد من أن الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية علاج هذه الحالة هو شخص متخصص.
3. استبعاد المشكلات الطبية (الجسمية) قبل البحث في الأسباب الأخرى لرفض الذهاب إلى المدرسة.
4. تحديد دافعية الطفل لتلقي الإرشاد أو العلاج.
5. السرعة في التدخل من قبل المرشد أو المعالج النفسي.
6. تحديد الوقت المناسب لإجراء المقابلات.
7. مكان عقد المقابلات أو الجلسات ومدة كل جلسة.
8. أسلوب المقابلة والمقياس الخاص بالخوف من المدرسة للتتأكد من أن الطفل يعاني من هذا الخوف وليس من اضطراب آخر، ويمكن للقارئ الرجوع إلى قائمة الملاحق للتعرف على مقياس الخوف المرضي من المدرسة، الذي أصدره المؤلف بهذاخصوص.
9. أسلوب المقابلة المتبع مع الطفل، هل هو أسلوب الإرشاد باللعب أو أسلوب الإرشاد المباشر أو الإرشاد غير المباشر... الخ.
10. كما يسعن المرشد أو المعالج النفسي إلى خفض حدة القلق الذي يعاني منه الطفل بالدرجة الأولى، (سوف تركز على هذه النقاط في الفصل الثامن).



الخوف المدرسي والتشخيص والتبيه

أما محتوى القضايا التي ينبغي التركيز عليها أثناء قيام المرشد النفسي بعملية التشخيص الدقيق لحالة الطفل الذي يعاني من الخوف من المدرسة فهي:

أولاً: فيما يتعلق بالطفل:

1. شكل الحضور بالطفل.
2. التاريخ التطوري للخوف من المدرسة.
3. الأعراض المصاحبة لخوف الطفل من المدرسة، مثل: المريض في عضومن أعضاء جسده أو غثيان أو بكاء..
4. نشاطات الطفل خارج المدرسة.
5. الاتجاه نحو مشكلة رفض المدرسة.
6. قدرات الطفل العقلية والتحصيلية.
7. الصفات الشخصية مثل: الانطوائية أو الحساسية أو العدوانية أو الخجل أو ضعف في تقدير الذات،
8. علاقة الطفل بالأصدقاء (داخل أو خارج المدرسة).

ثانياً: فيما يتعلق بالأسرة:

1. بقاء الأسرة والعلاقات القائمة فيها.
2. مصادر الضغط والقلق داخل الأسرة.
3. الوضع الاجتماعي / الاقتصادي.
4. أساليب التربية المتبعة فيها.
5. صفات الأبوين مثل: التكبير، الحماية الزائدة... .



ثالثاً: فيما يتعلق بالمدرسة:

1. علاقة الطفل بالزملاء والمدرسین.
2. انتقال الطفل من مدرسة إلى أخرى أو من صف إلى آخر.
3. الشعور بالوحدة داخل أسوار المدرسة.
4. مستوى التحصيلي (يمكن الرجوع إلى التفاصيل في فصل قضایا تطبيقیة).

لذلك سوف نتناول هذه القضایا بشيء من التفصیل (القضایا المتعلقة بالطفل والأسرة والمدرسة) والتي هي بحاجة للبحث والدراسة بشكل منظم ومنهجي من خلال ما يلي:

أولاً: الطفل:**(1) شكل الحضور وتاريخه:**

يجب أن يتم التعرّف على طول المدة الزمنية للمشكلة وحدتها، ويجب على المعالج أن يعرف المدة التي قضها الطفل خارج المدرسة (متى بeganها)، وفيما إذا كانت المشكلة قد ظهرت فجأة وبشكل دراماتيكي عند الطفل الذي كان يوازن على الحضور إلى المدرسة بشكل منظم، أو أن المشكلة قد ظهرت بشكل متدرج خلال السنوات إلى أن وصلت في النهاية إلى النزوة برفض الطفل كلياً الذهاب إلى المدرسة. وفي حالة البداية المفاجئة للمشكلة غالباً ما يكون هناك سلسلة من العوامل التي أدت إلى ذلك هذه العوامل يمكن التعرّف عليها، حالما يتم إيضاح هذه العوامل فإن الخطبة العلاجية ستسير بشكل سلس.

أما الحالات التي يحدث فيها الخوف من المدرسة أو رفضها بشكل متدرج فإنها تحتاج إلى بذل جهد أكبر، قد يكون هناك بعض العوامل المثيرة التي أدت أخيراً إلى جعل الطفل يرفض نهائياً الذهاب إلى المدرسة، ولكن فوق كل هذا وذاك يجب ترکيز الانتباه للقضایا الراسخة الأخرى التي قد تكون هي المسؤولة عن هذا

الخوف على سبيل المثال: التاريخ الطويل من الغياب المتكرر للطفل الذي من المحتمل أنه قد يسبب في اضطراب علاقات الطفل مع أقرانه في المدرسة وفهم جزئي للمنهج المدرسي، كذلك يجب على المعالج أن يقيّم موقف الأسرة من حضور الطفل إلى المدرسة، بالإضافة إلى البحث في أشكال الحضور لأطفال آخرين من الأسرة نفسها والذين هم إما في المدرسة حالياً أو قد خادروا المدرسة مؤخراً.

إذا وجد أطفال آخرون في الأسرة حضورهم إلى المدرسة قليل، فإن هذا يمكن أن يعزز سلوك التجنب عند الطفل، وذلك بالنظر إلى هؤلاء الأطفال على أنهم نماذج يقتدي بهم. بالإضافة إلى ذلك فالأطفال الذين يحضورون إلى المدرسة بشكل متقطع غالباً ما ينتمون إلى أسر لاتهم كثيراً بالأمور التعليمية أو أن هذه الأسر لديها دافعية قليلة لإعادة طفلهم إلى الدوام الكامل في المدرسة.

ولا يمكن الاعتماد على المعلومات التي يقدمها الأطفال وأباءهم فيما يتعلق بتاريخ حضورهم إلى المدرسة ونسبة تغيبهم عنها، والمعلمون في بعض الأحيان قد يهملون أو لا يقيّمون بشكل جيد مدى الغياب الذي تغيبه الطفل عن المدرسة. لذلك فمن الضروري للمعالج أن يقوم بنفسه بالتأكد من نسبة حضور الطفل أو دوامه في المدرسة من خلال سجلات المدرسة. إن وجد المعالج أن الطفل ح坎 يداوم بشكل جيد فإن هذا قد يدفع المعالج إلى النظر في العوامل المتعلقة بالمدرسة أو بالمنزل والتي قد تكون سرعت أو حافظت على المشكلة على سبيل المثال: في حالات معينة قد يكون هناك معلم معين هو الذي قد يسبب القلق للطفل فعندهما تحدثين المادة التي يدرسها قد يتغيب الطفل عن هذا اليوم. وأحياناً قد تشجع بعض الأمهات أطفالهن على التغيب عن المدرسة في أيام محدودة وذلك عندما تشعر هذه الأمهات بالعزلة والوحدة، وغالباً ما تكون هؤلاء الأمهات مصابات بالاكتئاب أو أنهن يعيشن في ظروف صعبة.

قد يحصل المعالج النفسي في بعض الأحيان على دلالات إضافية حول العوامل المساعدة للخوف المرضي من المدرسة وحول دافعية العميل للعلاج، وذلك ببحث القضايا المحيطة بالأحداث الأولى التي أوجدت الخوف المرضي من المدرسة. على سبيل المثال: ككيف ينظر الطفل وأبواه إلى الصعوبات السابقة؟ كم المدة التي تغيب فيها الطفل عن المدرسة؟ وكيف تم التغلب على هذه المشكلة؟.

(2) الأعراض المرافقية:

هناك العديد من الأسئلة والأمور التي تحتاج إلى الشرح، وذلك للحصول على وصف دقيق للمشكلات المحيطة بالخوف المرضي من المدرسة، والطريقة التي يتعامل فيها الكبار مع هذه المشكلات. على سبيل المثال:

- ككيف يتخذ شكل رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة؟.
- ما الذي يحدث بالضبط كل صباح عندما يستيقظ الطفل من النوم؟.
- هل توجد مشكلة عند الطفل في النهوض من الفراش وارتداء الملابس أو تناول الطعام؟.
- هل يجهز الطفل كتبه وحاجاته من أجل المدرسة؟.
- إذا تم تشجيع الطفل للمضي قدماً في الذهاب للمدرسة، ما الذي يحصل بعد ذلك؟.
- هل تظهر على الطفل علامات قلق جسدية على سبيل المثال: آلام في المعدة أو صداع أو نفاس أو ارتعاش أو ذعر؟.
- هل يحتاج أو يعترض الطفل على الذهاب إلى المدرسة ويصرخ؟.
- إذا تم الضغط على الطفل للذهاب إلى المدرسة هل يظهر الطفل مزاجاً مشاكساً، وكم الشدة التي يصل إليها مزاجه الغاضب أو مشاكسته وأي شكل يأخذ هذه المشاكسة؟.
- هل يلقي الطفل بالأشياء الموجودة حوله وهل يلكم ويركل هذه الأشياء؟.

- هل هدد الطفل في يوم من الأيام بالانتحار؟ إذا كان قد هدد بالفعل بالانتحار فماذا كان السياق السلوكي وماذا قال بالضبط؟.
- هل يبدو الطفل على أنه يعاني من حالة قلق عامّة؟.
- هل توجد لدى الطفل مشكلة في السيطرة على المعدة والمثانة؟.

وفي العطل الأسبوعي تتطلب مزيداً من البحث خصوصاً "إذا لم يكن هناك ما يشير إلى وجود أساس نفسي للخوف المرضي من المدرسة فنادراً" ما يكون الطفل مصاباً بغيروس من الصعب تشخيصه ولكنّه ضعف للطفل حتى ولو كانت هناك تبريرات نفسية، فإن المشكلات الجسدية المستمرة يجب أن لا تهمل، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى حالة طفل يبلغ العاشرة من عمره، أظهر هذا الطفل كل الأعراض التقليدية للخوف المرضي من المدرسة، فقد تم التغلب على مشكلة الحضور إلى المدرسة ولكنه استمر يعاني من آلام في المعدة وبعد أشهر عددة ظهر أن لديه أوراماً في المعدة، وإن مثل هذه الحالات نادرة لحسن الحظ.

(3) النشاطات خارج المدرسة:

إن المدى الذي يشارك فيه الطفل بشكل طبيعي في النشاطات خارج المدرسة، يعطي المعالج النفسي فكرة جيدة حول شدة المشكلة التي يعاني منها الطفل، فالطفل المنطوي على ذاته داخل المنزل والذي يرفض ترك جانب أمه وغير راغب في رؤية أصدقائه غالباً ما يكون أكثر اضطراباً من الطفل الذي يستمر في التصرف بشكل طبيعي خارج ساعات الدوام المدرسي، ومن الأهمية بمكان أن يتتأكد المعالج فيما إذا كان الطفل المنطوي على ذاته في المنزل يعاني من قلق الانفصال، وأنه يعاني من تجنب مرضي قوي من أصدقاء المدرسة، وقد يكون من المفيد أيضاً أن يتتأكد المعالج من أن العزلة الاجتماعية التي يعاني منها الطفل كانت موجودة في بداية مشكلة رفض الطفل للذهاب إلى المدرسة أم أنها تطورت كنتيجة لكونه خارج المدرسة.

إن الطفل الذي يستطيع أن يسير قرب المدرسة في عطلة نهاية الأسبوع دون أن يشعر بالقلق أو الخوف ثيس من المحتمل أن يكون لديه تجنب مرضي معمم من المدرسة.

4) الموقف نحو مشكلة رفض المدرسة:

بعض الأطفال قد تكون لديهم مواقف سلبية تجاه المدرسة بحيث يشعرون أن رفضهم الذهاب إلى المدرسة هو استجابة عقلانية ومنطقية. إن الأطفال الذين يشعرون بهذه الطريقة ستكون لديهم دافعية ضعيفة للتغيير موقفهم مالم يتم تحدي الأساس الذي يبنون عليه هذه المشاعر، وبذلك فمن الضروري البحث في مشاعرهم تجاه جوانب الحياة المدرسية جميعها.

اما الفريق الآخر من الأطفال وهم الأكثري شيوعاً فإنهم يضعون أهمية كبيرة للمدرسة ويشعرن بالذنب نتيجة تغييبهم الدائم، وفي مثل هذه الحالات يحتاج الطفل أن يقيم كيف أضافت الأحداث غير المتمنية وغير المسيطر عليها والتي سببت المشكلة، وفي الوقت نفسه يجب على المعالج أن يؤكّد لهؤلاء الأطفال أنه بالإمكان تجاوز هذه المشكلة.

5) الوظائف العقلية والتحصيلية:

إن عدداً لا ي Basics به من الأطفال الخائفين من المدرسة يعانون من صعوبات في التعلم، هذه الصعوبات لم يتم التعرف عليها بشكل كامل من قبل المدرسة. إن التقييم الدقيق لمواطن القوة والضعف عند الطفل سيسمح للمعالج النفسي أن ينصح ببرنامجه تعويضي مفصل، وفي بعض الحالات فإن حل المشكلات قد يكون خارج نطاق الوسائل العلاجية المتوفرة في المدرسة، لذلك يجب أن يتم طلب المساعدة من شخص متخصص.

(6) خصائص الشخصية:

إن السمات المزاجية للطفل وتركيب الشخصية لديه يجب عدم إهمالها وإن الأحداث اليومية التي تكاد لاتلفت انتباه الأطفال العاديين يمكن أن تكون مهددة للأطفال سريعاً التأثير (الحساسين). فعلى سبيل المثال إن الطفل الذي لديه تقدير منخفض للذات قد يتاثر بسرعة ويفسر أية علامات ضحكة كما لو أنه موجه له (أي لانتقاده).

إن الطفل المنطوي على ذاته والذي كان يعيش حياة هادئة قد يجد ضوضاء المدارس الكبيرة غير مريح بالنسبة له. إن استبيان الشخصية لـ إيزننك (1964) يعتبر وسيلة قياس مفيدة لقياس القبلي والبعدي وخصوصاً للطفل الذي يعيش حالة من الانطوائية والقلق؛ وهي تقدم أيضاً معلومات مفيدة حول حساسية الطفل الاجتماعية والتزامه الاجتماعي.

(74)

(7) العلاقات مع الأقران:

من المفيد الحصول على صورة لعلاقات الطفل في المدرسة، إذا كان الطفل غير مألف بشكل كبير ويتم إغاضته (السخرية منه) دائماً، فإن هذا من شأنه أن يقدم أساساً واقعياً جداً لتجنب الطفل عن المدرسة إذا كان الأمر كذلك فمن المهم للمعالج وهو يناقش المعلمين والأبوين والطفل أن يحاول لهم أسباب هذه السخرية. هل سخرية أقران الطفل منه نتيجة لوجود حبيب أو مشكلة تتعلق بشكله الخارجي (الجسدي) أو بسبب سلوكياته أو بسبب حساسيته الزائدة... إلخ؟ إذا كانت الشروحات والتفسيرات على وشك الظهور فإن العلاج النفسي يفرض نفسه.

إن المشكلات المتعلقة بالعلاقات الأساسية أحياناً لا يمكن التغلب عليها، وينصح عندئذ بتغيير المدرسة. إن بعض الأطفال يعتمدون بشكل كبير على صديق أو صديقين مقربين منهم، في مثل هذه الحال فإن تغيير الطفل لمجموعته التي يوجد فيها هذان الصديقان قد يسبب إزعاجاً للطفل. إنما يasis تقرير السلوك لروتر بول (1968) تقدم نقطة بداية مفيدة في النظر لسلوك الطفل وإن نسخة المعلمين يمكن أن تعاً من قبل المعلمين في وقت الاستشارة وتقارن مع نسخة الأبوين المملوكة في المقابلة الأولى.

٨) التاريخ التطوري:

إن الأطفال الخائفين من المدرسة غالباً ما يكونون من المدللين أو يتم التعامل معهم بتساهل شديد، لذلك يجب البحث في الأسباب المحتملة لهذا التدليل من جانب الأبوين. فعلى سبيل المثال:

- هل هناك تفسيرات أو تبريرات تطبيقية أو اجتماعية تجعل الأبوين يعاملان طفلهما بشكل مختلف عن بقية الأطفال؟
- هل هذا الطفل المدلل هو الأكثر تعلقاً من جانب الأبوين على حساب الآباء الأكثر سنّاً منه؟
- هل عانت الأم في إنجاب هذا الطفل أكثر من معاناتها في إنجاب بقية الأطفال؟
- هل عانى هذا الطفل من مرض كاد أن يؤدي بحياته؟
- هل عانى هذا الطفل من خبرات انفصال صعبة ومؤلمة؟
- هل عانت الأم من اكتئاب ما بعد الولادة عند إنجابها لهذا الطفل؟

إن مثل هذه الأحداث قد تقود الأبوين لتدليل طفلهم وإشباع حاجته بشكل مبالغ به مما يجعل هذا الطفل أكثر عرضة للتاثير والاضطراب.

ثانية، القلق المرتبط بالمنزل:

هناك العديد من القضايا المتعلقة بالمنزل والتي يجب أن تبحث بشكل منهجي، ولسوء الحظ فالقلق الناجم عن أحداث معينة يمكن أن يتشكل ويتم الحفاظ عليه من خلال ردة الفعل التي يبديها البالغون في محیط الطفل. وبذلك فإن الطفل الذي يشعر بالكدر بشكل طبيعي وذلك لفقد أحد الأبوين أو أحد الأقرباء أو أحد الأصدقاء قد يستمر في الانزعاج والضيق إذا وجد أحد أعضاء الأسرة يعاني من الاكتئاب. وفي الوقت نفسه فإن الخسارة المفاجئة لأحد أفراد الأسرة يمكنها أن تجعل الطفل يشعر بعدم الأمان ويمكن أن تنشأ لديه مخاوف تتعلق بموت فرد آخر من الأسرة ويمكن أن تنشأ مخاوف وقلق مشابه إذا كان هناك مرض في الأسرة (جسدي أو عقلي) وخصوصاً عندما يبالغ الأبوان في الحديث عن حالة المرض أمام طفليهما، أحياناً يأخذ الأطفال المعنى المجازي للعبارات التي يتحدث بها الأهل على أنها تحمل المعنى الحرفي. المخاوف المتعلقة بالصحة يمكن أن تشار إذا تعرض الطفل لمرض وخصوصاً إذا شعر الطفل بالاكتئاب بعد إصابة فيروسية غير سارة. مرة أخرى يمكن أن يسلط الضوء على المشكلات التي يعاني منها الطفل، وذلك بالحديث الدائم عن الأعراض الجسدية للطفل دون توضيح هذه المشكلات، وبشكل مشابه يمكن أن يتم تعزيز وتشكيل الأعراض الجسدية والنفسية البسيطة التي يعاني منها الطفل وذلك بتركيز الانتباه عليها من خلال:

1. إعطاء أدوية للطفل لا ضرورة لها.
2. الاستفسار المبالغ به عن مشاعر الطفل.
3. أخذ الطفل مرات عديدة مقابلة الطبيب خلال ساعات الدوام المدرسي.

إن مخاوف الانفصالية التي قد ترتبط أو لا ترتبط بالقلق من الموت أو المرض يمكن أن تسرع، بسبب انفصالة غير مخطط له عن أحد الأبوين أو عن عضو آخر من أعضاء الأسرة المقربين. إن هذا من شأنه أن يشكل مشكلة أكبر إذا كانت الأم أو الأب متغيبين عن المنزل خلال فترة النهار، بينما يكون الطفل في المدرسة. في هذه

الحالة تكون الطفل موجوداً في المدرسة يمكن أن يرثي بالقلق المحيط بالانفصال. إن عدم الشعور بالأمان والإحساس بالقلق الاجتماعي غالباً ما ينشأ بعد انتقال الأسرة من المنزل إلى آخر؛ فالطفل سيكون قد اكتسب بعض التوتر العائلي الطبيعي الناتج عن البيع والشراء وحزن الأمتنع والرحيل، بالإضافة إلى ذلك إذا كان الانتقال من منزل إلى آخر يتضمن انفصال الطفل عن أصدقائه المقربين، وإذا كان هذا الانتقال سيفرض على الطفل رحلة طويلة حتى يصل إلى مدرسته (أي أن المنزل الجديد يكونبعد من المنزل القديم عن المدرسة)، أو إذا اضطر الطفل إلى تغيير مدرسته، فإن القلق يبرز بشكل أوضح، وأحياناً الغيرة من اهتمام الآباء بالطفل الأصغر في المنزل قد يكون عاملاً هاماً، بالإضافة إلى ولادة طفل جديد، أو حدوث مرض لطفل صغير في المنزل مما يدفع الآباء للاهتمام به متناسين طفل المدرسة. ويمكن للأهل أن يساهموا في قلق الطفل من المدرسة وذلك بتوقع أشياء غير واقعية من الطفل أو بتقييم الطفل بشكل مبالغ به مما يؤدي بالطفل إلى إعطاء صورة لنفسه أكبر من حجمه الحقيقي.

حالما يكون الطفل خارج المدرسة فإن العديد من القضايا أو الأمور الثانوية يمكن أن تنشأ وتبقى على المشكلة. إن الخوف المرضي من المدرسة يمكن أن يتم تعزيزه سلبياً من خلال التجنب الناجم عن النشاطات غير المحببة للطفل أو للأشخاص غير المحببين له في المدرسة، ويمكن أن يعزز إيجابياً من خلال:

1. تمنع الطفل بحرية شخصية كبيرة في المنزل على سبيل المثال أن يستطيع مشاهدة التلفاز والبقاء في السرير متأخراً وأن يمارس هواياته واهتماماته الخاصة.
2. أن يعامل الطفل معاملة خاصة وأن يتم الاهتمام به كثيراً وهو خارج المدرسة، وفي بعض الأحيان يحاول الآباء تقديم رشوة لطفلهما حتى يعود إلى المدرسة ويقومان بشراء ملابس جديدة له... إلخ.



3. إزالة الضغط عن الطفل للحضور إلى المدرسة وذلك عندما يشور الطفل ويعرض بشدة وهذا من شأنه أن يوحى للطفل بأنه على حق وإن المدرسة على خطأ، وبالتالي يعزز الأهل هنا سلوك التجنب عند طفلهم.

واخيراً قد تكون هناك صعوبات عملية كثيرة متضمنة فيأخذ الطفل إلى المدرسة بحيث أن المشكلات لا تواجهه من قبل الآبوين، ومن الأمور التي تحدث بشكل شائع في هذه الحالة هي:

1. الأب لا يكون موجوداً في الصباح عندما تظهر صعوبات الطفل.
2. الأم لا تستطيع أن تدبّر أمر الطفل عندما يظهر مزاجاً مشاكساً.
3. وجود أطفال أصغر سنًا في الأسرة يتوجب أخذهم إلى المدرسة، وبذلك تشعر الأم بأنها غير قادرة على التعامل مع الطفل الذي يخاف من المدرسة، وفي الوقت ذاته تدبّر متطلبات الأسرة الأخرى.
4. سكن الأسرة في مكان بعيد عن المدرسة بحيث لا توجد وسيلة نقل أخرى إلى باص المدرسة.
5. عدم رغبة الآبوين في إجبار طفلهم على الذهاب إلى المدرسة وذلك لأنهم لا يريدان إزعاج طفلهما، ويسعون بالقلق تجاه إجبار الطفل على الذهاب إلى المدرسة، فهما يعتقدان أن هذا الإجبار من شأنه أن يزيد الطين بلة.

(1) العلاقات الأسرية:

إن استئمار سجل الخوف المرضي من المدرسة تقدم وسيلة سريعة لتسجيل المعلومات الأساسية، في العديد من الأسر تتمتع الأم بعلاقة لطيفة للغاية مع ابنها، وتنعم بعلاقة غير مشبعة و بعيدة مع زوجها. إن الأمر قد يزداد سوءاً عندما يكون على الأب أن يعمل لساعات طويلة خارج المنزل وبالتالي تلقى كل أعباء الأسرة على الأم، ومن الأهمية بمكان أن يعرف المعالج إلى من يميل الطفل أكثر إلى أنه أم إلى أبيه، ويجب عليه أن يعرف أيضاً "نوعية العلاقات بين أفراد الأسرة. ومن المهم أيضاً

التعرف على موقع الطفل في الأسرة ومكانته هل هو الابن المدلل في بعض الأحيان يكون الفارق العمري بين الطفل وأخيه الأكبر كبيراً جداً لدرجة أن الطفل يشعر أنه وحيد في عالم الكبار المحبيط به في الأسرة، في مثل هذه الحالة فإن الآبوين والأشقاء الأكبر سناً للطفل يميلون إلى تدليله وإلى إشعاره بأنه ذو قيمة كبيرة. في بعض الأحيان يمكن أن يوضح الابن الأكبر تحت الضغط لكي يتصرف بطريقة معينة بحيث يكون نموذجاً يقتدي به الأخوة والأخوات الأصغر سناً، وأحياناً قد يشعر الابن الأوسط بأنه مهملاً وذلك لأن أخواته الأصغر منه سناً يحصلون على الرعاية من جانب أبيه وأخواته الأكبر منه سناً يتمتعون بحرية التصرف في حياتهم.

(2) مصادر الضغط والقلق:

من المهم أن نتذكر أنه قد تكون هناك أموراً عديدة وإن كانت لا تهم الطفل بصورة مباشرة إنما مع ذلك قد تسبب بناء حالة من الضغط والقلق لأعضاء آخرين في الأسرة، وهذا ينتج عنه أن أفراد الأسرة تصبح لديهم قدرة ضعيفة على حل مشكلاتهم الخاصة، أحياناً عندما تزداد مشكلات الأسرة فإن الخوف المرضي من المدرسة قد لا يكون القضية الأساسية أو محور اهتمام الأسرة، وفي مثل هذه الحالة قد يكون مهماً أن يتم تأسيس أنظمة دعم للأسرة بالإضافة إلى تقديم المساعدة في كيفية التعامل مع الخوف المرضي من المدرسة.

(3) التكاليف المادية:

من المفيد البحث في التكاليف والعوائد للخوف المرضي من المدرسة لكل فرد من أفراد الأسرة بالإضافة إلى الأسرة يومتها، في بعض الأحيان تؤدي المشكلة عند الطفل (الخوف المرضي من المدرسة) خدمة للأسرة، فعلى سبيل المثال ممكناً لهذه المشكلة أن تنقل تفكير الآبوين من التفكير المؤلم في حياتهم الزوجية والحالة التي يعيشانها إلى التفكير في مشكلة طفلهما.

إن الأم التي توجد لديها عقدة الخوف من الأماكن المزدحمة والتي تميشه في ظروف منعزلة قد تكون مسؤولة بالإبقاء على طفلها في المنزل كحرفيق لها. إن مثل هذه الأمور قد ينبع عنها رفض العلاج من قبل الأسرة وهذا الرفض إما أن يكون واضحاً وصريحاً أو أن يكون ضمنياً، إن المعالج قد يحصل على دلائل تكشف له كيف حاول الوالدان حل مشكلة طفلهما وهل حاولوا فعلًا أو لا.

مرة أخرى هناك حاجة للتعامل مع كل فرد من أفراد الأسرة بالإضافة إلى التعامل مع الطفل الخائف من المدرسة علاجياً.

(4) أساليب التربية:

يجب قدر المستطاع أن يتم تشجيع الأسرة على تنظيم مصادرها الخاصة في التغلب على المشكلات والصعوبات التي يعاني منها الطفل، إذا أخذ المعالج على عاته كل المسؤولية في العلاج عندئذ قد ينشأ موقف اتكالي من جانب الأهل وينسون دورهم في علاج طفلهم، وبينما "على ذلك يحتاج المعالج أن يعرف الإيجابية على الأسئلة التالية:

- من الشخصية صاحبة السلطة في الأسرة؟
- ما الدور الذي يلعبه الجدان في تربية أحفادهما؟
- هل هناك أحد من أعضاء الأسرة يشكل نموذجاً للمشكلة التي يعاني منها الطفل الخائف من المدرسة؟
- هل يستطيع الآباء أن يفرضوا رأيهما على طفلهما ويمارسوا السلطة عليه، أو أنه خارج عن نطاق سيطرتهما ولا يستطيعان السيطرة عليه؟
- كيف ينظر كل فرد من أفراد الأسرة للصعوبات التي يعاني منها الطفل وما البرنامج العلاجي المقترن من وجهة نظرهم أي كيف يجب أن يكون العلاج من وجهة نظرهم؟
- إن هذا النوع من البحث والاستقصاء مهم للغاية خصوصاً مع الأسر التي تقوم العلاج بشدة.

ثالثاً: المدرسة:

إن مراجعة أدبيات العلاج التي تم ذكرها من هذا الكتاب تسلط الضوء علىحقيقة أن العديد من المعالجين قد أهملوا أو قللوا من أهمية دور العوامل المدرسية فيأسباب الخوف المرضي من المدرسة، وإن بداية هذا الفصل أكدت أن الشروط المسبقة للعلاج الناجح هي ملائمة البيئة المدرسية للطفل اجتماعياً وأكاديمياً.

يؤكد العديد من المعالجين أن هناك جوانب عديدة من الحياة المدرسية هي التي تسبب قلق الأطفال، ويقولون: إن إدراك الطفل للمدرسة هو الذي بحاجة إلى التغيير وليس حصول أي تغيير حقيقي في المدرسة. لقد ذكر أيضاً أن معظم الأطفال لا يتأثرون بالأحداث المختلفة التي يهتم بها كثيراً الأطفال الخائفون من المدرسة، إلا أن مخاوفهم هذه يجب أن تكون غير واقعية ولا عقلانية. التركيز في العمل العلاجي يتطلب العمل حول كيفية التعامل مع هذه المخاوف اللاعقلانية من خلال خفض الحساسية أو المواجهة. لقد قيل: إن مع العلاج الناجح سيدرك الطفل في النهاية أن هذه المخاوف كانت مخاوف مرضية وغير مبررة على الإطلاق، وأن الحياة المدرسية يمكن أن تكون تجربة ممتعة.

فالمعالج الذي يستخدم أسلوب الإضافة أو الغمر يبعد عن أبويه القلقين، ويجرِب الطفل على مواجهة المواقف المشيرة للخوف، ربما بدرجة من الدعم الاجتماعي والأكاديمي، رغم أن درجات القلق عند الطفل ترتفع في البداية، فإن سلوك التجنب عند الطفل يضعف حتى ينتهي القلق بصورة نهائية، ويدرك الطفل أن الموقف المشيرة للقلق قد تمت إساءة فهمها أو تشويهها، وفي هذا الحال سيعود الطفل إلى حياته الطبيعية في المدرسة متمتعاً بها، وكل الأشخاص ومن ضمنهم الأبوان والعلمون سيشعرون بالامتنان للمعالج لأنه اتخذ موقفاً قوياً وثابتاً، بغض النظر عن كون هذه الطريقة مبسطة بشكل كبير.

الخوف المدرسي والتشخيص والتبيه

تهمل حقيقة في هذا المجال فادها أن المواقف المثيرة للقلق تكون حقيقة تكون هناك أحياناً تعزيزات غير كافية لكون الطفل في المدرسة.

ويبدو بشكل واضح أن الجزء الأساسي من العمل التشخيصي يتضمن نظرية دقيقة وحساسة إلى القضايا المحيطة بقلق الطفل الذي يعبر عنه، ومن المهم غالباً أن تجري تغييرات جوهرية في البيئة المدرسية قبل التعامل مع أي خوف لاعقلاني متibi في عند الطفل.

وهناك أيضاً العديد من الأمور العامة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ففي بعض المدارس قد توجد فيها مشكلات متعددة غالباً ما يشار إلى طريقة الأنظمة للتعامل مع هذه المشكلات، بالإضافة إلى العمل العلاجي الفردي. إن المدارس التي تكون نسبة معدلات الدوام فيها ضعيفة بشكل عام يصعب العمل فيها على مستوى حالة العمل الفردية؛ ففي بعض المدارس قد يظهر الأطفال قليلاً التحصيل فقط في المجموعات العمرية الأكبر سنًا حضوراً ضعيفاً للمدرسة. إن الأطفال الخائفين من المدرسة والذين ينتمون إلى مثل هذه المدارس قد يكون من الصعب علاجهم على أساس فردي يبحث، وخصوصاً إذا كان الأصدقاء المقربون من هؤلاء الأطفال يتغيبون بشكل منتظم عن المدرسة، وبذلك يقدمون نماذج قوية لسلوك التجنب لدى الأطفال الخائفين من المدرسة.

وهناك المدارس التي تعاني من سلوك الشغب ومشكلات كبيرة في النظام قد تتعرض تحديات لا يأس بها للعلاج إن الطفل القلق جداً والذي يشتكي بشكل دائم من السخرية الدائمة من قبل أقرانه قد يكون عنده بعض الصعوبات المعينة في إعادة التكيف في مثل هذه البيئة وقد يكون من الضروري نقله إلى مدرسة فيها نظام أفضل وأمان أكبر بالنسبة له.



النظام في المدرسة:

إن تغيير الطفل للمدرسة أو حدوث تغيير جوهري داخل المدرسة ذاتها غالباً ما يسبّق الخوف المرضي من المدرسة، وربما هذا لن يكون مستغرباً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المدى الواسع للتعديلات أو الإصلاحات المتضمنة في هذا التغيير. فالطفل غالباً ما يضطر أن يصبح معتاداً على قواعد جديدة وروتين جديد، بالإضافة إلى متطلبات أكademie مختلفة، وتقديرات مختلفة، وأساليب تعليمية غير مألوفة له، وطرق تدريس مختلفة بالإضافة إلى تشكيل صداقات جديدة. إن التغيير الذي يحصل عند انتقال الطفل من المدرسة الابتدائية (حيث المدرس يكون واحداً في الغلب الأحيان) إلى المدرسة الإعدادية حيث يوجد مدرسون عدة يدرسون في الصنف أو الفصل الواحد قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات لدى بعض الأطفال، وإذا كانت المدرسة الجديدة موجودة في مكان بعيد عن المنزل ومحاطة ببيئة غير مألوفة للطفل، فإن إحساس الطفل بعدم الأمان يمكن أن يتزايد.

وكذلك هناك مواد دراسية معينة يمكن أن تخلق مشكلات كثيرة للأطفال معينين، فعندئذ قد تتمرّك الصعوبات حول العمل أو الوظائف التي يؤديها الطلاب في المدرسة فيما إذا كانت سهلة جداً أم صعبة جداً بالإضافة إلى العلاقات مع المعلمين أو مع التلاميذ في المجموعة التعليمية. كذلك من الممكن أن تتمركز الصعوبات حول الأسلوب التعليمي. لذلك فالمشكلات التعليمية المحددة تحتاج إلى بحث دقيق وعلاج من قبل المعالج النفسي.

كذلك الأطفال ذوو الوزن الزائد قد يجدون في دروس الرياضيات تهديداً لهم وأن الفشل في أداء التمارين الرياضية بالإضافة إلى سخرية الأقران قد يؤدي إلى إحساس الطفل بضعف الثقة بالنفس، لذلك من المهم أن يتم توفير الألعاب بحيث يستطيع هؤلاء الأطفال أداءها وبالتالي يستعيدون الثقة بأنفسهم. إن تجنب الألعاب يمكن أن يرتبط مع العديد من المشكلات ومن ضمنها الخوف من الأذى الجسدي، الخوف من الاستحمام أمام الأقران، الخوف من المدرس الذي ينفعل بشدة

الخوف المدرسي والتشخيص والتنبؤ

أمام الأطفال... إن الخ لذلک يجب توضیح القلق المرتبط بكل جانب من جوانب الحياة المدرسية للطفل حتى يتم اتخاذ الخطوات الملائمة للمساعدة.

وهنالك عدد من الأطفال لديهم طموح كبير ويضعون لأنفسهم أهدافاً شبه مستحيلة التحقق، وعندما يفشلون في تحقيق هذه الأهداف يشعرون بالقلق الشديد، إن مثل هؤلاء الأطفال غالباً ما يكون تحصيلهم عال، وهناكأطفال آخرون قد يكون لديهم مشكلات في التعامل مع الامتحانات والاختبارات؛ فالعديد من هؤلاء يشعرون بالقلق إذا طلب منهم الوقوف أمام زملائهم في الصف والتحدث في موضوع ما، وهناك بعض الأطفال يشعرون بالخجل من القراءة بصوت مرتفع والإجابة على أسئلة المدرس أمام زملائهم، إن الإشارة المبكرة لوجود الخوف المرضي من المدرسة غالباً لا يمكن ملاحظتها..

كثيراً ما تشير الأيام الزائدة التي يقضيها الطفل خارج المدرسة، وزياراته المتكررة إلى العيادة المدرسية مشتكياً من وجود آلام خفيفة وصداع إلى أن هناك شيئاً ما خطأ في هذا الطفل، وأن تقديم المساعدة للطفل في هذه المرحلة والاهتمام الزائد به والتعامل الجيد معه فيهذه المرحلة يمكن أن يجنب الطفل خوفاً مرضياً شديداً، ولكن ما إن تتطور المشكلة لديه ستنشأ لديه أمور ثانوية.

خلاصة:

مما سبق يمكن القول: إنه ينبغي "في هذه المرحلة الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن التمييز بين التشخيص والعلاج هو تمييز مصطنع وفي الحقيقة كلاهما مرتبط بالآخر، ويجب مند البداية أن يولي المعالج انتباهاً شديداً" للعديد من الأمور الأساسية أو الجوهرية المتعلقة بطريقة العلاج وذلك لكي يبني الثقة والأنفاس، وانيجمع كل المعلومات الهامة المتعلقة بالمشكلة ثم استخلاصها من كل طرف من الأطراف المشتركة في العلاج، وإن العملية التشخيصية بحد ذاتها تتضمن العديد من العناصر العلاجية ممهدة الطريق لمرحلة المجاية النهائية والمؤلة بهدف إحداث

التغير الإيجابي في سلوك الطفل الرافض للمدرسة وتكوين اتجاهات سارة يخص صور المدرسة.

ثانياً: تطور وسائل الخوف من المدرسة:

اما بالنسبة لتطور الخوف المرضي من المدرسة لدى الأطفال فيتجلى في ثلاثة أشكال وهي:

أولاً: قد لا يختفي الخوف من المدرسة وكذلك الأعراض المرتبطة به: ففي أحوال نادرة لا يسهل تفسير هذه الاستمرارية فهناك احتمال بوجود "ذهان سمبيوزي" الذي ينخفض تماماً أثناء الأعوام الأولى من حياة الطفل، وهناك حالات أخرى يشير الأمر فيها إلى تنظيم نفسي يصعب تقاديره إلا في السياق الأسري فحينما لا يقدر الآباء على تحمل طفلهما وحيثما تسهم المدرسة في استثناء ذكريات مثيرة للقلق، فإنها عوامل من شأنها أن تعدد المواقف، وتدفع الطفل لمجاهاه رغباته الغريزية التي لم يكن يسيطر عليها ويكتبها. ومثل هذه العوامل تكون لها آثارها السيئة على الجهاز النفسي للطفل فالقدرة على الابتعاد عن الأسرة بعد أحد المكتسبات الخاصة بالتطور النفسي السوي للطفل.

ثانياً لا يجد الخوف من المدرسة عند الطفل في هذه المرحلة بشكل واضح بالنسبة للبالغين، إذ أن الحصر لا يحدث إلا في الطريق لحظة النهاية إلى المدرسة. إلا أن الطفل يخفيه ولا يتحدث عنه، ولكنه يعرب في وقت لاحق عن أهمية هذه اللحظات والتي كانت بمثابة العواصف التي عصفت بكيانه والتي كان يشعر بها في كل مرة يدخل فيها صيفه.

ثالثاً: قد يستمر الكف (الكف) هو تعطيل آلية وظيفة من وظائف الذات أو إضعافها أو الحد منها (47, 26) في حالة غياب الشخص الذي يحتمي به الطفل لفترات طويلة وقد يظهر على نحو ثانوي أثناء فترة الكمون، وذلك من جراء التقلبات الغريزية الخاصة بهذه الفترة والتي تبدو على شكل ظهور انفعالات

اكتئابية بسيطة من قبيل الضيق أثناء فترة بعد الظهريرة في المدرسة أو من جراء آليات الاستفاضة نتيجة اعتقاد الطفل بأنه هدف لعدوانية رفاقه أو مدرسيه. ومن بين الآثار الأكثر وضوحاً لهذا الكف بالنسبة لهؤلاء الأطفال، يبدو في شكل عدم قدرتهم على الاستماع إلى المدرس أثناء شرحه للدرس، إذا لم يوجد حديث مباشره للطفل نفسه.

(3733, 52)

وتطور المخاوف المرضية لدى المراهقين يأخذ أشكالاً عدّة منها:

1. تطور أعراض الخوف المدرسي نحو تكوين فصامي، وغالباً ما يكون أكثرها ندرة وخصوصاً عند فحص الأعراض الأكثر وضوحاً، حيث تظهر لديهم سمات الالتانغم. وسمات الذاتوية كما تظهر سمات هذيان برانوي.

2. وقد تطور أعراض الخوف من المدرسة عند بعضهم الآخر من المراهقين، فيتبيّن لديهم عدم القدرة على التوفيق مع رغباتهم الحقيقية أو عدم قدرتهم على تحمل الإحباط الذي يرتبّط بأسرته وبعلاقتهم به، فقد يبدو المراهق غير قادر على احتمال عدم اهتمام والده به، ولذلك فإن عدم ذهابه للمدرسة، يبقى على رغبته في أن يبقى مع والديه، ويفرض وجوده على والديه بشكل متزايد وذلك بشكل مباشر وغير مباشر، ودفعاً عن منطقه الخاص من جهة ثانية يصبح انتهاوها مثيراً للألم والخطر من حيث إنها تمثل عدواً على الجسد.

3. وهناك فئة أخرى من هوبيات المدرسة لدى المراهق اكتئاب تشارةً حيث تبدو بدايات الفobia لدى هؤلاء واضحة وأن هذه الفئة تتسم بسمة محددة، وهي أنها لا تنحدر من هوة الفحصان، ويعني بها تلك الحالة التي يبدو فيها على المراهق إخفاق تام في الذهاب إلى المدرسة أو في الجامعة والتي يصاحبها نزعة اكتئابية أكثر وضوحاً مما هي عليه في الحالات السابقة الذكر حيث يكون المراهق حزيناً من جراء إخفاقه كما تظهر في هذه الحالات أيضاً اهتمامات (هيبيوكو ندرية) (تشوه المرض) حيث يطالب المراهق من الذين حوله برعايته.

4. تنتظم بعض حالات من الخوف المدرسي لدى الطفل الكبير في شكل حالات هستيريا حصر حقيقة؛ التي تشير إلى أعراض مخاوف أصلية تنتهي بتنفسان القلق خارج نطاق المواقف المثيرة للقلق، وذلك دون وجود مشاعر اكتئابية.

(37, 22, 53)

كما يرى بولبي (1973) أن الخوف المرضي من المدرسة يعدّ المسؤول عن كثير من اضطرابات سن الرشد؛ كالعزلة الاجتماعية والخوف من الأماكن المفتوحة والخوف من الذهاب إلى العمل. ومن المحتمل أن يؤدي الخوف المرضي من المدرسة إلى حالة فصامية في المستقبل، فقد ذكر "ديفي" (1960) أن (50%) من طلبة الجامعة الذين تم تشخيصهم بالفصام كانوا يعانون بشكل أو آخر من أعراض الخوف المرضي من المدرسة (73, 26).

يلاحظ مما سبق أنه إذا كان الطفل والأسرة والمدرسة تمثل الأبعاد الأساسية والمسؤولة عن خوف الطفل من المدرسة، فإن على المعالج النفسي إذا أراد أن يتصدى لهذه الظاهرة عند الأطفال من خلال استخدام الأساليب العلاجية المناسبة أن يأخذ بالاعتبار هذه الأبعاد؛ لأنها تشكل المحور الأساسي لفهم هذا الاضطراب.





العلاج النفسي

لخوف الأطفال من المدرسة



MOHAMAD KHATAB



MOHAMED KHATAB

الفصل السادس

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

مقدمة:

لاحظنا مما سبق أن علماء النفس وال التربية والطب النفسي قد تناولوا الأسباب المؤدية إلى ظهور الخوف المرضي من المدرسة من زوايا نظرية مختلفة، تتفق وإنتماًاتهم النظرية سواء كانوا تحليلين أم سلوكيين أم هنريولوجيين... وهذا الاختلاف جعلهم يتناولون هذه الظاهرة بالتشخيص والعلاج من زوايا مختلفة أيضاً. لذلك فسوف نركز في هذا الفصل على الأساليب العلاجية المختلفة التي تناولت هذه المشكلة لدى الأطفال من وجهة النظر التحليلية والسلوكية والطبية والمعرفية... الخ، علنا نضع بين يدي المعلمين والمرشدين النفسيين والأباء بعضًا من الأساليب العلاجية التي تشيد بهم في التعامل مع هذه المشكلة في حال ظهورها لدى أطفالهم.

وأهم هذه الأساليب هي التالية:

أولاً: الديناميات النفسية في علاج الخوف المرضي من المدرسة

إن الأعمال العلاجية للخوف المرضي من المدرسة كانت مبنية بشكل واسع على مبادئ واستراتيجيات نظرية التحليل النفسي، ورغم ذلك فإن الاستراتيجيات والأساليب العلاجية تنوّعت بشكل كبير تحت مظلة التحليل النفسي، وكانت هناك اختلافات جوهرية على وجه الخصوص في الرأي فيما يتعلق بالشخص القائم بعملية العلاج وفي المكان المناسب الذي يتم فيه العلاج، وهل يجب الإصرار على العودة القوية للطفل إلى المدرسة قبل أو خلال أو بعد العلاج؟ وإلى أي مدى يجب أن تأخذ العوامل الموجودة خارج الأسرة بعين الاعتبار في تحديد أسباب الخوف المرضي من المدرسة وعلاجه.^٩

لقد كانت الكثير من الأعمال الرائدة في مجال العلاج النفسي مهتمة بالاضطرابات النفسية التي تصيب الطفل، رغم أن معظم الدراسات وسعت نطاق العلاج ليشمل العلاقة بين الطفل وأمه؛ فقد ركز "مالمويست" (1978) على حقيقة مؤداها: رغم أن دراسات عديدة ناقشت طبيعة دينامييات الأسرة في شرح أسباب الخوف المرضي من المدرسة، فإن قليلاً جداً من المعالجين قد أشرك الآباء في عملية العلاج إلا أن هذا الأمر غير ذلك، فقد أكدت الأبحاث الحديثة في هذا المجال والتي نشرها سكينر (1974) وفرام روس franrose (1978)، وهسيا (1984) على أن العلاج يجب أن يبني على نموذج الأسرة، حيث يلعب الأب دوراً محورياً في العلاج. كما أكدت المعالجات النفسية الخاصة بالمخاوف المدرسية والبنية على الدينامييات النفسية للطفل أهمية العلاج القائم على المجتمع أو العلاج الخارجي (أي الداعم من الأهل والمدرسة والأقارب وطبيب الأسرة...الخ.).

إن خبرات الانفصال المفاجئة التي يশملها العلاج في المشفى يبيدها تسير على عكس المبدأ العام الذي يدعو إلى التعقل والتفهم كطريقة لحل الصعوبات التي يعاني منها الطفل، ومع ذلك ففي ظروف معينة فإن القبول بالعلاج داخل المشفى يتضح به، ولكن غالبية المعالجين ذوي التوجه الذي ينامي في العلاج يؤكدون العودة المبكرة للطفل إلى المدرسة مهمة جداً لنجاح السيطرة على مخاوف الطفل من المدرسة. لكن تومسون (1948) يرى عكس ذلك، حيث يقول: إن أي شكل من أشكال الضغط على الطفل للعودة إلى المدرسة يمكن أن يكون خطيراً على الطفل، كما يصبح خوف الطفل نتيجة لذلك أكثر حدة، والعلاج عندئذ يصبح أكثر صعوبة. بينما اقترح "تالبوت" (1957) على أن الاحتياطات النفسية للطفل، وأمه يجب أن تتوخى بعين الاعتبار في توقيت عودة الطفل إلى المدرسة، ولكن الخطوة الأولى يجب أن تتضمن إزالة الضغط على الطفل بشأن الحضور إلى المدرسة، وذلك لكي يسمح ببدء العلاج.

اما والد هوجل، "كوليدج" و "هان" (1957) waldfogel ,coolidge and Hahn فقد رأوا بأن المودة السريعة إلى المدرسة من قبل الطفل سوف تؤدي إلى انسحاب الطفل والأسرة من العلاج تاركين تناقضات عاطفية وقضايا غير محلولة.

هذا، ويكرر (سيرننخ) (1961) perling وجهات النظر السابقة حيث يرى أنه إذا تم التخطيط للعلاج النفسي فمن الأفضل الكشف عن الديناميات المتضمنة في سلوك الخوف لدى الطفل، وعندما يتم ذلك، فإن الطفل سيعود إلى المدرسة طواعية، وأنه سيدعى لنفسه مسؤولة القيام بهذا الفعل، وأية طريقة أخرى ستعرضي الطفل من هذه المسؤولية وتضعها بـ"لا" عن ذلك على عاتق الأبوين والمعلمين أو المعالج.

ويبدو من هذا العرض، أن العلاجات البنية على دينامييات البنية النفسية للطفل الذي يعاني من الخوف المدرسي، إما أنها أهملت أو قللت من دور العوامل المدرسية في شرح أسباب الخوف المرضي من المدرسة وعلاجه، ولكن بعض العلماء أكدوا أهمية التنسيق بين العلاج القائم على الأسرة ومن يعمل في المدرسة كالمعلمين، وعلى سبيل المثال فقد قدم بورنستين (1949) تحليلًا مفصلاً لحالة الطفل "فرانكي" الذي يبلغ الخامسة والنصف من العمر، والذي كان تحت العلاج لمدة ثلاث سنوات، حيث ركز العلاج بشكل أساسي على الطفل، ولكن "بورنستين" أدرك الحاجة إلى تطوير العلاقة والحفاظ عليها بشكل مستمر مع والدي الطفل، وبذلك تم تفسير المادة اللاشعورية المعاكسة للحوادث الواقعية. وكذلك أكدت المقالة الكلاسيكية ل جونسون، فالشين، تسورك، وسفنسون falstin, johnson, szurek and svendsen ، أهمية علاج الطفل وأمه معاً، حيث نصحوا بأنه يجب أن يشتراك معالجون نفسيون في علاج الطفل وأمه بشكل منفصل من قبل معالجين مختلفين، واعتبروا أن مساهمة الأب في مشكلة الطفل مساهمة غير مباشرة، وذلك لأنه يزيد من اضطراب الأم، كما أن العلاج الذي يتعلق بالألم يتم إجراؤه بفعالية أكثر وذلك بمساعدة الأم في توضيح وإعادة تركيب وتنظيم عواطفها تجاه زوجها

"بدلاً" من التعامل مع الأب بشكل مباشر، كما وصف "فان هوتون fanhoten (1948) حالة (12) طفلاً" تم تركيز العلاج على العلاقة المتناقضة بين الأم وطفلها الخائف من المدرسة، مع التركيز على علاقة الأم بزوجها ومجتمعها، وموقف الطفل من أبيه وأخته، وموقفه من أقربائه ومشاعره حول الأعراض المرضية للخوف من المدرسة.

أما روينسون، دونكسان، وجوتيسون (1955) فقد وصفوا حالة طفلة خائفة من المدرسة تبلغ من العمر (14) عاماً كانت تعاني من قلق الانفصال، حيث تمت إجراءات المعالجة عن طريق معالجة الطفلة والأم، لكن المعالجين أشاروا إلى وجود عصاب عند الأب والذي تلعب دوراً هاماً في مشكلة الطفلة. بينما أكد دافيدسون أهمية العوامل المدرسية في وجود الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل، واعتبر تغير البرنامج المدرسي، وحتى تغيير المدرسة أو نقل الطفل إلى مدرسة أخرى مهمًا في بعض الأحيان بشرط أن يكون ذلك من أجل علاج الطفل الخائف من المدرسة.

ثانياً: نظرية التحليل النفسي في العلاج:

إن أنصار العلاج بالتحليل النفسي (كينيدي Kennedy وسبيرننج Sperling وجافريس javris) يفترضون أن الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يعانون من قلق الانفصال عن أمهاهم، وخالفون أيضًا من مغادرة الوالدين المنزل والذهاب إلى مكان خارجه كالسوق. وفي الوقت ذاته يكون الوالدان وقائين ومستائن من السماع للأطفال بتحقيق استقلاليتهم، إن ردود فعل الأم للتلميذ والسيطرة تنتج خوف وصداء عند الأم، وعداء وإثم وقلق لدى الطفل، وعندما يصل الطفل إلى سن المدرسة، فإن القلق ينتقل من الأم إلى المدرسة. ولتبخفيه حدة هذا الانزعاج، يحاول الطفل تجنب المدرسة والبقاء في المنزل.

(42-33, 83)

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

هذا، ويستخدم أصحاب مدرسة التحليل النفسي فنون علاجية تتضمن مع الإطار النظري الذي وضعه (فرويد) و (آنا فرويد) و (ميلاتي كلاين) في علاج المشكلات التي يتعرض لها الأطفال، ومن ضمنها المخاوف بشكل عام، ويرى أصحاب هذه النظرية أن هناك تناقضًا بين مكونات الشخصية

(الهو، الأن، الأن الأعلى) لدى الطفل الذي يعاني الخوف من المدرسة، ونتيجة لهذا التناقض يقوم الطفل بعملية استبدال للاشعورى لهذه المخاوف في مثيرات طبيعية في البيئة وخاصة البيئة المدرسية، كأن يقول الطفل إن المدرس يعاملني معاملة قاسية. أو إن الواجبات التي أخذتها في المدرسة كثيرة، أو إن الامتحانات صعبة. وهذه العملية تعد في نظر الطفل أدلة لحمايته من الواقع في مواجهة تلك الرغبات اللاشعورية التي تشير في نفسه للقلق والخوف.

ويقوم العلاج النفسي التحليلي بناءً على هذه الرؤية بتحليل الطفل من النزعات والرغبات المكبوتة في اللاشعور، وخصوصاً تلك المتناقضة أو المتعارضة مع رغبات دوافع الأسرة والمجتمع، بحيث يجعل المعالج النفسي يدرك هذه الرغبات وي العمل على تحقيقها أو تجنبها بطريقة شعورية من خلال العلاقة الودية بين المعالج والطفل الذي يعاني الخوف من المدرسة أو من آية مخاوف أخرى؛ فالمعالج في هذه الحالة يقوم بتناول الرغبات والنزعات المكبوتة اللا شعورية عند الأطفال والتي أدت به إلى خوفه من المدرسة، وتحليلها بطريقة واقعية.

أما الأساليب العلاجية التي يستخدمها هذا النوع من العلاج فهي كالتالي:

(1) هنية العلاج باللعب (Blay therapy)

استخدم فرويد هذه الفنية في تشخيص حالة الطفل "هانز" الذي كان يخاف أن تعشه الأحصنة، ولكن عن طريق والد هانز. وقد نظر فرويد إلى هذه الحالة على أساس نظريته في النمو النفسي الجنسي للفرد التي تواجه مصاعب معينة في أعمار أو مراحل معينة. وقد كان للعب هانز التلقائي يقوم بدور حصانه

ويترك دمى الخيول تسقط، ومكان ذلك السلوك من جانب الطفل يعد بديلاً عن التداعي الحر الطليق الذي يقوم به الكبار، وقد تابعت "انا فرويد" وجهة نظر والدها في النمو الوجداني للطفل، ولكنها عدلت في طريقة خاصة بالعلاج النفسي لكي تطبقها على الأطفال. ورأت أن علاج الأطفال يختلف اختلافاً جوهرياً عن علاج الكبار، كما أوضحت أن التحليل النفسي للأطفال ينبغي أن يكون تعليمياً.

(86,44)

وفي هذا الأسلوب يتاح للمعالج فرصة ملاحظة الطفل أثناء اللعب مما يمكنه من ضبط وتوجيه سلوكه نحو الهدف المنشود، وفي علاج الطفل الذي يخاف من المدرسة يعطي المعالج للطفل أدوات اللعب الموجودة في غرفة اللعب أو يلعب مع رفاقه لتمثيل بعض المواقف الاجتماعية.

وغالباً ما يقوم الطفل باختيار العابه التي يفضلها من بين تلك الألعاب الموجودة في غرفة اللعب تاركاً المعالج الحرية له في اللعب بها بالطريقة التي يراها مناسبة له دون خوف أو قلق. وهذا الأسلوب يجعل الطفل يمثل خبراته وصراعاته بطريقة درامية، مما يتبع له فرصة التعبير والتنفس الانفعالي عن التوترات التي تنشأ عن الصراع والإحباط. فعندما يعطي الطفل أدوات اللعب فإنه يبدأ في التعبير عن مشكلاته التي قد يشجعه على تكرار الموقف الذي يمس مشكلاته الانفعالية. فيعبر الطفل عن انفعالاته ورغبته في عدم الذهاب إلى المدرسة كما يستطيع أن يجد الحلول لصراعاته، وأن يصل إلى حل مشكلاته من خلال زوال القلق وخفض التوتر الذي يعني منه الطفل، وبالتالي يقلل من أهمية الدفءات التي يلجمها الطفل في تبريره لعدم الذهاب إلى المدرسة. أما دور المعالج النفسي المتبعي أسلوب العلاج باللعب فينحصر في تفسير الواقع ومشاعر الطفل بمطريقة تتناسب مع عمره وحالته بعد أن يكون قد تكون علاقة بينه وبين الطفل قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة. كما يقوم المعالج بتنمية وتحفيز عادات جديدة ومفيدة بالنسبة للطفل بدلاً من تلك العادات السابقة. والمعالج النفسي كذلك يحاول أن يوضح للطفل

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

مخاوفه تجاه الذهاب إلى المدرسة، والتي هي عبارة عن رمز لصراعاته اللاشعورية، حيث يقوم باستبعاد الطفل بأصل مشكلته، وعندما يتم ذلك فإن الطفل يصبح قادراً بدرجة أكبر على العودة إلى المدرسة، ويتحقق ذلك في الوقت الذي يتعرف فيه الطفل على أسباب مشكلته. ومثال ذلك ما قام به عبد الرحمن سليمان (1988) من دراسة تحت عنوان: دراسة مقارنة بين أسلوبي اللعب غير الموجه والتحصين التدريجي في علاج المخاوف المرضية من المدرسة لدى أطفال المرحلة الابتدائية، فقد تكونت عينة الدراسة من (60) تلميذاً وتلميذة من أطفال الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، حيث قسمتهم إلى ثلاثة مجموعات:

1. المجموعة التجريبية الأولى:

وهي تلك المجموعة التي طبق عليها برنامج التحصين التدريجي.

2. المجموعة التجريبية الثانية:

وهي التي طبق عليها برنامج العلاج غير الموجه عن طريق اللعب.

3. المجموعة الضابطة.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين مجموعتي الأطفال التجريبية الأولى والثانية لصالح المجموعة التجريبية الثانية (مجموعة العلاج باللعب غير الموجه).

(1988,35)



أما الانتقادات الموجهة إلى هذه الفنية من العلاج فيمكن إجمالها في الآتي:

إن العلاج باللعب يصبح أقل فعالية وخصوصاً مع الأطفال كبار السن، لذلك ينبغي على المعالجين النفسيين اللجوء إلى فنون علاجية مناسبة مثل: السينيوراما، كتابة القصة، إتمام القصة، أو النصيحة المباشرة. ومع ذلك فإن هذه الفنية من العلاج مناسبة أكثر من غيرها وخصوصاً عندما يستخدمها الأخصائي النفسي مع مجموعة من الأطفال يعانون من المشكلة نفسها تقريباً. وقد استخدمت هذه الفنية أيضاً ميلاني كلاين Melanie klein في علاج الأطفال، حيث اعتبرت أن التعليم المباشر (الموجه) لا ينفع فيه، لذلك استخدمه فرويد، لقد اللعب التلقائي (غير الموجه) وكبديل للتداعي الحر الذي استخدمه فرويد، لقد افترضت (كلاين) أن ما يقوم به الطفل في اللعب الحر يرمز إلى الرغبات والمخاوف والصراعات غير الشعورية، وهو ما يتطلب من المعالج النفسي إقامة علاقة خاصة بالطفل حيث يمثل دور الشخص العادي، وتصبح مهمة المعالج النفسي بعد ذلك جعل الطفل مدريكاً لهذه العلاقات الواقعية عن طريق قيامه بتفسير ألعاب الطفل.

(33, 34)

وقد استخدمت كلاين الدمى المصغرة في اللعب الاستفهامي، وكانت الدمى تمثل في أغلب الأحيان أفراد الأسرة، ويمكن أن يلعب الطفل بالآخر "الصلة" بطريقة تظهر أن وحدات الصلة تمثل مجموعة من الناس ربما كانوا من أفراد أسرة الطفل أو الزملاء أو المدرسون في المدرسة؛ ففي هذه الحالة قد يواافق الطفل أو يرفض ما يقوله المعالج النفسي له، وقد يستمر في اللعب. فإذا كانت الموافقة بقلق شديد حيال التفسير الذي يقدمه المعالج، فمن المحتمل يحتمل أن تتعارض هذه الموافقة مع تفسير المعالج عن موقف الإنكار من جانب الطفل.

(242, 46)

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

ولو حاولنا تطبيق ما قلناه عن العلاج باللعب الموجه وغير الموجه في علاج الطفل الذي يعاني من الخوف من المدرسة، فإننا نجد ما يلي:

1. تكوين علاقة طيبة بين الطفل والمعالج النفسي تقوم على: مساعدة الطفل على إظهار السلوكيات والمواقف المؤثرة التي مربها في حياته السابقة سواء في المدرسة أم في المنزل أم في البيئة الخارجية، وذلك بهدف اكتشافها والتعرف عليها.
2. الحديث عن جميع الخبرات التي تسبب للطفل قلقاً "وتؤثراً" داخل أو خارج المدرسة، وتشجيعه على توجيه شعوره إيجابياً نحو العلاج.
3. مساعدة الطفل على إدراك هذه الخبرات عن طريق الاستبصار والتعويق بالتأثيرات والمواقف التي أدت إلى ظهور القلق، ثم نقلها إلى الحياة الواقعية، مما يساعد على تقليل حدة القلق والخوف من المدرسة.
4. الرجوع إلى المدرسة بأسرع وقت ممكن.

تقييم نظرية التحليل النفسي في العلاج:

وظيفة المعالج هنا هي تنمية الأنا عند الطفل، وجعله أكثر واقعية في الحياة وأكثر اعتماداً على نفسه، وتقليل تعلقه بأمه.

فاعليته:

يلاحظ من استقراء الدراسات الكثيرة التي أجريت في هذا المجال، من خلال استخدام فنون التحليل النفسي مثل: دراسات "فيني و كولنج" (1973) فجاءة هذا اللون من العلاج في خفض حدة الخوف والقلق تجاه المدرسة لدى مثل هؤلاء الأطفال، وبالتالي عودتهم إلى المدرسة والاستمرار فيها دون ظهور أية أعراض مصاحبة لذلك الخوف. فقد أظهرت الدراسة التي قام بها فيني و كولنج (1964) بهدف التعرف على فاعلية العلاج التحليلي في خفض حدة الخوف من المدرسة وذلك من خلال الأبحاث التي أجريت منذ عام (1953-1958) في مركز جوج بيكر judge Baker guidance centre: ن فترة متابعة استمرت

من (5 – 10) سنوات د (49) طفلاً من أصل (66) طفلاً تم تشخيصهم على أنهم يعانون الخوف المرضي من المدرسة، وأن (47) من أصل (49) من عدد الحالات التي تم علاجها والتي كانت تعاني من الخوف المرضي من المدرسة زالت عنها أعراض الخوف من المدرسة، واستمرت في الحضور إلى المدرسة بشكل دائم.

الانتقادات؛ وأهمها ما يلي:

- في الواقع الأمر أن استخدام العلاج النفسي القائم على النظرية التحليلية في علاج الخوف المرضي من المدرسة لدى الأطفال يبدو أكثر تعقيداً بالمقارنة مع الكبار، كما أنه يحتاج إلى خبرة كبيرة في هذا المجال.
- إن هذا النوع من العلاج يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى عدد من الشهور أو حتى لسنوات طويلة، حيث يعمل المعالج المتبعي هذا العلاج إلى فهم الصراعات النفسية الدائرة في لاشعور الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة واكتشافها، ومعرفة العوامل النفسية الشعرورية واللاشعرورية الكامنة وراء هذا السلوك وبالتالي العمل على حلها من خلال استبصار الطفل بأصل المشكلة التي يعاني منها. إلا أن المسألة في ذلك تتعلق بدرجة الوعي الذاتي والمراقبة المنطقية في الحكم على الأشياء لدى هذا الطفل الصغير السن في الغالب. وبناءً على ذلك فليس بكل الأطفال قادرين على الوصول إلى هذا الفهم وذلك الاكتشاف بصورة منطقية. بالإضافة إلى أن الطفل الذي يعاني هذا الخوف من المدرسة هو في الغالب طفل صغير السن نسبياً (6 – 12 سنة)، وقد يدللي بتقرير ذاتي حول مشكلته كأن يقول: "إن سبب مشكلتي في عدم قدرتي على الشهاب إلى المدرسة تتعلق بمشكلات داخل الأسرة، أو مشكلات تحصل لي داخل أسوار المدرسة.. أو علاقاتي التضطريبة مع زملائي..." الخ

إلا أن هذه التقارير التي يدللي بها الطفل قد تكون في كثير من الأحيان سطحية وتتسم بالذاتية ولا تمت بصلة إلى الأسباب الحقيقة للمشكلة، وبناءً على ذلك لا يمكن الوثيق بها.

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

يبقى العلاج النفسي التحليلي مثار تساؤل واستفهام دائم من قبل الباحثين حول فاعليته في علاج المشكلات النفسية التي يعاني منها الأطفال وخاصة الخوف المرضي من المدرسة. فقد أشار كثير من الباحثين أمثال "كيلي Kelly" و"سميث Smith" و"بلاج Blagg (1987)" أن هذا الأسلوب من العلاج غير فعال وغير عملي في علاج ظاهرة الخوف المرضي من المدرسة بالمقارنة مع الأساليب العلاجية الأخرى كالسلوكية على سبيل المثال.

ثانياً: العلاج السلوكي Behavioural Psychotherapy

يرى أصحاب التوجه السلوكي في العلاج أن علاج الخوف المرضي من المدرسة يتركز على الأعراض المصاحبة لهذا الخوف، والذي يعدّ تعبيراً عن قلق الطفل، ولا يرون أي مبرر لعلاج هذا الاضطراب عند مثل هؤلاء الأطفال من خلال البحث أو استقصاء الأساليب العميقية أو الكامنة في المجال اللا شعوري للطفل مثل "مدرسة التحليل النفسي". كما يرى أصحاب هذا الاتجاه في المعالجة أن الخوف المرضي من المدرسة ما هو إلا أسلوب متعلم تم عن طريق تعزيز سلوك التجنب لدى الطفل. ويرتكز الأساس في هذا العلاج على تعریض الطفل الخائف من المدرسة للمواقف أو الموقف الذي يخاف وينزعج الطفل منه، حتى يألفه ويزول خوفه منه. ويسمى هذا الأسلوب "المعالجة المباشرة" Directive Management والذى يتعامل مع الأعراض مباشرة، ومواجهة السلوك الظاهر على أنه شكل من أشكال القلق الذي يعاني منه الطفل في البيئة المدرسية.

ويُفي بعض نماذج التعريض يكون التقرب نحو موضوع الخوف بطريقاً جداً وتدرجياً، ويسمى هذا التقرب "بازالتة التحسس" أو "خفض الحساسية المنظم Systematic Desensitization" نحو الشيء المخيف. وهناك أنواع أخرى من التعريض يتم من خلالها إقناع المريض لاحتواء مخاوفه بسرعة. وتسمى هذه الطريقة بتعوييم الخوف وإغراقه Flooding أو تسمى بالعلاج بالاستئارة الداخلية "Implasive Therapy".

لذلك سوف نتحدث عن هذه الفنون العلاجية السلووكية بشيء من التفصيل، من أجل إعطاء فكرة واضحة للأباء والمربيين يستطعون التعامل مع هذه المشكلات عندما تظهر لدى أطفالهم. وأهم هذه الفنون مايلي:

١) التحسين التدريجي Systematic Desensitization

استخدم "ولبي" هذا الأسلوب في علاج القلق والخوف لدى الأفراد الذين يعانون منه، ويتضمن هذا الأسلوب التعامل المباشر مع أعراض الخوف من خلال العمل على خفض حدتها بشكل تدريجي. وثمة افتراض أساسى من وجهة نظر ولبي يمكن وراء هذا الإجراء مفاده: إن الاستجابة للموقف الذي يتم تخيله تشبه الاستجابة للموقف الواقعى، ولتحقيق ذلك ابتدع ولبي فنية إحلال استجابة الاسترخاء محل استجابة القلق، وذلك من خلال المزاجة بين الاسترخاء العضلى ومدرج القلق Anxiety Hierachy الذي يتضمن مشاهد وموضوعات معينة تحدث استجابات القلق غير المناسبة لدى الشخص المريض، ومدرج القلق كما يحدده "ولبي" هو قائمة لمواقف التي يستجيب لها المريض بكميات متدرجة من القلق؛ فالموقف الأكثر إزعاجاً يوضع في رأس القائمة، بينما الموقف الأقل إزعاجاً يوضع في نهايتها. وبكلمات ولبي نظريته على النحو التالي: إذا كان التلاطف مثير يتكون من خمسة عناصر متكاملة التأثير هي (١-٢١-٣١-٤١-٥١) ومثير (٥٠) وحدة من استجابة القلق لدى المريض، فإننا سوف نجد بشكل تناسبي أن قلقاً أقل سوف يتم ابتعاده بائنلاف يتكون من عناصر أقل، فالاسترخاء الذي لا يكون كافياً للتغلب على الخمسين وحدة من القلق التي تتبعها (١١-٢١-٣١-٤١) يمكن أن يكون قادرًا تماماً على كف الوحدات العشرة التي يبتاعتها (١١) بمفرده. فإذا ماتم بشكل متكرر. كف القلق الذي تبتاعته (١١) وذلك بمناقضته للاسترخاء، فإن شدته سوف تهبط في نهاية الأمر إلى الصفر. ونتيجة لذلك فإن تقديم (١١-٢١) سوف يبتاعث الآن إلى (١٠) وحدات من القلق بدلاً من (٢٠) وحدة، و (٢١) هذه سوف تتعرض بدورها للكف التشرطي عندما تتم معاكستها للاسترخاء، وبالمضي في هذا الطريق، فإن الاختلاف كله (١١-٢١) سوف يفقد قدرته على توليد قلق.

هذا، ويمكن أن تلخص المراحل التي يقطعها هذا الأسلوب بما يلي:

أولاً: يقيم المعالج ترتيباً متدرجاً للمواقف المخيفة التي يعاني منها الطفل في المدرسة بدءاً من المواقف الأشد توليداً للخوف، تزولاً بالتدريج عبر المواقف الأقل فالأقل توليداً للخوف أو القلق. ويطلب المعالج من المريض، وهو في حالة استرخاء أن يتخيّل أولاً: المثيرات ذات التأثير الضعيف ويكرّرها المريض في خياله وذلك بالاستعانة بتوجيهات المعالج النفسي حتى يفقد القدرة على استشارة القلق والخوف وأن ترتبط باستجابات الاسترخاء والهدوء النفسي. وعندما يصل إلى هذه الدرجة يمكنني الانتقال إلى المثيرات التي تليها... وهكذا حتى ينهي المريض المثيرات أو الموقف جميعها دون قلق أو خوف.

ثانياً: تدريب المريض أثناء مواجهته أي موقف من المواقف المثيرة للقلق على الاسترخاء بهدف تقليل الحساسية نحو المثير المقلق.

ثالثاً: الربط المتكرر بين عملية الاسترخاء واستدعاء المثيرات التي تؤدي إلى القلق حتى يتم التخلص تدريجياً من القلق، ويرى "ولبي" انتخيل المثيرات الباعثة على القلق أو الخوف لا يقل أهمية عن مواجهتها بشكل مباشر فتقليل الحساسية يبدأ في المعالجة بالتخيل. وفي نهاية العلاج يتطلب من المتعامل مواجهة المثيرات والأحداث بالواقع، وهذا ما يسمى "باتواجهة العلاجية المباشرة أو بالمشاركة الفاعلة" Active participation وفي هذه الحالة ينتقل المريض إلى الموقف التالي من هرم القلق بعد مروره بال موقف السابق بنجاح.

وقد وصف تشابل (1967) كيف أن خفض الحساسية المنظم (في الخيال) تم تطبيقه أيضاً على حالة كان قلق الانفصال هو السمة الرئيسة فيها، وتم إنجاز التدريبات للسترخاء في كل مرحلة من بناء المدرج الهرمي للقلق من خلال التنويم المغنطيسي، حيث تم علاجه بالمشفى عن طريق جلسات التنويم المغنطيسي لمدة (30) دقيقة يومياً، وبعد أسبوع أصبح الطفل أكثر ارتيحاً للعلاج داخل

المشفى، فقد تم البدء بعلاج مخاوف الانفصال لدى الطفل عن طريق تعريضه لشكل متدرج لمثيرات مقلقة بالبعد عن المنزل والسفر إلى المدرسة ووصوله إلى المنزل ليجد والديه غير موجودين في المنزل استمرت جلسات العلاج (18) جلسة، تتراوح مدة كل منها من (20 – 30) دقيقة خلال فترة (6) أسابيع، حيث مكنت الطفل من العودة إلى المدرسة على الرغم من أن فترة العلاج الخارجي استمرت حتى نهاية السنة الدراسية، ولقد تكررت أعراض الخوف المرضي من المدرسة عند الطفل، وذلك بسبب تغيير الصيف في بداية العام الجديد، وبعد ذلك داوم الطفل في المدرسة بسهولة بعد (15) جلسة أخرى للنيل على المشكلة. وتشير هذه الدراسة إلى ضرورة توخي الحذر بعد فترة العطلة وخاصة إذا تم تغيير الصيف، وهذا الأسلوب الذي استخدمه تشابيل ليس واضح المعالم، رغم أن الدراسة ركزت على جانب خفض الحساسية، فمن المحتمل أن الإفاضة لعبت دوراً هاماً، وذلك عندما أجبر الطفل على البقاء في المدرسة خلال اليوم.

وهناك دراسة أكثر حداً ثانية قام بها "كريوجان" (1981) على طفل يبلغ من العمر (17) سنة، كان يعاني من الخوف المرضي من المدرسة لمدة خمس سنوات باستخدام أسلوب خفض الحساسية المنظم (في الخيال)، فقد تم معالجة المراهق في البداية عن طريق خفض الحساسية تجاه القلق الشائع، وقضايا أخرى مثل التحضر والاستعداد للذهاب إلى المدرسة في كل صباح، وبعد ذلك اكتفى كريوجان بأن الطفل مازال يضم ذكريات مؤلمة بشأن تقصيره في مساعدة طفلين قبل خمس سنوات، وكان المراهق يرفض أن يحارب هذه المشاعر المؤلمة. وفي ضوء هذا تم خفض حساسية الطفل تجاه هذا الحادث من خلال جلسات علاجية مؤلفة من (12) جلسة، وجنباً إلى جنب مع جلسات خفض الحساسية قدمت مساعدة الطفل على إعادة بناء الحادثة والنظر إلى الاستجابة التي قام بها كنوع من الاستجابة العقلانية والذكية، وقد استفاد هذا المراهق من البرنامج العلاجي وذلك بعد سنة كاملة من المتابعة.

ويلاحظ من هذه الدراسة أنكروجان طرح نقطة تشخيصية هامة فيما يتعلق بالخوف المرضي من المدرسة وهي: أنه يجب دائمًا البحث عن الحوادث التي تؤدي إلى حدوث الخوف لدى الطفل حتى ولو مرض وفت طويل على هذه الحوادث. وفي دراسة لاحقة تحدث ميلر (1972) أيضًا عن الاستخدام المشترك لخضن الحساسية المنظم في الواقع وفي الخيال وذلك من خلال معالجة طفل يبلغ من العمر العاشرة لديه مشكلات عديدة تتضمن قلق الانفصال والخوف من الموت والخوف المرضي من المدرسة ومشكلات تتعلق بالنوم إضافةً إلى وجود سلس بولي لديه. وقد قدمت معالجة هذا الطفل عن طريق هرمونات متعددة صممت للتعامل مع أعراض مرضية متنوعة مثل التدريب على الاسترخاء العضلي الذي تم تعزيزه عن طريق تدعيم الاستجابات الملائمة وذلك باستعمال الحلوى والتدبيح الكلامي. كما تم استخدام الصور المتخيلة لخضن حساسية الطفل تجاه خبرات الانفصال وتهيئته للعودة إلى المدرسة، واستخدام التشجيع لمعالجة مشكلات النوم الناجمة عن مخاوف الموت وذلك من خلال الاتصال هاتفياً بالمعالج عند الضرورة، وبذلك يحدث الاسترخاء العضلي نتيجةً للمكالمات الهاتفية. وكذلك استخدم أسلوب خضن الحساسية المنظم وفي الواقع من أجل مساعدة الطفل إلى المدرسة والاستمرار فيها لمدة يوم كامل، وأظهرت نتائج المتابعة لهذه الحالة بعد فترة من العلاج أن الطفل ما زال يداوم على الحضور إلى المدرسة بانتظام، إضافةً إلى ثبات تحسنه في الدرجات التي كان يحصل عليها في المدرسة، وزوال السلس البولي تدريجياً، ولم تظهر لدى الطفل أي مشكلات بعد ذلك.

هذا، وقد رسم "بيرت وهاري" (1978) Harvey&Bert خمس خطوات ضرورية لتطبيق فنية خضن الحساسية المنظم للطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة، وهذه الخطوات هي:

1. تعليم الطفل وتدريبه على فنية الاسترخاء العضلي.
2. إزالة كل مصادر التعزيز والدعم الثانوي من قبل الوالدين.

3. البدء في برنامج مع الطفل لإزالة الخوف والحساسية الزائدة من المواقف المدرسية غير المرغوب بها.
4. تعزيز الطفل والوالدين عندما يمضي الطفل أوقات متزايدة في المدرسة.
5. معالجة الطفل على أساس يوحى بفترة لا تزيد عن ستة أسابيع.

(27 – 19.58)

ويرى هاري في وبيرت أن هذا النوع من العلاج يعتبر فعالاً في معالجة هذا الأضطراب لدى هؤلاء الأطفال بشرط أن يتم بالتعاون بين المعالج النفسي المتمرّس والوالدين.

وذكر لازاروس (Lazarus 1960) حالة طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات ونصف تعاني الخوف المرضي من المدرسة، بالإضافة إلى مجموعة أعراض مصاحبة لهذا الخوف وهي: ألام في المعدة، سكريبيس ليالية، تبول لا إرادي. وقد تولد لديها الخوف من المدرسة فجأة بعد أن كانت متكيضة بصورة جيدة مع الجو المدرسي، والمواظبة على النهاب إلى المدرسة باستمرار، وذلك من خلال مرورها بخبرات مؤلمة عديدة: مشاهدة زميل لها يغرق في الماء، موت زميل آخر في حادث سيارة، أو رؤية حادث سيارة وموت صاحفها على أثر ذلك. وقد شخص المعالج مشكلة الطفلة على أنها خوف من فقدان أمها. وبناءً على هذا التشخيص تم وضع درج هرمي لقلق انفصالي الطفلة مكون من سبع نقاط، وتم تدريب الطفلة على تخيل كل نقطة من النقاط السبعة وهي في حالة استرخاء. وأظهرت النتائج أن الطفلة بعد عشرة أيام من التدريب على هنية التحسين التدريجي لإزالة خبرات قلق الانفصالي لديها، بدت عليها ملامح التحسن، وأصبحت مواظبة في النهاب إلى المدرسة بشكل منتظم، وزالت الأمراض المصاحبة لهذا الخوف مثل: التبول الليلي، والأحلام والكريبيس المزعجة. والألم المعدة. وبعد خمسة عشر شهراً من متابعة الحالة ثبت تحسن الطفلة واستمرارها في النهاب إلى المدرسة.


(62, 30)

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

ورغم أن هذا النوع من العلاج كان فعالاً في معالجة الطفلة إلا لازروس لم يذكر شكل حضور الطفلة إلى المدرسة، مستوى التحصيل الدراسي، والتواافق النفسي الاجتماعي في البيئة المدرسية، كما أنه لم يذكر في التقرير دور العاملين في المدرسة (المعلمين) في عملية العلاج النفسي لهذه الطفلة. كذلك استخدام كل من جاري وهيرنر (1966) Garvey Hegrens فنية التحصين التدريجي المنظم في علاج حالة طفل يدعى جيمي Jimmy يبلغ من العمر عشرة سنوات يعاني الخوف المرضي من المدرسة، وقد هشل في السابق في الاستجابة للعلاج النفسي التقليدي Traditional Psychotherapy لمدة ستة شهور. وكان هذا الطفل حساساً مع درجة عالية من الطموح Aspiration وقد ظهر لديها الخوف من المدرسة مع أعراض مصاحبة له تتعلق بتجنب الزملاء والأقران. وقد سار العلاج في مرحلتين: أولهما: بناء مدرج هرمي للقلق الذي يعاني منه الطفل في المدرسة، مكون من اثنين عشر خطوة، ثانيةهما: إزالة حساسية الطفل في وجود المعالج. وقد استغرق هذا ما بين (10 إلى 20) جلسة بواقع (0.3) دقيقة تقريباً كل جلسة. وبعد أن مر الطفل بتسعة عشرة جلسة أصبح بمقدوره دخول المدرسة والبقاء في الصف الدراسي مع المدرس وأثنين آخرين من الأطفال قبل البداية الرسمية للدؤام المدرسي ..

ويمكن القول هنا: إن العلاج قد حل محل الأب، ويسرعة أصبح الطفل قادرًا على البقاء في غرفة الصيف في وجود جميع أقارنه وزملائه. وينظر الباحثان جاري وهيرنر إلى العلاقة العلاجية والإطراء النفطي من العلاج مكاناً بمثابة وسيطتين كافيةتين ل剋ف استجابة القلق لدى الطفل ولم تظهر خلال سنتين من المتابعة آية أعراض مرضية مرتبطة بالخوف من المدرسة. ورغم أن الباحثين صوروا علاج هذا الصبي على أنه مثال للتحصين التدريجي المنظم في الواقع Systematic Desensitisation in vivo إلا أن هناك عناصر قد تتناقض مع مثل هذا التصور فالطفل لم يتلق تدريجياً على الاسترخاء رغم أنه كان بمقدوره أن يعود بسيارة المدرسة (كمكان آمن) فهو مزوره بخبرة القلق.

ويمكن أن نضع ملخص تخطيطي للخطوات التي يمر بها أسلوب التحصين التدريجي مع الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة بما يلي:



المرحلة الأولى: تحديد المثيرات الباعثة على القلق:

عند بناء مدرج هرمي للقلق لدى الطفل الذي يعاني الخوف من المدرسة، قد تكون المواقف المخيفة أو المقلقة لدى هذا الطفل هي:

1. ملاحظات جارحة من المعلم.
2. ملاحظات جارحة من الزملاء في الصف.
3. التحدث مع الجماعة.

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

4. الخوف من الزحام في المدرسة.
5. الخوف من حدوث مكرر في المدرسة.
6. الخوف من دخول الصف.
7. الخوف من الامتحانات.
8. الخوف من فقدان الأم عندما يكون في المدرسة.

المراحلة الثانية: وهي أن يقوم الطفل مع المرشد بترتيب المثيرات أو المواقف الباعثة على القلق أو الخوف لدى الطفل؛

بحيث يبدأ بال موقف الأقل خوفاً وقلقاً وينتهي بالمثيرات المخيفة أو المقلقة.

المراحلة الثالثة: تدريب الطفل على فنية الاسترخاء العضلي؛

ويتبغي علينا في هذا المجال أن نؤكد نقطة مهمة وهي على أن القائم بعملية العلاج والمتبني فننية التحصين التدريجي المنظم، أن يأخذ باعتباره مجموعة من النقاط عند تطبيق هذه الفننية مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات انفعالية مختلفة مثل القلق والخوف، وهذه النقاط هي:

- أن يكون المعالج (طفل، شاب، راشداً) قد تدرب جيداً على فنية الاسترخاء العضلي.
- أن يكون المعالج قد تم تحديد جميع المثيرات الباعثة على القلق لديه من ذلك الموقف سواء أكان في المدرسة أم في المنزل.
- أن يقوم المعالج بمساعدة المعالج بترتيب سلسل المثيرات المخيفة أو المقلقة عنده بدءاً من المثيرات الأقل إثارة للقلق أو الخوف إلى المثيرات الأكثر إثارة.
- أن يقوم المعالج في البداية بالمثيرات الأقل إثارة للقلق كما تم تحديدها لديه في هرم القلق، وأن يقوم بتخيل الموقف الباعث على القلق وهو في حالة استرخاء تام، وعندما يطمئن المعالج والمعالج بأنهما استطاعا تجاوز هذا الموقف دون أي قلق فيتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهكذا ... ولكن يجب أخذ الحذر بعدم

- الانتقال إلى الخطوة التالية إلا بعد إنجاز الخطوة نفسها والتي بقصد التدريب عليها.
- ينبغي على المعالج أن يقوم بتعزيز المتعامل عندما ينتقل إلى موقف الآخر بنجاح، وهذا يدل على أن المتعامل قد استطاع بمساعدة المعالج محو حالة الخوف أو القلق من الموقف أو المثير الذي استثار القلق.
 - ينبغي متابعة حالة المتعامل بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الإرشادي أو العلاجي المخصص له بهدف التحقق من أن هذا البرنامج كان له أثر طيب.

تقييم فنية التحسين التدريجي:

ما يؤخذ على هذه الفنية السلوكية في العلاج أنها اخفلت قاعدة هامة من قواعد الطريقة التجريبية، وهي قاعدة ضبط المتغيرات بحيث يمكن بمقتضاهما التمييز بين المتغيرات المستقلة (التجريبية) والمتغيرات التابعية وبين المتغيرات التي يتم تثبيتها والمتغيرات الوسيطة فهي لم تلتزم بهذه القاعدة. وهذه الفنية تمثل انتلاؤها من الاسترخاء ومن المدرج الهرمي للقلق أو الخوف . كمتغير مستقل . والتي ترجع التحسن الذي سيطرأ على المتعامل . كمتغيرتابع . إلى هذا المتغير المستقل فقط . وبالرجوع إلى وقائع الجلسات العلاجية القائمة على هذه الفنية يلاحظ استخدام فئات أخرى مساعدة لهذه الفنية مثل التنويم المغناطيسي ، أو الإيحاء ، وفنية المقابلات الشخصية وما ينجم عن ذلك بالضرورة ، من قيام علاقات طرحية بين المعالج والمتعامل .

وهكذا يتضح لنا أنه من المستحيل أن تنساب المكافآت العلاجية التي يمكن أن تتحقق باستخدام هذه الفنية لفترة وحدها دون غيرها .

- يمكن استخدام هذه الفنية العلاجية فقط عند التصدي للمشكلات الانفعالية المتوسطة في الشدة، أما إذا كانت المشكلات الانفعالية على درجة كبيرة من الشدة، فإن الباحثين يوصون باستخدام إجراءات تعديل السلوك الإجرائي

العلاج النفسي لمخوف الأطفال من المدرسة

وليس الإشراف الكلاسيكي التقليدي والتي منها فنية التحصين التدريجي المنظم.

• والنقطة الأخيرة المتعلقة بفقد هذا الأسلوب العلاجي هي آلية العمل، حيث أن هذه الآلية في نظر "ولبي" هي التشريع المضاد أو الكف بالتفاوض يمكن أن تكون الآلية الوحيدة (استبدال استجابة القلق باستجابة الاسترخاء) غير أن هذه الفنية تقوم على آليات عدة وليس على آلية أو ميكانيزم واحد أهمها:

1. طريقة الاسترخاء.
2. تأثير التعمود على الرؤية المتكررة لنفس مثيرات الخوف.
3. تأثير التشريع المضاد وذلك بالتزامن بين الاسترخاء وبين تقديم مثيرات الخوف، الإيحاء.
4. وتوقع التحسن والمتغيرات المعرفية الأخرى.

(132,16)

الانتقادات:

إضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض الانتقادات الموجهة إلى طريقة الخفض المنظم للحساسية التي تستخدم المشاهد المتخيلة تذكر منها:

1. إن هذه الطريقة أو الأسلوب العلاجي يقلل بشكل واضح دور الأبوين والمدرسة في علاج الخوف المرضي من المدرسة عند الطفل، وتضع مسؤولية النجاح في أيدي المعالج فقط.
2. عملية العلاج بهذا الأسلوب قد تكون طويلة.
3. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الحساسية (في الخيال) لا يمكن استخدامه لأن بعض الأطفال قد يكون لديهم ضعف في التصورخيالي كما يقول "لازاروس" (1960)، لذلك يجب أن تستخدم مواقف من الحياة الواقعية بدلاً عنه في هذه الحالة.

4. انه من الصعب ايجاد اي سلوك يكون مبطئاً للقلق وفي نفس الوقت سهل السيطرة على هذا السلوك من قبل الطفل عندما يطلب المعالج منه ذلك.
5. بعض الأطفال لا يبدوا أنهم يعانون من القلق حكاستجابة لثير متخيل، بينما اطفال آخرون لا يتعلمون بسهولة تقنيات الاسترخاء.

الإيجابيات:

أظهرت الدراسات العديدة التي استخدمت هذا الأسلوب في علاج الخوف المرضي من المدرسة فاعليته في علاج هذا الاضطراب مثل: دراسة لازاروس (1960) ودراسة باترسون (1965) ودراسة تسامبل (1967) ودراسة ميلر (1972) ودراسة كروجان (1981) ودراسة سيد سليمان (1988).

وقد عمل ولبي الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا الأسلوب من العلاج بالقول: "إن هذه الطريقة هي أعظم ما تكون بشكل دقيق مساعدة للطريقة التجريبية"، كما أثبتت هذا الأسلوب فاعليته في التصدي للكثير من المشكلات الانفعالية مثل: الخوف من المدرسة أو قلق الامتحان أو مشكلات النوم، الاضطرابات الجنسية أو الإدمان على المخدرات... .

(2) العلاج بالإضافة أو التفجير الداخلي:

يعد هذا الشكل من العلاج تقنية من تقنيات العلاج السلوكي التقليدي، والذي يعتبر اسلوباً فعالاً في معالجة المخاوف المرضية من المدرسة. وهذه التقنية تم بناؤها على أساس الاشتراط الكلاسيكي classical conditionation كما أنها نالت شعبية واسعة لدى المشتغلين في مجال الاضطرابات الانفعالية كالقلق والخوف. ويقوم هذا النوع من العلاج على تقديم بعض المناظر المتخيلة للطفل الذي يعاني الخوف أو القلق بصورة متدرجة بدءاً من المثيرات ذات التأثير الكبير والتي تؤدي إلى استثارة ودود فعل القلق القوية لدى الطفل، بمعنى آخر مواجهة الطفل مواجهة مباشرة وفورية بال موقف المخيف لدرجة عالية من الشدة دون مقدمات، ويترك حتى

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

تبدأ درجة القلق أو الخوف نحو هذه المواقف المثيرة بالتناقص تدريجياً، والهدف من هذه التقنية هو تعريض الطفل أو الفرد لقدر كبير من القلق أو الخوف، في الوقت الذي يخلو فيه الموقف من أي خطر موضوعي، فضلاً عن استجابات القلق التي لا تجد تعزيزاً، يمكن افتؤدي إلى انطفائها تدريجياً، ويرى أصحاب هذا التوجه في العلاج أن استجابات القلق غير السوية التي يعاني منها الطفل ما هي إنتاج للإشارات الكلاسيكي الصدمي، والتي أدى إلى هذه الصدمة الانفعالية، فإن تقديم المثير الشرطي المكتفي في ظل غياب المثير الطبيعي يؤدي إلى إطفاء هذا الدور للمثير الشرطي في إثارة القلق أو الخوف، فالطفل الذي يخاف من المدرسة على سبيل المثال يتطلب منه المعالج الذي يتبع هذا الأسلوب أن يتخيّل نفسه في أشد المواقف المقلقة له وهي على سبيل المثال: موقف الذهاب إلى المدرسة، الجلوس في غرفة الصد، الوقوف أمام التلاميذ للإجابة على سؤال طرحة المعلم، وعند ذلك يبدأ الطفل بتخيّل موقف الذي يثير الخوف والقلق لديه بشكل متكرر دون أن يرتبط ذلك بحضور الطفل فعلياً لهذا الموقف، ومع استمرار جلسات العلاج هذه فإنه سوف تنتهي استجابة الطفل من المثيرات المسببة للقلق لديه، وقد استخدم سميث وشارب (Smith and sharpe 1970) هذا الأسلوب في علاج طفل يدعى "بيلي" billy كان يعاني الخوف من المدرسة لمدة سبعة أسابيع قبل أن يبدأ بالعلاج، فقد كان تفكير بيلي في الذهاب إلى المدرسة متبايناً، مرتعشاً باكياً، إذ كان يشتكي من متابعته في صدره وليس لديه شهية للم الطعام، وقبل انتقال بيلي إلى المدرسة الجديدة كان أداؤه الأكاديمي جيداً إلا أنه بدأ يتخفّض فيما بعد بشكل واضح، وذلك بعد أن انتقل إلى المدرسة أخرى، وهذا الأمر دفع أسرته لتقضي أسباب هذه المشكلة عند بيلي والسعى إلى حلها، كان بيلي بعد خمس أو ست جلسات علاجية باستخدام فنية الإفاضة مواظباً على الحضور إلى المدرسة بشكل منظم، وانتهى العلاج عند حدود الجلسات الست، وبعد (13) أسبوعاً من انتهاء جلسات العلاج بالإفاضة صرخ بيلي أنه كان يحضر إلى المدرسة بانتظام دون قلق، وأكمل ووالداته ومدرسوه بأنه كان سعيداً، وتحسن علاقاته مع أقرانه بشكل ملحوظ.

وتوضح هذه الحالة أنه ليس العلاج بالإفراضة وحده يساعد الطفل نفسه على التخلص من الخوف من المدرسة، ولكننه يؤكد على دور الوالدين في تمهيد الطريق لتفعيل السلوك عند الطفل.

ويمكن أن تلخص هذا الأسلوب العلاجي بما يلي:

يطلب من الطفل في بداية الأمر أن يسجل في قائمة المواقف التي تشير إلى الخوف لديه بصورة متدرجة بدءاً من أشدّها وانتهاءً بأقلّها شدة، ومن ثم الاسترخاء، وتصور نفسه وهو يقترب من الموقف المخيف تقريراً بطيئاً لمدة ثوان شريطة البقاء في وضعية الاسترخاء وعدم الإثارة، ومن ثم جعل الطفل يتخيّل مسارات ومواقف سارة حتى يعود إلى هدوئه، وبعدها ينتقل إلى مواقف مخيفة أكثر شدة يكرر السلوك التقريري الذي مارسه في المواقف السابقة.

(3) التصور الانفعالي Emotive Imagery

استخدم المعالجين السلوكيين فنية أخرى للتصدي للمشكلات الانفعالية التي يعاني منها المتعالجون (المرضى) الاوهى فنية التصور الانفعالي Emotive imagery وهي عبارة عن أسلوب تبادلي فعال يستخدم مع فنية التحسين التدريجي المنظم بمساعدة تدريبات الاسترخاء، والهدف من هذه الفنية هي: مساعدة المتعالج على تخيل أو تصوير المواقف التي تثير الخوف والقلق لديه بهدف تثبيط انفعال القلق أو الخوف. فقد عالج "لازاروس وأبراموينز" (1962) Lazarus and Abromawitz طفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات كانت تعاني بالإضافة إلى الخوف من المدرسة التبول اللاإرادي Enuresis حيث استخدم معها الباحثان الصور التي تثير بعض الانفعالات المتعلقة بمخاوفها في الموقف المدرسي، وذلك من خلال قراءة قصة تتناول خوف طفلة من الذهاب إلى المدرسة، حيث طلب منها أن تساعد الطفلة على التخلص من خوفها تجاه المدرسة. وبعد نهاية العلاج عادت الطفلة إلى المدرسة واستمرت في المواجهة إلى الحضور إليها بانتظام، كما أن التبول اللاإرادي

لديها قد انتهت بعد شهرين من العلاج، وفي فترة المتابعة لاحظ الباحثان أن الطفلة قد تخلصت من خوفها ومن التبول، كما تحسن تحصيلها الدراسي وعلاقتها الاجتماعية.

(465, 201)

كما عالج "فان ديريلويجافو Van der ploegavo" حالة مراهق يبلغ من العمر (14) سنة يعاني مخاوف مرضية من المدرسة بالإضافة إلى التبول الملايادي، حيث تم تدريب المراهق على الاسترخاء، ثم وجه وهو في حالة استرخاء إلى إشارة صور تشير لانفعالات عن تجارب إيجار قام بها المراهق ذات مرة، بالإضافة إلى مشيرات أخرى باعثة على القلق، وبعد (15) جلسة على مدى خمسة أسابيع طبق العلاج فنية "التحصين التدريجي المنظم في الواقع (IN VIVO) مصحوبة بزيادة مقادير الوقت المنقضي في المدرسة... وبعد ثمانية عشر شهراً من المتابعة بواقع مقابلة كل شهر، لم يكن هناك خوف من المدرسة لدى المراهق، ولم يكن هناك أيضا حاجة للتبول المتكرر، ولو نظرنا إلى هذه الفنية باعتبارها تقوم على دبر المصوّر المثير لانفعالات الإيجابية في الموقف التي تثير القلق أو الخوف إلا أنها تعد جزءاً لا يتجزأ في إجراءاتها من فنية التحصين التدريجي المنظم.

والطريقة التخيلية في العلاج تتالف من قيام المتعامل بتخييل المواقف المخيفة على نحو حي بقدر ما يمكن، وأن يخبر كل انفعالات التي تبعتها تلك التخيلات، ويكون هدف العلاج هو الإبقاء على قلق المريض عند مستوى عالٍ بقدر ما يمكن، ويتحقق ذلك بوصفه أكثر رعباً وبشكل مضطرب للمشاهد التي يتم تخيلها، بمعنى آخر إن هذا الأسلوب يتضمن المواجهة القوية للموقف الأكثر قلقاً وخوفاً للأطفال بدون أي تحضير مسبق للمواجهة عن طريق التعريض المتدرج للمثيرات المولدة للخوف أو القلق بدءاً من أقلها إثارة إلى أكثرها إثارة للقلق، حيث إبقاء الطفل في الموقف الأكثر إثارة حتى تظهر إشارات واضحة على انتهاء القلق، وبناء على الاتجاه الكلاسيكي في العلاج السلوكي فإذا شعر الطفل بالقلق

كنتيجة لإشراط سابق، فإن التقادم الجوهري للمثيرات الشرطية في أي مثير أساسى مضاد سيقود حتماً إلى زوال استجابة القلق أو الخوف وعادة ما تشير الإضافة إلى الطريقة الواقعية المباشرة في العلاج.

اما العلاج التفجيري فهو ينجز المواجهة في خيال الفرد مضخماً إلى حد كبير المخاوف الأسوأ بالنسبة له، لذلك فإن المواجهة المباشرة للمخاوف الأكثر شدة في الحياة الواقعية (الإضافة) أمر علاجي ضروري وملح للغاية، ويحتاج الآباء والمعلمون إلى كثير من الاقناع بأن المواجهة الإيجابية هي الطريقة المثلث. ومن نقطة ثانية هناك الكثير من القضايا العلاجية العملية تحتاج إلى التأمل فإذا تم إساءة التعامل مع الإضافة فإن هذا سينعكس سلباً على المعالج، وإلى زيادة القلق عند الطفل، ويؤدي أيضاً إلى عدم تعاون الآباء.

4) الفنون العلاجية القائمة على نموذج التعلم الإجرائي:

يعد هذا الأسلوب من الأساليب المهمة في العلاج السلوكي، وهو قائم على نظرية خاصة به يرى هذا الأسلوب في العلاج النفسي السلوكي أن هناك ارتباطاً بين قيام الفرد بسلوك معين (استجابة) وبين النتيجة التي يحصل عليها من هذه الاستجابة، فإن كانت النتيجة إيجابية، فإن من المتوقع تكرار هذه الاستجابة في نفس الظروف للحصول على نفس النتيجة، أما إذا كانت النتيجة سلبية فإنه من المتوقع تجنب القيام بهذه الاستجابة مستقبلاً في حال تكرار نفس الظروف، وذلك لتجنب النتيجة السلبية، والنتيجة التي تحصل عليها من جراء القيام باستجابة معينة يعتبر شرطاً فعالاً يحدد نوع سلوكنا في المستقبل تحت نفس الظروف. وأهم هذه الفنون ما يلي:



١) العلاج التواقي: Contingency Therapy

وهذا الأسلوب عبارة عن تعاقد بأن تقدم مكافأة على كل استجابة يتعاون فيها الطفل والمعالج بشرط أن يستجيب بشكل معين حتى يحصل على التعزيز Reinforcement. وقد أكد كل من "هيرسوف" (1970) Hersov و"باترسون" Paterson (1965) على أن ينصب التعزيز على السلوك المناسب لمقتضيات الموقف الذي يتضاعل فيه الطفل مع بيئته بهدف إنجاز أمراً، وأن يتم عدم التعزيز للسلوك غير المناسب، وكان "هيرسوف" بعض الإجراءات لتحقيق ذلك وهي:

١. التعامل مع الوالدين الذين يعززون بطريقة غير مقصودة سلوكه تجنب المدرسة لدى الطفل، وأي سلوك آخر يتطلب علاجاً.
٢. التعامل مع المرشد النفسي، وذلك لأنه قد يوجد تعزيزاً غير مقصود للسلوك الذي يدل على خوف ورهبة من المدرسة.
٣. التعامل مع الطفل نفسه بأسلوب مدحه ومشجع ومساند.

(1982, 41)

٤. وإذا عدنا إلى الإجراءات السابقة بشيء من التفصيل لوجدنا أن:

الخطوة الأولى:

وفيها يتم التخطيط لتعديل سلوك الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة مع والديه الذين يقومان بتعزيز سلوك الطفل عندما يذهب إلى المدرسة، ويتضمن هذا التعاون مع والدي الطفل مaily:

١. أن يبقى الوالدان حازمين في قرارهما بشأن انتظام طفلهما في الشهاب إلى المدرسة، وغير معززين لأي سلوك يرتبط بخوف الطفل من المدرسة مثل: البكاء

- والصراخ أو أي شكوى يعبر عنها الطفل التي تتعلق ببعض المواقف، بالنسبة له .
في البيئة المدرسية.
- بـ. أن يقوم الوالدان بتعزيز أي سلوك يصدر عن الطفل الخائف من المدرسة بأنه على استعداد للذهاب إلى المدرسة في ذلك اليوم لوحده، أو أنه راغب بكتابية الواجبات المنزلية، أو أن يقول لوالديه أنه جاد اليوم في الذهاب إلى المدرسة لكنه يحتاج إلى علبة ألوان ...
- جـ. العمل على محو أو تثبيط أي نوع من السلوك يمكن أن يظهر كبديل للسلوك الأصلي غير المتفاوت. ويؤكد "هيرسن hersen" هنا على تزويد الوالدين ببعض المعلومات الضرورية عن أسلوب وكيفية استخدام مبادئ وفنون الإشارة الإجرائي وفق أسلوب مبسط وسهل، وذلك من أجل استيعابه وتطبيقه في الأوقات المناسبة مع الأطفال الذين يعانون مشكلات سلوكية مثل الخوف المرضي من المدرسة.

الخطوة الثانية:

وتعني أن يكون المعالج النفسي مستعداً للتواجد مع الطفل في المدرسة حين يشعر بحالة من الضيق والقلق أو عدم الارتياح، وإن يبقى مشجعاً ومدعماً له خلال هذه الحالة، كما ينبغي أن يكون المرشد حازماً في قراره بشأن عودة الطفل إلى المدرسة بأسرع وقت ممكن.

وفي دراسة قام بها "أيلون، سميث وروجرز" (1970) ayllon,smith ,and rogers اعتمدوا فيها على التعزيزات الإيجابية والسلبية لفتاة عمرها ثمان سنوات تعيش في مستوى اجتماعي . اقتصادي منخفض. أظهرت الطفلة . وهي في الصف الثاني الابتدائي عدم رغبتها في الذهاب إلى المدرسة وتزايد عدد أيام غيابها عنها، حتى امتنعت نهائياً عن الذهاب إلى المدرسة طوال العام الدراسي الثالث، حاولت الأم أخذها إلى المدرسة، لكن العائلة أصبحت بصفتها انفعالية عنيفة وبعض الأعراض المرضية، فأخذتها أمها بعد ذلك إلى المستشفى، وهناك تم علاجها عن طريق

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

إعطائهما بعض الأدوية المهدئة في بداية الأمر لتسكين حالتها. وقد تم تشخيص الحالة من قبل إدارة مشفى طب الأطفال على أنها حالة خوف مرضي من المدرسة. وقد قام الباحثون بوضع جدول لرصد سلوكيها، وبرنامج من التعزيزات الإيجابية وبعض التعزيزات السلبية، وكان ذلك في جدول زمني مدته (45) يوماً، ثم قام الباحثون بدراسة تتبعية بعد (6) شهور ثم بعد (9) شهور. وقد تضمنت هذه الدراسة تقويم سلوك الطفلة من ناحية التحصيل الدراسي، والتواافق داخل المنزل، حيث استخدم الباحثون العقاب لتجنب المدرسة كتعزيزات سلبية، وبعض قطع الحلوى، والمعاملة الخاصة من جانب الوالدين والباحثين. وبالتدريج بدأت الطفلة بالتحسن، وأصبحت توازن في المدرسة باستمرار، حيث حصلت على نتائج جيدة في الدراسة، في حين كان معدلها الدراسي في السابق في حدود المتوسط. وقد انتهت الدراسة إلى نتيجة هامة مفادها أن استخدام تحليل السلوك وفنون العلاج السلوكي ثم إزالة أعراض (التغيب عن المدرسة) هو الحل الوحيد معروفة مدى نجاح هذا النوع من العلاج.

(2850 – 274,99)

كذلك أشار "ميشيل وهيرسن" Michael and Herson (1981) في دراستهما التي تحمل عنوان (ممارسة فنون العلاج السلوكي في علاج المخاوف المرورية من المدرسة). وقد تكونت عينة الدراسة من عدد من الحالات الفردية التي تم إخضاعها لعدم من فنون العلاج السلوكي مثل: التحسين التدريجي، التفجير الداخلي، التشريط الإجرائي، وسوف ترکز فقط على عرض نتائج فنية التشريح الإجرائي التي استخدمت في علاج طفل يبلغ من العمر عشرة سنوات يعاني من الخوف المرضي من المدرسة لمدة ستة أسابيع، مدة الجلسة عشرين دقيقة، وكانت مدة المتابعة لهذه الحالة عامين كاملين. أظهرت النتائج زوال أعراض الخوف المرضي من المدرسة تماماً لدى الطفل).

الخطوة الثالثة:

تتضمن هذه الخطوة التي تقوم بين المعالج والمعلم الذي يخاف من المدرسة ما يلي:

- أ. ان يقوم المعالج النفسي بتعزيز أي سلوك يصدر عن الطفل بالاتجاه المطلوب (الذهاب إلى المدرسة) سواء أكان سلوكاً لفظياً أو سلوكاً إجرائياً.
- ب. يقوم المعالج بتثبيط أي سلوك غير سوي يصدر عن الطفل وذلك من خلال استخدام أساليب عدم التعزيز لهذه السلوك مثل: الصمت، تجاهل السلوك، تجاهه بقام الطفل ...
- ج. ان يستخدم المعالج مع الطفل أسلوب علاج شخص في مواجهة شخص آخر (العلاج الفردي One to One Therapy) كي يفرغ الطفل الشحنة الانفعالية ويطرد أية مشاعر عدوانية نحو أي تعديل في اتجاهه نحو المدرسة او المنزل او تجاه نفسه. وقد عالج "باترسون" (Patherson 1965) بنجاح حالة طفل في السابعة من عمره يشكو من مخاوف مرضية من المدرسة مصحوبة بعجز شديد عن انفصال عن والديه وخاصة الأم. وقام باترسون بنفسه بدور عامل التغيير الأولى والأساسي لسلوك الطفل، فقد استطاع أن يشكل سلوك الطفل مستخدماً في ذلك المدح والمعزّزات الرمزية وذلك في سعيه لتحقيق استقلال الصبي عن أمّه في غرفة الاستشارة النفسية. كما استخدم باترسون مع الطفل فنية اللعب بالدمى، والتي تتجانس مع الواقع المستمد من بيئته الطفل. وقد روعي فيها أن يكون تركيبها مساعدةً في تشكيل سلوك الطفل. وبعد مرور إحدى عشرة جلسة مكان بمقدوره دخول المدرسة وقضاء بضع دقائق في الصف الدراسي، ويمزيد من الجلسات زاد الوقت المنقضي في المدرسة تدريجياً إلى أن جاءت الجلسة الثالثة والعشرون، إذتمكن الطفل من المواضبة الكاملة على حضور المدرسة. وقد أظهرت نتائج المتابعة لهذه الحالة حضوراً مستمراً ومتواصلاً في الذهاب إلى المدرسة مع توافق نفسي اجتماعي طيب.

ب) فنية العلاج بالتشكيل Shaping Techniques

يعرف "دوجلاس" Douglas التشكيل على أنه أي تصرف أو تطور يطرأ على سلوك جديد عن طريق التعزيز لأي سلوك مشابه للسلوك المرغوب فيه، وتدرجياً يقدم تعزيزاً مناسباً ودقيقاً كلما حدث سلوك أكثر دقة أو مجموعة سلوكيات مقصودة، أو وحدة سلوك منضبطة مع الاستجابة الختامية فيكافئ عليهما الفرد، أما عن تحديد خطوات التشكيل أو التغيرات المتتابعة فيجب قبل البدء في برنامج التشكيل تحديد الإطار الخارجي للتقارب المتابع من خلال حركة الفرد في محاولته لتحقيق السلوك النهائي، فعلى سبيل المثال لوافترضنا أن الهدف النهائي لبرنامج علاجي هو عودة الطفل الخائف من المدرسة بالرجوع إليها، فإن على المعالج أن يحدد ما يلي:

1. الهدف النهائي من عملية التعلم.
2. استخدام التعزيز الإيجابي لتغيير السلوك غير المرغوب به.
3. تقديم التعزيز أو التدعيم مباشرة بعد نجاح الاستجابة المرغوبة.
4. تقديم التعزيز للشخص لكل استجابة صحيحة تقريره من تحقيق الهدف النهائي. ففي حالة الخوف المرضي من المدرسة يمكن مثلاً استخدام هذه الفنية كما يلي:

- اللعب خارج المنزل: إذا قام الطفل به مع أسرته فإنه يحصل على تعزيز إذا قام به الطفل لوحده يحصل على تعزيز..
- كتابة الواجبات المدرسية: إذا قام بها الطفل بالتعاون مع أحد أفراد أسرته يحصل على تعزيز. إذا قام بها الطفل لوحده يحصل على تعزيز.
- الاستيقاظ صباحاً: إذا صحي الطفل بمساعدة أهله يحصل على تعزيز إذا صحي بنفسه يحصل على تعزيز.

• الذهاب إلى المدرسة:

- إذا ذهب الطفل إلى المدرسة برفقة أحد أفراد أسرته يحصل على تعزيز.
- إذا ذهب إلى المدرسة بمفرده يحصل على تعزيز.

• المواظبة:

- إذا حضر الطفل آخر حصة برفقة أحد أفراد أسرته يحصل على تعزيز.
- إذا حضر آخر حصة لوحده يحصل على تعزيز.
- إذا حضر آخر حصتين يحصل على تعزيز.
- إذا حضر ثلاثة حصص يحصل على تعزيز.
- إذا حضر أربعة حصص في اليوم برفقة أحد أفراد أسرته يحصل على تعزيز.
- إذا حضر أربعة حصص لوحده يحصل على تعزيز.
- إذا حضر يوم دراسي كامل يحصل على تدعيم (تعزيز).

وفيما يلي عرض بعض الدراسات التي استخدمت فنية التشكيل أو التي تسمى أحياناً بفنية التقريرات المتتابعة. والمتبعة لهذه الدراسات يلاحظ أن بعضها يركز على دور أحد الوالدين أو كليهما في العملية العلاجية، وبعضها الآخر يركز على المدرس، وبعضها الثالث يركز على الاثنين معاً. وقد استخدم "دوليزي ولیامز Doleys & williams 1977" فنية التقريرات المتتابعة في علاج طفل يعاني الخوف المرضي من المدرسة وذلک بالاستعاة بالوالدين، حيث وضع نظام يقوم بمقتضاه العاملون في المدرسة باستدعاء الوالدين بعد أي سلوك فوضوي يقوم به الطفل، حينئذ يحضر الوالدان ويقومان بتنفيذ العقاب الذي هو عبارة عن وضع الطفل في غرفة صغيرة يستطيع أن يخرج منها فقط ليعود إلى الصف الدراسي. وكذلك أعيدت صياغة سلوك الوالدين غير المشروط في المنزل، وخلال ثلاثة أسابيع من بداية البرنامج بدأت المواظبة على الحضور إلى المدرسة بشكل كامل،

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

ويعد أربعة أشهر من المتابعة كان مواظف على الحضور إلى المدرسة بشكل جيد، كما كان أداءه الأكاديمي جيداً.

وفي دراسة أخرى استخدم بعض العاملين المهمين في المدرسة (مدبر المدرسة، المعلم، الأخصائي النفسي) كعوامل تغيير. فقد كتب هيرسن (Herson 1970) تقريراً أشار فيه إلى استخدام المرشد المدرسي في علاج طفل يبلغ من العمر (12) سنة وقد استدعت المعالجة وجود ثلاثة عناصر منفصلة ولكن بينها علاقة. وقد تم مقابلة الأم كعنصر أول على مدار ثلاثة عشر جلسة استشارة للقيام بالتعزيز المناسب، والقيام بإجراءات الانطواء ذات الصلة بالمواظبة الملائمة على الذهاب إلى المدرسة، وتناولت الجلسات الاستشارية كذلك السلوكيات المتعلقة بالمدرسة، وأيضاً تبريرات الطفل وبكاءه قبل مغادرته المنزل، كما كان هناك اتصال من جانب المعالج بالمرشد المدرسي كعنصر ثان، وكان الاتصال به من أجل دعم البرنامج العلاجي، المنصر الثالث: تمت مقابلة الطفل خلال خمس عشرة جلسة استشارة فردية في محاولة تزويد المعالج بفرصة لتعزيز أنماط السلوك المطلوبة ومحو أنماط السلوك النكوصية كالبكاء واللجوء إلى تبرير وإنتماس الأعتدارات خلال التجاهل وعدم والتعزيز. كذلك سمحت الجلسات للطفل بأن يعبر عن مشاهير العداء المتعلقة بتغيير الاتجاهات سواء في البيت أم في المدرسة. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن البرنامج العلاجي المتبع مع هذه الحالة بعناصره الثلاثة كان فعالاً في تخلص الطفل من السلوك غير المرغوب فيها خلال خمسة عشر أسبوعاً من العلاج، حيث بدأ الطفل في المواظبة للحضور إلى المدرسة بشكل منتظم، كذلك أشارت نتائج المتابعة التي استمرت لمدة ستة أشهر أن الطفل مازال مواظباً على الذهاب إلى المدرسة.

(74,62)



اما العوامل التي يمكن ان تؤثر في فاعلية التشكيل هي ممكن إجمالها بما يلي:

١. تحديد السلوك النهائي:

إن الخطوة الأولى في عملية تشكيل السلوك هي التحديد الواضح للسلوك النهائي حيث أن السلوك لا يتم إلا بمشاركة فريق العلاج ومساعدته للحالة على التدريب المستمر والتواءل مع توضيح كل خطوة من خطوات البرنامج العلاجي، كما يجب أن يكون كل فرد في فريق البرنامج العلاجي بما فيهم الحالة على وعي قائم بالدور الذي يلعبه داخل هذا البرنامج، بالإضافة إلى أهمية تقديم التعزيز في الوقت المناسب والمحدد لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية.

اما فيما يتعلق بكيفية صياغة السلوك النهائي فيجب ان تتم وفقاً للطريقة المميزة لصياغة السلوك وهي: التكرار . الشدة . الديمومة إلى جانب الظروف التي تنت فيها صياغة السلوك والإرشادات المختلفة وفقاً لظروف البرنامج العلاجي المصمم لذلك. ففي حالة الطفل المختلف من المدرسة فإن السلوك النهائي يتجلى في عودة الطفل إلى المدرسة في أسرع وقت ممكن وأنماطية المستمرة والتواءل على الحضور إليها، مع غياب أية سلوكيات أخرى تعيق ذهاب الطفل إلى المدرسة (كالبكاء، التعلق بالوالدين، الحرج التي يتقوه بها الطفل والتي تعبر عن عدم رغبته فيذهاب إلى المدرسة).

٢. تحديد نقطة بداية البرنامج:

من المؤكد أن بلوغ النهايات رهنًا بالبدايات، لذلك لابد من تحديد نقطة البداية للبرنامج العلاجي وصولاً إلى السلوك النهائي لأن تعزيز بعض السلوك هو الذي يؤدي إلى التقريب المتتابع لباقي السلوك، ولأنه ليس بكافي تعزيز السلوك خلال وقت الجلسة فقط ولكن يجب أن يتتابع التعزيز حتى بلوغ السلوك الختامي، كما يجب مناقشة كل فرضية لخطوات البرنامج حتى يمكن تقديم صياغة دقيقة وممحكة تحدد الخطوة الأولى أو التمهيدية وصولاً إلى الخطوة النهائية، إذ من

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

المعلوم أنه في برامج التشكيل لا تولي أهمية كبيرة لمكان حدوث هذا السلوك، لكن المهم هو مستوى الاتساق الذي سوف تتحقق به هذه الاستجابة في الوقت الحاضر، حيث أن غرض برنامج التشكيل تحقيق هدفين في آن واحد، هما:

- أ. تعزيز التقرير المتتابع من السلوك الأولى وحتى السلوك النهائي.
- ب. يجب أن يكون السلوك الأولى مشابها تماماً للسلوك النهائي.

3. تحديد خطوات التشكيل:

يجب قبل البدء في برنامج التشكيل تحديد الإطار الخارجي للتقرير المتتابع من خلال حركة الفرد في محاولته لتحقيق السلوك النهائي، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن الهدف النهائي لبرنامج هو عودة الطفل الخائف من المدرسة إليها، فإن البرنامج يحدد أن الطفل سوف يبدأ بالاستيقاظ صباحاً ويشكل نشيطاً ويحضر حقيبة متوجه إلى المدرسة بمفرده، فتكون هذه الخطوة الاستجابة التمهيدية الأولى للبرنامج لأنها من المفترض أن النهاية المدرسة سيمربعد من الإجراءات مثل: الاستيقاظ باكراً، ارتداء ملابس المدرسة، حمل الحقيبة، التوجه إلى موقف باص المدرسة أو التوجه توجده إلى المدرسة أو بصحبة أقرانه، كما أن الطفل أثناء هذه المحاولات يتلقى التعزيز عن كل خطوة أو إجراء يقوم به، وتستمر التعزيزات لعدد من المحاولات حتى يستمر الطفل في تتبع ناجح للخطوات لإحداث السلوك النهائي أولاً هو الذهاب إلى المدرسة دون خوف أو قلق، وعند هذه النقطة هناك أسئلة تطرح نفسها مثل:

1. ما مدى معقولية حجم الخطوة في البرنامج؟
2. ما عدد المحاولات التي يجب تعزيزها لكل خطوة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية لها؟



للإجابة على السؤال الأول: فإنه من غير المعقول وضع إطار عريض لتحديد الحجم المثالي للخطوة دون الأخذ بعين الاعتبار تحديد السلوك الأولي والسلوك النهائي. وبناء عليه شالمالج يحدد معموقية حجم الخطوة للمبني قدماً إلى الأمام.

اما بالنسبة للسؤال الثاني فإن عدد المحاولات المعاززة لكل خطوة يتختلف من ملاحظة الطفل أثناء الممارسة الفعلية للبرنامج من خلال: ملاحظة السلوك الأولي، تكرار المحاولات، مروره الممارسة والأداء، السرعة المطلوبة في الأداء... وهكذا

وعليه فالتحرك وفق الخطوات والإرشادات التي حددها برنامج العلاج يكون لها حكبير الأثر في تحقيق فاعلية البرنامج العلاجي في التصدي لحالة الخوف المرضي من المدرسة التي يعاني منها الطفل، أو لأية مشكلة سلوكية أخرى تحتاج إلى تعديل.

ويرى "ياندورا وزملاؤه" فيما يتعلق بفنية التشكيل، أن تشكيل الاستجابة يعدل بشكل تدريجي المسالك السائدة عن طريق تعزيز عناصر صغيرة من السلوك الجديد المرغوب فيه، ومن ثم يكون الاقتراب بشكل متتابع أو التقييدات المتتابعة .end behaviour Successive approximating من السلوك النهائي

وقد تم استخدام باترسون هذا الأسلوب بهدف تقديم خطوات متتالية على أن تكون كل خطوة أكبر من سابقتها من الانفصال عن الأم، وقد حاول باترسون أن يجعل الطفل يستشعر بالأمن في هذا النوع من السلوك، وإن يتقبله بالنسبة للدمية، ويحدث هذا في الوقت الذي كان فيه على الأم ان تتحرک أبعد قليلاً، وبصورة تدريجية، وذلك حتى تغادر غرفة اللعب وذلك في خطوات تدريجية كما هو الحال في موقف اللعب، وبعد انتصاء عدد من الجلسات العلاجية أصبح الطفل قادر على الانتظام بالمدرسة دون أن يصاحب ذلك أي نوع من القلق، كما أنه لم يعد يخشى الابتعاد عن أمه. وقد دلت متتابعة الطفل لمدة ثلاثة أشهر من انتهاء البرنامج العلاجي أن هناك تحسناً واضحاً ولموسياً في توافقه النفسي والاجتماعي العام،

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

كما أنه لم يجد أي دليل على خشيته أو خوفه من الابتعاد عن الأم أو وجوده في المدرسة.

وأخيراً يمكن القول: إنه من خلال الدراسات الميدانية التي أجريت للتأكد من فاعلية فنية التشكيل في علاج الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة، إن هذا الأسلوب قد أثبت فاعليته سواءً أكان الأسلوب الوحيد المستخدم مع الحالات أم بمشاركة إساليب وفنين علاجية أخرى كالتحصين التدريجي، أو الأسلوب التوقيفي، لذلك يوصي الكثير من الباحثين باستخدامه في مثل هذه الحالات وخاصة الأطفال صغار السن.

ج) العلاج القائم على التدريب على المهارات الاجتماعية:

يوجد لدى الكثير من الأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة مشكلات أساسية في التعامل مع الأقران والأساتذة على حد سواء، وغالباً ما يكشف التحليل السلوكي الدقيق لهؤلاء الأطفال عن عجز كبير في المهارات الاجتماعية. فقد أشار كينغ (1987) إلى ذلك بالقول: من المدهش أنه رغم الازدياد الكبير في الأبحاث التي تتحدث عن التدريب لتحسين المهارات الاجتماعية في علاج الخوف المرضي من المدرسة. وبعد "داوسن، ريزنر، يونيسي، ماتيسون" (1982) أول من قاموا بتعديل هذا الأمر من خلال وصف رائع لطفلة تبلغ الثانية عشرة من عمرها تعاني من الخوف المرضي من المدرسة وخوف زائد من الأطفال الذكور غير المأهولين. لقد عانت الطفلة من مشكلات جسدية متعددة، وقلة في التعامل مع أقرانها في واحدة العلاج النفسي بالمستشفى، حيث تضمن العلاج الانتباه لمجالات جديدة من ضمنها:

1. وضع الجسد وخاصة تصليب الجسد وقلة الحركة في الساق والأطراف.
2. المزاج العصبي المتقلب مثل: الضحك بسخرية أو تجهم الوجه، أو فيبرة الصوت العالية.

3. الاتصال العيني.
4. تصنع العواطف والمشاعر المناسبة في التعاملات الاجتماعية.
5. المحتوى الشفهي للرسائل والاستجابات.

أما الإجراءات العلاجية فكانت تسير على النحو التالي: حيث المعالج الطفلة للمشاركة في التدريب على أن تغير أو تعدل سلوكها بنفسها من خلال قيامها بتمثيل الأدوار العشرة التي اقترحها "باندورا" Bandura (1969) و"ماتيسون" Matison (1981) في كل جلسة من جلسات العلاج. وعادة ما يسبق لعب الدور نقاش عام لمدة خمس دقائق حول المخاوف المرضية للطفل، وكيف يمكن أن يساعد البرنامج التدريسي في علاجها، وبعد ذلك يشكل المعالج السلوكيات الملائمة قبل أن يطلب من الطفل تمثيل المشهد، ويتم تعزيز الطفل اجتماعياً للتقدم الذي يحرزه، مع تقديم نصيحة محددة حول المجالات التي تتطلب التحسين ومزيد من التعديل. ثم يعاد التدريب على المشهد بكامله، وبعد ذلك يتم تقديم المشهد الثاني، حيث يتبع العلاج نفس النمذج السابق وهكذا حتى يتم إنتهاء المشاهد العشرة كلها. وقد استمرت الجلسات العلاجية لمدة (24) جلسة علاجية، وبعد (7) أسابيع من انتهاء العلاج و(12) أسبوعاً من متابعة الحالة واظببت الطفلة على الحضور إلى المدرسة بشكل تام وكان أداوها جيداً، وكانت تتعامل بشكل طبيعي مع أقرانها، وتعامل بثقة أكبر من الآخرين. كما حدث في النهاية تعميم للمهارات الاجتماعية الأكثر إيجابية لدى الطفلة لتشمل مواقف الحياة اليومية خارج المدرسة.

(5) العلاج القائم على المزاجة بين تقنيات الإهراط الكلاسيكي والإهراط الإجرائي:

اتخذ هذا المنهج في العلاج كل من "لازاروس ودافيدسون وبوليفكا" Lazarus and polefka Davidson (1965) الذي يعتمد على العلاج التواافقي بين العلاج بالكاف التبادلي reciprocal inhibition والعلاج التوافقى congruent therapy وقد أعتبروا عن ثقتهم واعتمادهم على الأسلوب التواافقى أو

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

التجمعي . القائم على مزج فنون من الإشراط الكلاسيكي وفنون أخرى من الإشراط الإجرائي في العلاج، والذي يقوم على فرضية مؤداها أنه تما كانت مستويات القلق المرتفعة قثير سلوك التجنب وتؤدي إليه، فإنه ينبغي في هذه الحالة أن تستدعي الإشراط العكسي البسيط، وأنه عندما يكون القلق ضئيلاً فإن سلوك التجنب، فيما يبدو، يمكن دفعه باستخدام مجموعة متنوعة من المعززات الثانوية والتي تطبقها وتستخدمها أساليب الإشراط الإجرائي، كذلك اهتم patterson (1965) بهذا النوع العلاجي القائم على المزاوجة بين فنون العلاج السلوكي القائم على الإشراط الكلاسيكي والفنون القائمة على الإشراط الإجرائي، مثل: التحسين التدريجي وتشكيل السلوك وذلك بغية معرفة الأثر الناجم عن اجتماعهما في علاج الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة. كما أن patterson يعد أول معالج سلوكي فطن إلى أهمية هذا الجمع وذلك تماه من اثرياجابي عند دراسة أية مشكلة سلوكية تواجه أي فرد. وللتتأكد من ذلك قام بدراسة جمعت بين نماذج الإشراط الكلاسيكي والإجرائي في معالجة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات يرفض الذهاب إلى المدرسة بسبب قلق الانفصال الذي يعاني منه، وكان قلق الطفل متسبباً، حتى أنه لم يرغب في ترك أمه في غرفة المعالج لدقائق معدودة، وباستخدام تشكيل السلوك من خلال التقييم المتناوب والمعززات اللفظية والتحسين التدريجي في الواقع والتحسين التدريجي التخييلي كسلسلة متدرجة من المواقف المقلقة، واللعب بجموعة من الدمى حول صفات طفل يدعى هنري الصغير little Henry، كان الطفل يسأل إن كان يشعر في مواقف الانفصال المتنوسة بالاستقلال والتأكيدية. وبعد إحدى عشرة جلسة علاج بالتحسين التدريجي في الواقع والتي تتضمن أخذ الطفل برفقة المعالج كل يوم إلى المدرسة، ويقوم المعالج بترك الطفل في المدرسة لأطول مدة ممكنة. كذلك قام المعالج بتدريب الوالدين على تعزيز سلوكيات الطفل الإيجابية وذلك بهدف تقليل السلوك غير مرغوب فيه. وقد أسفرت النتائج بعد (23) جلسة علاج عن عودة الطفل إلى المدرسة والانتظام فيها بشكل جيد. كما دلت متابعة الحالة لمدة ثلاثة أشهر على توافق اجتماعي جيد لدى الطفل في البيئة المدرسية.

وقد أكد كل من "لازاروس، دافيدسون وبوتينكا" (1965) على قيمة استخدام الإجراءات المأخوذة من نموذجي الإشراط الإجرائي معًا في مراحل مختلفة من علاج طفل يبلغ من العمر تسع سنوات لديه قلق انتقالي بشكل واضح، إضافة إلى سلسلة من الضغوط الإضافية التي سرعت في حدوث الخوف المرضي من المدرسة عند الطفل؛ فالطفل خضع لعملية جراحية خطيرة مع آلام شديدة بعد العملية، وشهد أيضًا حالة غرق، ومن ثم أصبح بحالة اكتئاب وذلك بسبب وفاة صديقة اخته. استخدم الباحثون في علاج هذه الحالة تقنيات الإشراط الكلاسيكي والإجرائي، لقد تم تجربة أسلوب خفض الحساسية المنظم (في الخيال) ومن ثم التخلص من هذا الأسلوب، وذلك بسبب عدم قدرة الطفل على النطق، إضافة إلى تزعمه في الإذعان في تقديم الاستجابات التي يقبل بها المعالج. لقد بدا واضحًا على الطفل أنه كان مهتمًا في الحصول على رضا المعالج من أن يصف حقيقة مشاعره. لذلك تم تطبيق خفض الحساسية في الواقع (النهر، المزاج، الاسترخاء، الملاحظة، التشجيع، والصور المثيرة). كما تم وصف الأدوية المهدئة لهذا الطفل من قبل طبيب الأسرة، وذلك لخفض القلق المتوقع في الصباح. وقد كانت هناك محاولات لجعل الجو المدرسي أكثر جاذبية للطفل، وذلك من خلال إعطائه مهام خاصة، وجعل المعزوف عن المدرسة أقل جاذبية من خلال عدم السماح له في البقاء في المنزل خلال فترة المدرسة. وبعد انتهاء الجلسة الخامسة عشرة، أظهر الطفل القليل من القلق، وبناءً على ذلك تم استخدام إستراتيجية إجرائية لضمان حضور الطفل إلى المدرسة مستقلًا عن المعالج من خلال إعطائه كتاباً هزلياً أو كرة سلة إذا استطاع الطفل العودة إلى المدرسة بصورة تامة، ودللت نتائج المتتابعة لحالة (بول) بعد مضي عشرة أشهر أن (بول) قد حافظ على تحسنه العلاجي، وحقق مزيدًا من التقدم في المرونة للذهاب إلى المدرسة.

ويبدو أن المضامين النظرية لهذه الدراسة جديرة بالاهتمام لأنها تنطبق على العديد من الدراسات السلوكية الأخرى، فمن وجهة النظر الإجرائية أن جلسات خفض الحساسية المنظم (في الواقع) ربما تعزز بفعالية سلوك الاعتماد عند

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

ال الطفل وتقوي استجابات التجنب لديه، وذلك بالسماح للطفل بالعودة إلى المنزل بعد ظهور القلق خلال كل جلسة علاجية.

علاوة على ذلك إن الاهتمام والدعم الخاص اللذين يقدمان للطفل خلال فترة زمنية طويلة ربما يلقي الضوء على الصعوبات التي يعاني منها الطفل في عيون أصدقائه، ومن المحتمل أن يقوى ذلك استجابات التجنب تجاهه إقامته، وأخيراً فإن استعمال الأدوية ربما يعزز النظرة للطفل على أنه مريض ويحتاج إلى علاج خاص. لكن العلماء في هذا المجال أكدوا بأن الطريقة الإجرائية التي يمنع فيها الاهتمام بالطفل حتى يعود إلى غرفة الصدف، ربما تكون غير مفيدة من الناحية العلاجية إذا نظر المرء إلى المشكلة ضمن نموذج الإشراط الكلاسيكي، وإن الاستعجال في تعزيز الطفل إلى الموقف الأكثر خوفاً ربما تقود إلى زيادة حدة القلق وتقويته أو تعزيز استجابات التجنب إذا كان الهروب ممكناً. وفي المقابل فإن العلماء لم يشيروا إلىحقيقة مؤدهاها أنه إذا تم إغلاق طريق الهروب بشكل فعال ويقي الطفل في الموقف المثير للخوف، فإن خفض الحساسية يجب أن يحدث من خلال عملية الانفصال. وإذا تم بعد ذلك تطبيق الخطوات الإجرائية لتعزيز الحضور النظامي إلى المدرسة، فإنه لن يكون هناك تناقضاً بين الأسلوبين الكلاسيكي والإجرائي.

وبدلاً عن ذلك، فإن العلماء أكدوا بأن درجة القلق التي يحكم عليها المعالج يجب أن تقرر أي استراتيجية علاجية يجب أن توظف في علاج الطفل الذي يخاف من المدرسة، لذلك فقد اقترحوا بأن الدرجات العليا من القلق تشير إلى الحاجة لخفض الحساسية، بينما الدرجات الدنيا من القلق تدعو إلى استخدام الأساليب الإجرائية، ولكن بغض النظر عن حقيقة أن هذا المنطع من التفكير لن يحل المشكلات المركبة في الإجراءات العلاجية فإن هذا يثير مشكلة أخرى هي كيف يمكن للمعالج أن يحكم على مستوى القلق عند الطفل. ويرى "لانغ" (1970) في هذا أن المستويات الملاحظة من القلق لا ترتبط بالضرورة مع التقارير الذاتية غير الموضوعية وكذلك المقاييس الفيزيولوجية، وليس من السهل أيضاً على المعالج بشكل دائم التمييز بين استجابات الخوف الحقيقية المحددة بمعادرة الطفل المنزل أو

الذهاب إلى المدرسة وبين السلوك الاستبدادي والمشاكل الذي يظهر على الطفل بكلما تعرضت أماته إلى الخيبة والفشل.

وقد عالج كل من "تاهميسيان وماك رينولدز" (1971) حالة طفلة تبلغ الثالثة عشرة من عمرها، كان سبب قلق الانفصال لديها هو حضورها مخيم صيفي، إذ تم علاجها بواسطة هرمية خفض الحساسية المؤلف من (12) خطوة تتضمن مشاهد متخيلة. إلا أن الطفلة لم تحرز تقدماً باتجاه العودة إلى المدرسة. لقد لوحظ فيما بعد أن الأبوين دائمًا يخضعون لها عندما تكون مضطربة، وفي ضوء هذه المعلومة تم إعطاء الأبوين دور علاجي أساسي، حيث تم تطبيق خفض الحساسية المنظم في الواقع. وسار الأبوان بالطفلة من خلال هرمية مؤلفة من (15) خطوات من كافية السلوك التعاوني والإيجابي فقط دون الاهتمام باحتياجات الطفلة أو تندرها، وبعد ثلاثة أسابيع عادت الطفلة إلى المدرسة بشكل منتظم، وتم الحفاظ على هذا التحسن بعد متابعة الحالة لمدة (4) أسابيع.

أما "فيليبيس" و"واب" (1981) وضعوا برنامجاً علاجياً طويلاً ومعقداً جداً، تم تطبيقه على طفل يدعى (روب) يبلغ من العمر الثانية عشرة كان يعاني من قلق انفصال شديد واضطراب هاجسي لا إرادي (فعل قهري) أي أن الطفل كان يكرر وتساعات طويلة خسل اليدين. قبل أن يشارك فيليبيس وواب في العلاج، كان الطفل قد تلقى علاجاً نفسياً غير ناجح لمدة عامين على اعتبار أن لديه خوف من المدرسة. وكشف التحليل السلوكي الدقيق أن الطفل كان يخاف من الانفصال عن الأبوين في كل الظروف تقريباً وليس فقط في الموقف المدرسي. وإذا استثنينا لعب الطفل مكرة القدم مع أصدقائه في باحة المدرسة، فإن روب لم يستطع أن يترك الأبوين يغيباً عن ناظريه، وبناء على ذلك فيليبيس وواب لم يعتبرا أن المشكلة هي خوف مرضي حقيقي من المدرسة رغم أن الطفل كان يرفض الذهاب إلى المدرسة لمدة (5) أشهر ونصف مع حضور غير منظم لمدة عامين سابقين. ولقد تضمن العلاج خفض الحساسية المنظم الواقعي والخيالي معاً بالإضافة إلى تدريبات الاسترخاء العضلي. إضافة لذلك تم استخدام العلاج التواقي وتدريب

الأبوين وفق نموذج العمل الذي قام به باترسون (1975)، وأخيراً الخفيف المتدرج للسلوكيات التي يكررها الطفل بشكل مرضي (غسل اليدين) كـ"ما الفرق حداً" آزرين ونون" (1973). وتتضمن هذه الطريقة استبدال الاسترخاء العضلي بتقديم المكافأة للطفل كلما خفض من سلوكياته المرضية المكررة حتى تزول هذه السلوكيات. وبعد سنتين و(88) جلسة استطاع الطفل أن يداوم على الحضور إلى المدرسة دون قلق، واستطاع أيضاً الذهاب مع أصدقائه في رحلات أيام العطل، وتم الحفاظ على هذه المكتسبات العلاجية لمدة عامين من المتابعة لحالة (روب).

عقب فيابس وولب على هذه الدراسة والبرنامج المستخدم فيها، بأن البرنامج كان طويلاً ومرهقاً، وذلك بسبب إفراط الأب في شرب الكحول، وخوف الأم المرضى من الأماكن المزدحمة، وتدخل الجدة المستبدة في كثير من الأحيان في حياة الطفل. ولسوء الحظ لم يحدد الباحثون بدقة كيف أثرت هذه التضيّعات العائلية على سير العلاج وفيه أول سلسلة علاجية سلوكية واسعة النطاق وصف كينيدي (1965) تطبيقاً لبرنامج علاجي على (50) حالة تنتمي إلى النمط الأول من الأطفال الخائفين من المدرسة.أخذت طريقة كينيدي من النموذجين الكلاسيكي والإجرائي، حيث استخدم طريقة خفض الحساسية المنظم عن طريق التزوال الكلاسيكي من أجل إيجاب الأطفال للحضور إلى المدرسة. فقد عزز حضور الأطفال إلى المدرسة إيجابياً، وذلك بإعطائهم امتيازات خاصة في المدرسة ومعاملة حسنة في المنزل. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأطفال الخمسين عادوا إلى المدرسة بعد ثلاثة أيام فقط من العلاج. وتمت متابعة الحالات عن طريق الهاتف بعد أسبوعين وثمانية أسابيع لمدة تتراوح بين سنتين وثمانين سنة بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتي كشفت على أن كل حالة بقيت خالية من الأعراض المرضاية المصاحبة لــ"الخوف المرضي من المدرسة".

وقد نقاش كينيدي هذه النتائج بشيء من التفصيل بأن خمسة من الأطفال فشلوا في الاستجابة للتدخل العلاجي، وإن (37) حالة من أصل (5). حالة

كانت أعمارهم (11) سنة أو أقل، واختتم كينيدي دراسته بالقول بأن طريقة هذه مناسبة للأطفال المختلفين من المدرسة الذين ينتمون إلى النمط الأول، وأن تشخيص الحالات التي تنتهي إلى النمط الثاني كان أكثر سوءاً، وأن ذلك يتطلب علاجاً طويلاً.

(87 - 86 93)

أما الاقتراح الموجه لدراسة كينيدي فهو لم يقدم تفاصيل بشأن العينة الأصلية للأطفال المختلفين من المدرسة والتي على أساسها بنى تصنيفاته للنمطين الأول والثاني، كما أن هذه الدراسة لم توضح فيما إذا كان قد طبق رزمة العلاج السلوكي على كل الحالات الخائفة من المدرسة أو أنه طبقها فقط على الحالات التي تنتهي إلى النمط الأول. وفي دراستين مختصرتين وصف بلاح (1977 - 1981) استراتيجية شاملة لتشخيص وعلاج سريعين للخوف المرضي من المدرسة لدى الأطفال. لقد كانت الاستراتيجية مبنية بشكل أساسي على المبادئ السلوكية، وتأخذ من خلال نموذجي الإشراط الكلاسيكي والإجرائي كليهما والتي تتضمن الإجراءات التالية:

1. تحليل وتوضيح مفصل للقضايا المتعلقة بالطفل والمدرسة والأسرة والتي تلعب دوراً أساسياً في ظهور الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل.
2. خفض القلق لدى كل من الطفل والمعلم والأبوين في المرحلة التشخيصية، وذلك من خلال: المزاح، والصور المتحركة، المناقشة، والتمرين السلوكي المختصر.
3. الإضافة أو الغير كالدوم المدرسي الكامل والفوري، والذي يتم تسهيله من طريق إجراءات مراقبة الطفل إلى المدرسة عن طريق الوالدين أو المعالج إذا اقتضت الضرورة.



العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

4. العلاج التواقي في البيت وفي المدرسة لإزالة العوامل التي من المحتمل أن تبقى على ردة فعل الخوف والأعراض الجسدية ذات المنشأ النفسي وسلوكيات التجنب.
5. زيادة طرائق التعزيز الإيجابي في المدرسة وفي البيت، إذا حضر الطفل بشكل منتظم إلى المدرسة.

وهكذا مكان الجمع بين الإشراط الكلاسيكي والإشراط الإجرائي، بمعنى الجمع بين ما تحمله عوامل كل منها من الفشل والنجاح، هو السبب الذي حدّى بالمعالجين إلى القول بأن هناك صيغة لما يسمى بالنمذجة المشجع على أن يواجه الطفل المخاوف بنفسه، وهذه الصيغة مؤدّها أنه عندما يكون السلوك التجنبي (الإيجابي) مدفوعاً في شكلها التقليدي، وعندما يكون القلق في أدنى مستوياته، ويظهر أن السلوك التجنبي أو الإيجابي سيُظْلَل باقياً بسبب المعزّزات الثانوية المتنوعة، فإن الأمر يتطلّب عندّه تطبيق فنّيات الـ الشرط بمستويات عالية من القلق، فإن الأمر يتطلّب حينئذ استخدام فنّيات التشريط المضاد الإجرائي.

ميزات أساليب العلاج السلوكيّة:

ستعرض فيما يلي أهم الميزات التطبيقية لأساليب العلاج السلوكي بشقيها التقليدي (الكلاسيكي) والحديث (الإجرائية) اثناء التعامل مع ظاهرة الخوف المرضي من المدرسة. وهذه الميزات هي:

1. إن أساليب العلاج السلوكي المتعددة التي تم الحديث عن بعضها في الصفحات السابقة، أثبتت فاعليتها ونجاحها بدرجة كبيرة في علاج ظاهرة الخوف من المدرسة، كما أظهرتها الدراسات السابقة في هذا المجال، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات نجاح هذه الأساليب مع الأطفال الذين يعانون الخوف من المدرسة. وبعد تطبيق هذا البرنامج انتظم العدد الأكبر منهم في المدرسة خلال الأيام التالية لتطبيق البرنامج، وبعدهم الآخر انتظم بعد أسابيع قليلة من

البرنامج العلاجي على أكثر تقدير، وينبغي أن نشير في هذه النقطة إلى أنه كلما كان التدخل العلاجي سريعاً، بعد ظهور أعراض رفض المدرسة مباشرة، كلما تناقصت أعراض خوف الطفل من المدرسة والعكس صحيح، فعندما يكون العلاج متأخراً عن نصف سنة دراسية أو أكثر بعد بداية ظهور الخوف لدى الطفل، فإن الأمر يحتاج إلى شهور أو حتى سنوات بعد بدء العلاج حتى يستطيع الطفل المواجهة على الذهاب إلى المدرسة، كما أظهرت نتائج الدراسات التتبعية لهؤلاء الأطفال، الذين تم علاجهم بأساليب العلاج السلوكي المتعددة، أنهم كانوا في حالة انتظام جيدة في المدرسة، وحرصاً أكبر على الذهاب إليها.

2. إن سلوك الطفل الخائف من المدرسة يلاحظ ويقاس مباشرة من قبل المرشد النفسي، بالإضافة إلى المعلومات المستمدة من الوالدين والمدرسسين والأقران... فاعتراض الخوف لدى الطفل، مثل تجنب الذهاب إلى المدرسة أو رفضه ارتداء ملابس المدرسة أو الالتقاء بوالديه عندما يحين موعد ذهابه إلى المدرسة أو يبدل بعض الأعراض أو الشكاوى الجسيمة كحالم الرأس أو في المعدة. دون آية اعتراض حقيقة، وهذه الأعراض يلاحظها المرشد السلوكي والوالدين مباشرة. كما أن المعالج السلوكي يستطيع ملاحظة وتحليل علاقة (الطفل - الأم) وعلاقة الطفل بالبيئة المدرسية والتفاعلات المصاحبة لها بين العلاقتين قبل العلاج وأثناء وبعدة.

3. تؤكد بعض فئيات العلاج السلوكي في علاج الخوف المرضي من المدرسة على التعاون الوثيق بين المعالج النفسي والوالدين من جهة وبين المعالج النفسي والقائمين على العملية التربوية في المدرسة من جهة أخرى وذلك بهدف التخفيف من حدة هذا الخوف لدى هؤلاء الأطفال، وهذا التعاون يستبعد التفسيرات الغامضة والتآويلات المبهمة لفئيات العلاج السلوكي.



التطبيقات العملية للنظرية:

يبدو ووضحاً مما سبق أن الكثير من التقنيات السلوكية تم توظيفها في علاج الخوف المرضي من المدرسة، ولكن من الصعب الوصول إلى نتائج ثابتة للأسباب التالية:

1. إن غالبية الدراسات العلاجية تتضمن تقارير عن حالات فردية، بينما تشير غالبية الدراسات العلاجية إلى نتائج ناجحة من المستحيل معرفة إذا كانت الحالات المشار إليها تمثل بحق التجربة العيادية الأولى لمعالجين مبتدئين، أو أنها تعد أمثلة منتقاة بعناية من سلسلة علاجية أقل نجاحاً.
2. إن مصطلح الخوف المرضي من المدرسة تم تفسيره بطرق عددة من قبل باحثين مختلفين رغم أن غالبية التقارير السلوكية تقدم وصفاً مفصلاً للحالات التي تعاني الخوف المرضي من المدرسة. لذلك من الصعب إجراء مقارنات بين الدراسات العلاجية المنفصلة أو المستقلة من بعضها البعض.
3. إن النتائج العلاجية لطالما تم تعريفها بشكل ضعيف، وتم تقييمها بشكل ناقص، لذلك فإن غالبية الدراسات تقييم النتائج على أساس فيما إذا كان حضور الطفل إلى المدرسة مرضياً أم لا، ولم توجد دراسة واحدة عدا دراسة "بلاج وبيول" (1984) التي جعلت الحضور المرضي إلى المدرسة إجرائياً. استطاعت أن تعرف إجرائياً مشاعر المرض الظاهرة على الطفل العائد إلى المدرسة، وأخذت باعتبارها تحصيل الطفل في المدرسة وتكييفه الاجتماعي بعد العلاج دليلاً على ذلك التقسيم.
4. لم توجد هناك أبحاث مقارنة تؤكد الفعالية النسبية للفئتين العلاجية السلوكية المختلفة في علاج الخوف المرضي من المدرسة عند الأطفال.
5. بما أن طرائق العلاج السلوكية قد أصبحت أكثر تقدماً، فإن العديد من المعالجين قد طورو قاعدة عريضة من الاستراتيجيات التي توظف مزيج من التقنيات السلوكية المختلفة، إضافة إلى ذلك فقد اعترف بعض الباحثين أنه يجب التعامل مع العديد من العوامل خارج نطاق واجهة العلاج السلوكي،

لذلك أصبح من الصعب جداً معرفة أي العناصر والحقائق العلاجية أساسية، وأي منها ثانوية، وأي التقنيات أكثر فعالية، وما الظروف التي تستخدم فيها.

ويبدو من كل هذا أن البحث عن تقنية سلوكية محددة أو مجموعة تقنيات تلائم كل الحالات أمر في غاية الصعوبة بسبب التعقيدات والمدى الواسع من القضايا المتضمنة في علاج الأطفال الخائفين من المدرسة، فهناك كل حالة مختلفة عن الآخر رغم وجود بعض العوامل المشتركة. إضافة إلى ذلك إن تخيل البرنامج العلاجي المقصود وشخصية المعالج، ومكان العمل (مستشف أو المدرسة أو عيادة خاصة) غالباً ما يحد من اختيار الطريقة المناسبة لمعالج الذي يعمل في عيادة نفسية خاصة للأطفال وتقطن منطقة جغرافية واسعة، قد يجد إجراءات خفض الحساسية المنظم أمراً مستحيلاً، بسبب ضغوط العمل التي تفرض عليه وواجبات أخرى. والأساليب الواقعية في العلاج قد يكون من الصعب على المعالج استخدامها والإشراف عليها إذا كان يعمل في موقع بعيد عن منزل الطفل. بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المعالجين الذين ليس لديهم خبرة كافية بأساليب العلاج السلوكي لا يستطيعون خلق المشاهد المتخيلة وفي هذه الحالة فإن أسلوب خفض الحساسية المنظم المصاحب للتخييل لا يتم التمكن من تطبيقه، رغم ذلك فإن هناك بعض الأساليب التي تم تجربتها قد تكون مقيدة للطفل الذي يخاف من المدرسة تذكر منها:

١. تعزيز الأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة بشكل معتدل وبغير قصد من قبل الأبوين أو المعلمين وسرعة، فإن تقنيات بسيطة مثل: العلاج التواقي والعلاج التعاقدi قد يكونان ذا فعالية عالية، مع وقت وجهد قليلين نسبياً أثناء فترة تطبيق البرنامج العلاجي.
٢. الحالات الأكثر اضطراباً والتي هي مشكلات إضافية غير ظاهرة رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة، فإن أسلوب خفض الحساسية المنظم في الواقع والخيال مدروجاً بتقنيات أخرى ثبت فاعليتها في علاج مثل هذه الحالات. ويبدو من ذلك، أن هناك دليلاً قوياً يمكننا من القول بأن الطوارق أو الأساليب العلاجية

التي تتضمن أسلوب الإفاضة أو الغمر يجبأخذها بعض الاعتبار كحالات خيار علاجي لغالبية الحالات التي تعانى من الخوف المرضي من المدرسة، وأن الأساليب العلاجية القائمة على فنية التدريب على المهارات الاجتماعية، والعلاج السلوكى الإدراكي لم يلق الاهتمام الكافى لدى الباحثين الذين تناولوا علاج الخوف المرضي من المدرسة.

ثالثاً: العلاج المعرفي Cognitive Therapy

إن أصحاب هذا الأسلوب في العلاج يفضلون المنطق على النصيحة، لذلك يؤكدون على المنطق والظروف الجارية للتعامل مع الصعوبات السلوكية التي يمكنى منها كثير من الأطفال وخصوصاً حالات رفض الأطفال التهاب إلى المدرسة، كما أن هذا الأسلوب يؤكد على التعليم أكثر من القبول غير المشروط للعلاجات غير الموجهة Client centeral therapy أو العلاج غير المباشر Now - directive therapy.

رابعاً: العلاج بالواقع Reality Therapy

يعد "جلaser" Glasser أول من تحدث عن هذا النوع من العلاج حيث وصفه بالقول، لكي تكون جديرين بالاحترام يجب علينا الالتزام بمعيار سلوكى ذرمنى عنه، ولكن نفعل ذلك يجب أن نتعلم أن نتصح أنفسنا عندما ترتكب الخطأ، وأن نعزز أنفسنا إذا ما فعلنا الصواب، وإذا لم نقييم سلوكنا أو إذا لم نعمل على تحسينه، فإننا لن نشبع حاجتنا وبالتالي لن تكون جديرين بالاحترام، وسوف نuhanى بشدة نتيجة لذلك من الضغوط، كما يحدث عندما تفشل في الحب، إن الأخلاقيات والمعايير والقيم أو السلوك الصحيح والخطاوى، ترتبط كلها بشكل وثيق باشباع حاجتنا لتقدير الذات، وتعدّ جانباً ضرورياً في العلاج بالواقع.

كما يرى جلاسر أيضاً أن مراحل العلاج بالواقع تبدأ بـ:

1. تحقيق الاندماج الإنساني بين المعالج والمعالج.
2. مساعدة المعالج على تحقيق حاجاته في العالم الحقيقي.
3. مساعدة المعالج على تحسين قدرته ورغبته في أن يعيش على نحو أكثر مسؤولية.

وهي حالة الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة فإن على المعالج أن يناقش عدم حضور الطفل إلى المدرسة، كذلك المظاهر غير المناسبة في سلوك الطفل، وأيضا التأكيد على نقاط القوة لدى الطفل لكي يساعد له على الحضور إلى المدرسة بشكل منتظم. (28 - 58)

خامساً، العلاج العقلي الانفعالي : Rational Emotive therapy

تعتبر محاولة "إليس Ellis" أكبر محاولة لإدخال المنطق والعقل في عملية العلاج، وقد بدأ أسلوب (إليس) في التطور عندما اقتنع بأن الخبرات المبكرة الخاطئة أو غير المنطقية تستمر، وأنها لا تنتفع رغم عدم تعزيزها من الخارج؛ لأن الأفراد يعزون هذه الخبرات المتعلمة بتكرار تلقينها داخلياً لأنفسهم وبأنفسهم حتى تصبح فلسفة لهم، ونظرية خاصة بهم تؤدي إلى رفض العلاج.

(18.8)

إن أنصار هذا النوع من العلاج مقتنعوا بأن الفكر العرفي (العقلي) والانفعالي متداخلان مع بعضهما بشكل قوي. أي أن الانفعال والتفكير ليسا منفصلين، فالانفعال يصاحب التفكير والانفعال في حقيقته تفكير منحاز ذاتي وغير عقلاني. وعندما ينموا الأطفال فإنهم يتعلمون بالاعتقاد بأن بعض الأشياء جيدة، وبعضها الآخر سيء وهذه الأشياء السليمة تعد سلوكاً مرغوباً فيه، كذلك اتجاهه وتفكيره نحو المدرسة سلبي وسيئ وغير منطقي. لذلك فإن العلاج النفسي

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

المؤمن بهذا الأسلوب يساعد الطفل الذي يعاني من الخوف المرضي المدرسة على أن يجعل تفكيره منطقياً وعقلانياً. ويتم إنجاز هذا من خلال حوار يساعد فيه المعالج الطفل على أن يفهم أن المعتقدات التي بدت له منطقية وطبعية ذات مرة هي الآن غير معقولة وغير منتجة، والأطفال الذين يعانون الخوف المرضي من المدرسة يمكن أن يتعلموا التخيل النفسي من أجل تقويم موضوعي، لذلك فإن هناك عدداً من الاستراتيجيات يمكن استخدامها لإنجاز هذا الهدف أهمها: الإقتداء أو لعب الأدوار والنصيحة والبناء المعرفي (التخيل أو الإدراك النفسي) واستخدام المسرح لإظهار سخافة عدم الحضور إلى المدرسة.

(23, 58)

سادساً: العلاج الدوائي:

وفي الجانب الآخر من العلاج النفسي لظاهرة الخوف المرضي من المدرسة لدى الأطفال هناك العلاج الدوائي أو الكيميائي؛ إذ يعتقد أصحاب هذا التوجه في العلاج أن سبب الخوف من المدرسة هو التأثيرات الناتجة عن أورام في المخ، لذلك يرون بأن العقاقير الطبية والعمليات الجراحية لها أثر كبير وإيجابي وطيب في علاج مثل هذه الحالات. وقد قام "بوزنانسكي وأخرون" Poshomski et al من متابعة عقار مثل هذه الحالات. وقد قام "بوزنانسكي وأخرون" Poshomski et al من متابعة عقار "هالوبريدول" Haloperidol لدى فئات عمرية مختلفة وذلك باستخدام عقار (هالوبريدول) Haloperidol لدى فئات عمرية مختلفة وذلك على عينة مكونة من خمسة وعشرين طفلاً، بعضهم في سن المرحلة الابتدائية والقسم الآخر في فئات عمرية مختلفة.

اما الإجراءات التي اتبعها الباحثون مع أفراد هذه الفئية فكانت على النحو التالي: قام الباحثون بتقديم عقار (هالوبريدول) لعينة البحث لمدة أسبوعين، وبعد ذلك تمكّن الأطفال الذين يعانون الخوف من المدرسة من النهاب إليها بصحبة آبائهم في البداية، وبعد أيام عديدة استطاع الأطفال تأدية عملهم المدرسي دون خوف أو رهبة من المدرسة. واستخلص الباحثون من خلال نتائج الدراسة أن

عقار الـ الـ قد يفيد في التخلص من أعراض الخوف المرضي من المدرسة، وأعراض المخاوف الاجتماعية.

كما تحدث "فرومر" (1967) Frommer عن الأعراض الجانبية المحتملة لعقار (فينوباربيتون pherobarbitone) والذي يوصى غالباً كمهدئ Sedative على الأطفال الذين يعانون من اضطرابات مزاجية، والأطفال الذين يخافون بشكل حاد من ترك أمهاتهم ويشكل خاص عندما يذهبون إلى المدرسة، حيث اقترح أن المرض الاكتئابي يحدث بشكل أكثر تكراراً بين الأطفال بشكل عام. وقد أوصى فرومر أنه إذا كانت الحالة هي حالة اكتئاب، والقلق عرض من أعراض مرض الاكتئاب، عندئذ يتم علاج الحالة بمضادات الـ كتاب مثل فينيلزيزن chlordiazepoxide مع (نارديل Nardel) مع (نارديزوبوكسيde phenelzine) وبيناء على ذلك فقد عالج فرومر (14) طفل بهذه الأدوية الموصوفة أعلاه، وقد حكافوا من نموذجين مختلفين.

- النموذج الأول: أطفال يعانون من اضطرابات مزاجية.
- النموذج الثاني: أطفال من استجابات خواصية عند ترك أمهاتهم وذلك عندما يذهبون إلى المدرسة وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن (28) طفلًا من أصل (41) تحسنت على مضادات الاكتئاب، إلا أن حالة واحدة فقط أظهرت تحسن طفيف باستخدام عقار Lephenoxybenzene.

ما يؤخذ على هذا النوع من الدراسات هو: عدم وجود مؤشرات تؤكد على سلامة تشخيص هذه الحالة بشكل دقيق، كما يغيب عنها في كثير من الأحيان النهجية العلمية في اختيار العينة السريرية لكل طفل، إضافةً لذلك أنها لم تقدم أي معلومات حول حضور الطفل إلى المدرسة، والتحسين في الأداء المدرسي، والأعراض المصاحبة لحالة الخوف من المدرسة عند عرض نتائج الدراسة. كما أن بعض الأدوية قد يكون لها تأثيرات جانبية مؤذية على بعض الأطفال، تجعل من الصعب على الأهل والقسم الطبي في المستشفى القائم بعملية العلاج التخلص من

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

الأعراض الجانبية لهذا العقار، بالإضافة إلى ذلك فقد يتوقع الأهل أن مشكلة الطفل هي مشكلة صحية وليس مشكلة سلوكية أو اندفعالية.

سابعاً: العلاج من خلال الإقامة في المستشفى:

يعدّ "وارين" Warren (1948) أول من دعا إلى علاج الطفل الذي يعاني بالخوف المرضي من المدرسة في المستشفى كإجراء علاجي ذي قيمة، إذ رأى أن بعض الأطفال الذين تم علاجهم خارج المستشفى كان العلاج يسبب لهم مشكلات كبيرة، إضافة إلى هدر في الوقت، لذلك أكد على ضرورة علاج الطفل في المستشفى، والذي يعتمد بقوة على تعاون الوالدين وعلى قبول الطفل بالعلاج داخل المستشفى. ويعدّ هذا الإجراء مفيداً خاصة عندما تفشل الطرق العلاجية البديلة، وعندما تكون البيئة المنزلية بحد ذاتها عامل مسبب للمرض ويعزز أو يحافظ على الاختurbاب، ويعيق العلاج الفعال إضافة إلى ذلك فإن هنا كفؤائد كثيرة كما يرى هيرسوف (Hersov 1977) وغيره من العلماء في علاج الطفل الذي يخاف من المدرسة في المستشفى، ويمكن حصر هذه الفوائد بما يلي:

1. تهيئة الطفل لخبرات الانفصال؛ حيث يتم تشجيع الآباء لزيارة المستشفى بناء على اتفاق مخطط له سابقاً. وهذا من شأنه مواجهة الطفل بحقيقة مفادها أن المشكلة تكمن في المدرسة وليس في المنزل.
2. الدوام الكامل في مدرسة المستشفى يزيل القلق الثانوي المتراكم بشأن التأخر في إداء الواجبات المدرسية لدى الطفل، والنرجاح الفوري في الحضور في مدرسة المستشفى يظهر للطفل بأن المشكلات والمصاعب التي كان يواجهها كانت متعلقة بימغادرة المنزل أكثر منها بالذهاب إلى المدرسة.
3. بالإضافة إلى فوائد عامة تتبّع من الموقف العلاجي (المكان الذي يتم فيه العلاج) مثل الفرصة في تطوير علاقات جديدة مع الأقران ومع الراشدين وأيضاً تعلم أساليب التكيف مع مواقف اجتماعية جديدة.

وقد قام "ويس وكن" Weiss & Cain (1964) بدراسة تضمنت (16) مرهقاً أدخلوا المستشفى لعلاج حالة قلق الانفصال لديهم، وكشفت نتائج الدراسة أن من بين (14) حالة خرجت من المستشفى بعد تلقي العلاج فإن هناك طفلين فقط تحسنت حالتهما بشكل كبير و (8) حالات تحسنت بشكل معتدل وثلاث حالات تحسنت بشكل طفيف وحالة واحدة انتكست وعاد إليها الخوف من المدرسة بعد ستة شهور من خروجها من المستشفى، ولم تظهر أي تحسن بعد ذلك.

وهكذا يبدو أن ست حالات فقط أي (37.5%) من أفراد العينة كانوا قادرين على العودة إلى المنزل، وواظبوا على الحضور إلى المدرسة بصورة منتظمة بعد فترة علاج طويلة في المستشفى.

ويتضمن العلاج في المستشفى فصل الأبوين عن الطفل أثناء فترة العلاج، مع السماح للأبوين بزيارة الطفل في المستشفى بشكل متكرر، خصوصاً في المراحل الأولى من العلاج، وهذا من شأنه أن يبعث الثقة لكل من الطفل والأبوين، كما يقدم أيضاً الكثير من التدريبات التي تساعد الطفل على التكيف مع خبرات الانفصال في بيئه داعمه مع تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وهذا من شأنه أن يساعد على تقليل من حالة التوتر الناجمة عن الانفصال لديه. ويؤخذ على هذا الأسلوب أنه لم يميز بوضوح بين الحالات التي تستدعي العلاج خارج المستشفى أو تلك التي تستدعي العلاج داخلها.

ثامناً: العلاج الأسري:

إن طرائق العلاج الأسري تتجاوز العلاقة الثنائية للطفل والأبوين، لأن هذا النوع من العلاج يخاطب نظام الأسرة برمته، وعذّ الخوف المرضي من المدرسة على أنه دليل على أداء أسري خاطئ، لذلك فقد أشار "سكايرز" لطريقته في العلاج والقائمة على العلاج النفسي للأسرة مجتمعة على أن المشكلة الرئيسية في وجود الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل هي فشل الأبوين في مساعدة طفليهم على

العلاج النفسي لخوف الأطفال من المدرسة

التخلص من الاعتماد الشديد على الأم (الامتلاك القلقي للأم). لهذا هناك مشكلة ثابتة بشأن انفصال الطفل وترك المنزل مع وجود علاقة لاحقة لديه لاستقطاب العلاقة الحصرية (القلقة) بينه وبين أمه مع معلماته، وهذا أمر ممكن في المدرسة الابتدائية حيث يوجد معلم واحد للطفل في المدرسة وخصوصاً في المراحل الأولى من التعليم بينما لا يمكن ذلك في المرحلة الثانوية بسبب وجود أكثر من معلم للطفل أو الطالب.

وقد أشار سكايينر (1974) إلى أن الأطفال الخائفين من المدرسة يكونون محبين من تحديات الواقع من قبل أمهاتهم، وأن الأمهات لديهن علاقات تملّك وقلق مع أمهاتهم. ومع مرور الوقت فإن تلك الأمهات ينتقلن هذه العلاقة إلى أبنائهن.

ويتم التحدي الجوهرى لذلك بـ:

1. إضعاف صفة التعلق المقلق في المرحلة الفمية لدى الطفل.
2. إضعاف لشاعر التملّك عند الطفل.

ويعد النجاح في هذه المرحلة المبكرة الإنجازات اللاحقة والفشل في هذه المرحلة يخلق مشكلات وصعوبات في حل التناقضات الأودية وتناقضات أخرى.

ويرى "سكايينر" بأن الروابط داخل هذه الأسر تسير عموماً من الأب إلى الطفل، مع وجود علاقة ضعيفة بين الزوجين، وفي محاولة لحل هذه الصعوبات الواضحة يتم التأكيد على العناصر العلاجية التالية:

1. الأسرة بكاملها تكون متضمنة في العلاج، إضافة إلى أعضاء آخرين من العائلة إذا اقتضت الضرورة.
2. التأكيد على الحوار والمواجهة غير الشفوية للأبوين حول أسلوب العلاقة على المستوى الشعوري واللاشعوري المتبع بينهما، مع التركيز على التفاعل

الأسرى في الوقت الحاضر، رغم أن الأحداث الماضية ربما تؤخذ بعين الاعتبار عند ما تظهر.

3. التركيز على العودة المبكرة للطفل إلى المدرسة.
4. إضفاء الرابطة بين الطفل وأمه، وتنمية الرابطة الزوجية، وذلك بتشجيع الأب لكي يأخذ دوراً أكثر فعالية وأكثروضوحاً.
5. في الحالات الأكثروضوحاً عند الأهل خصوصاً إذا تم شرح المشكلة لهم، فإنهم يفكرون بشكل جدي حول المشكلات الموجودة في الأسرة والتي تعدّ السبب الأول عن خوف الطفل من المدرسة، وبالتالي تستطيع الأسرة أن تنظم أساليبها وتحل المشكلة في صورة ذلك. ولكن في الحالات التي يكون فيها الأبوين أقل تعاوناً أو غير قادرين على التكيف، فإن الدورالأبوي الغائب يجب أن يملاً من قبل المعالج أو بعض الأفراد الآخرين كالأخصائي الاجتماعي.
6. وعلى التقىض من الإجراءات العلاجية السريعة الأخرى، فإن "سكايرز"يدعو إلى استعمال الأدوية للمساعدة في مرحلة المواجهة، بالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال الخجولين جداً يتم مساعدتهم عن طريق جعلهم يحضرون في مجموعات العلاج النفسي، بينما يتم مساعدة الأمهات على أن يصبحن أكثر استقلالية عن أطفالهن عن طريق مساعدتهم للحضور إلى جلسات العلاج النفسي الخاصة بالأمهات.

ويلاحظ من الأسلوب العلاجي هذا أن الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل يفهم على أنه مشكلة نفسية اجتماعية، لذلك يؤكّد على دور الأسرة في مساعدة الطفل على المواطبة للذهاب إلى المدرسة من خلال حل الصراعات القائمة بين الوالدين والطفل، ويتجلى دور العلاج من خلال تقديم نظام قيمي واضح يحدد فيه طبيعة مسؤوليات الأبوين أثناء عملية العلاج.



8

قضايا تشخيصية وعلاجية





MOHAMED KHATAB

الفصل الثامن

قضايا تشخيصية وعلاجية

مقدمة:

إن الفصل الحالي سوف يبحث في القضايا والإجراءات المتضمنة في الإجراءات العلاجية والتشخيصية المدروسة في الفصول السابقة والتي تمثل نظرة مفصلة لطريقة العلاج السلوكية السريعة كما ذكرت سابقاً في دراسات "بلاج" 1977.1979.1981) والتي يتم الاستفادة منها في جمع المعلومات ذات الصلة. إن الطريقة العلاجية / التشخيصية مبنية بشكل أساسي على المبادئ السلوكية، ولكنها تتضمن أيضاً الالتفات للعديد من القضايا المتعلقة بالمدرسة والأسرة والقضايا الشخصية أيضاً.

إن هذه الطريقة يمكن تلخيصها وفقاً للمراحل الأساسية الأربع المضمنة والتي تناسب الصيغة التي وضعها "ميروبارييت وهامب" (1974) وهذه المراحل هي التالية:

1. تأسيس علاقات جيدة مع الطفل والأسرة والمدرسة.
2. توضيح الأحداث الحقيقة أو المتخيلة والتي سببت القلق.
3. خفض حساسية الطفل وإذا كان ضرورياً.
4. يجب أيضاً خفض حساسية الأبوين والمدرسین وذلك من خلال تقنيات متنوعة ومن ضمنها النقاش والمزاح ولعب الدور والصور المثيرة.
5. مواجهة الواقعية وذلك من خلال إجبار الطفل على الحضور إلى المدرسة، بالإضافة إلى ذلك يتم التعامل مع العوامل الإجرائية المرتبطة بالمدرسة وال逎ز من خلال النصيحة بالعلاج التواافقي في الأصل. إن العنصر التوضيحي يتضمن إجراءات حل المشكلات بصورة منهجية، بينما العناصر الأخرى تتضمن تطبيق مدى شامل أو واسع من التقنيات السلوكية المعدة

لتلائم احتياجات كل حالة بحد ذاتها. وفيما يتعلق بالأسباب، فإن نموذج الضغط المضاف المشار إليه في دراسة "يول وهيرسوف (1980)" قد وجَد على أنه مساعد بشكل خاص، إن الطفل سريع التأثير والذي يجاهه سلسلة من القلق المتعلقة بالمدرسة والمنزل. هذا القلق الذي تشا لدِي الطفل خلال فترة زمنية قصيرة يصبح قلقاً أو متوفراً بشكل كبير مما يؤدي إلى ان تعزز وتبقي على نموذج رفض الذهاب إلى المدرسة، إن الغياب عن المدرسة يؤدي إلى تطوير عوامل ثانوية أخرى من شأنها أن تعزز وتبقي على نموذج رفض المدرسة.

١) التصورات المسبقة من جانب الأهل:

إذا وجد الطفل المثالي فإنه يستطيع بشخص تقبل النصيحة والمساعدة، وعندما يطلب منه سوف يزود المعالج بكل المعلومات التي يحتاجها عنه، ويرحب بالأفكار الجديدة، ويشارك طواعية في الاقتراحات العلاجية، ويقبل بإشراك أي من المدرسين وأفراد الأسرة والأصدقاء الذين قد يساعدون في حل المشكلة ولكن تسوء الحظ فإنه من النادر وجود حالات خوف من المدرسة مثالية، أو أن هؤلاء يتبنون إلى عائلات مثالية أو مدارس مثالية لأسباب عديدة مفهومة، غالباً ما يسيء المدرسون لهم طبيعة صعوبات الطفل، وذلك لأن الأطفال الخائفين من المدرسة راقضون بشدة للعلاج، وأباءهم متربدون في طلب النصيحة وحل المشكلة.

في الواقع الأمر فإن هناك حالات عديدة تجبر على العلاج بسبب الضغوط الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالحضور إلى المدرسة؛ وبذلك فإن العملاء غالباً ما يتتعاونون مع المعالج بشكل سطحي، فقد يكونون راغبين في مشاركة المعالج بوجهات نظرهم ويمشرون، وقد يقبلون باستراتيجية علاجية معينة دون غيرها. ولكن إذا حصل أي إزعاج لهم فإنهم يرفضون كل الخطط العلاجية المرسومة لهم، إلا أنه قد يقبل الحقائق النفسية، ولكن الحلول العلاجية غالباً ما تكون صعبة التنفيذ. إن المرض الجسدي يكون مقبولاً أكثر بكثير من المرض النفسي لذلك إذا لم يقدم طبيب الأسرة تبريراً أو شرحاً طبي قابن الأهل أو الآباء سينذهبان إلى طبيب الأطفال

قضايا تشخيصية وعلاجية

طلب للاستشارة، في هذه المرحلة غالباً ما يكون هناك تأخيراً طويلاً في الحصول على موعد، والانتظار حتى تظهر نتائج الاختبارات النفسية. إن عدم التأكيد من تحديد الموعود قد يولد قلقاً زائداً ومشكلات ثانوية تظهر كنتيجة لغياب عن البناء المدرسي. وأخيراً فإن طبيب الأطفال قد يشير إلى ضرورة أخذ أو إرسال الطفل إلى طبيب نفسي، وفي غياب التفسيرات الجسدية للأعراض المقدمة للطفل، فإن الأبوين سينتظرون إلى أسباب أخرى. هنا قد يتم النظر إلى المدرسة بعين ناقدة من جانب الأبوين. إن الأبوين الذين لم يكن لهم ذكريات سعيدة في أيام المدرسة أحياناً قد يسيئون التفسير أو يضخمون أو يشوهون صورة الأحداث الصغيرة. إن الاتصال الضعيف بين المعلمين والأباء يمكن أن يزيد من حدة المشكلة، وذلك بعدم تحدي سوء الفهم والإدراك بين الجانبين. إن القلق المرتبط بالمدرسة قد يتم تعزيزه عن غير قصد من قبل الأصدقاء والأقرباء والمختصين الذين يشاركون الأبوين مشكلتهم ولكنهم لا يملكون المعرفة الجيدة بالبيئة المدرسية.

في ضوء هذه الاعتبارات فإن القضايا التالية سوف تتطلب الانتباه والتركيز الشديد.

(2) أسم الاتصالات جيدة بين فريق العمل الإرهابي؛

هناك العديد من الوكالات يمكنها أن تشترك في تقديم المساعدة للطفل الخالف من المدرسة وهذه الوكالات تتضمن: أطباء الأسرة وأطباء الأطفال والأطباء والمرشدين النفسيين والمعلمون والعاملين الاجتماعيين، الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات التربوية العامة، إضافة إلى علماء النفس التربويين. كل جهة من هذه الجهات تنظر إلى مشكلة الطفل من زاوية مختلفة وبالتالي قد يكون هناك تناقض أو تعارض في النصائح المقدمة للطفل. وهذا من شأنه أن يشوّش الأهل و يجعلهم محتررين كيف سيقدمون في علاج الطفل (بأية طريقة)، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا من شأنه أن يوفر فرصة للأهل الذين لا يرغبون في علاج طفلهم بإضاعة الوقت بين الاختصاصيين المختلفين ومحاولة التلاعب معهم والإيقاع

بعضهم بعضاً. ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلات إذا امتلك الأخصائيون معرفة مشتركة لحالة الطفل وعملوا سوية وفقاً لاستراتيجية علاجية ثابتة ومشتركة وداعمة في نفس الوقت.

(3) التأكيد على أخصالي واحد يتولى العلاج:

إن التعاون والاتصال بين الأخصائيين أن يعزز إذا عمل شخص واحد مع الأسرة والمدرسة معاً، ويتسق هذا الشخص عملية إشراك باقي الأخصائيين عند الضرورة.

غالباً ما يكون علماء النفس التربويون هم المؤهلون أكثر من غيرهم للعب الدور الرئيسي في العلاج. إن التدريب الذي حصلوا عليه في المجالين العيادي والتربوي يمكنهم من تقديم العلاج الدقيق للطفل بالإضافة إلى معالجة القضايا أو الأمور المتعلقة بالمدرسة والأسرة. إن علماء النفس التربويين يمتلكون معرفة وثيقة بالمنزل في منطقتهم؛ لذلك فهم غالباً ما يعرفون البيئة المحيطة بالطفل قبل أن يتعاملوا بشكل فعال مع حالته.

(4) استبعاد المشكلات الطبية قبل البحث في عوامل أخرى:

إن الأطفال الذين يخافون من المدرسة غالباً ما يتعرضون لأعراض جسدية مزعجة عديدة لذلك فمن الضروري استبعاد الأسباب الجسدية، أي علاجها بسرعة. وما لم يحدث ذلك فإن التقلق المتعلق بالصحة الجسدية سيستمر مما يجعل العلاج أكثر صعوبة، وعلى كل حال فإن الخوف المرضي من المدرسة يمكن أن يتعايش مع مرض جسدي حقيقي. ومن الواضح أن المرض الجسدي الحقيقي يجب أن يعالج قبل أن يستطيع المعالج علاج الخوف المرضي من المدرسة. إن إصعاف الإصابة الفيروسية أو أي مرض آخر في بعض الأحيان يساهم في زيادة الخوف المرضي من المدرسة مما يجعل من الصعب معرفة متى اختفت المشكلة الجسدية ومتى يبدأ الطفل يتجنب المدرسة وإن الارتباط الوثيق بين المعالج النفسي

قضايا تشخيصية وعلاجية

والأخصائيين الطبيين غالباً ما يشار إليه أو ما يؤكّد عليه، وذلك لتوضيح الوقت المناسب للبدء بمعالجة مشكلة الطفل الخائف من المدرسة نفسياً.

وإذا لم تُجر الفحوص الطبية يجب على المعالج النفسي أن يناقش الحالة مع طبيب الأسرة ناصحاً إياه بإكمال مشاركته في العلاج وأن يتتأكد من الآباء أن قد أخذنا ابنهما من أجل القيام بفحص طبّي له. ومن المفضل أن يكون الشخص الطبي خارج أوقات الدوام المدرسي وذلك قبل تحديد موعد زمني لمقابلتهما. إذا وجد الطبيب أن هناك أساساً عضوي للأعراض التي تصيب الطفل يجب على المعالج أن يطلب توضيحاً من الطبيب حول المدة الزمنية التي يجب أن يقضيها الطفل خارج المدرسة وبعد ذلك يجب عليه أن يتابع حالة الطفل، فإذا وجد أن الطفل قد تحسن جسدياً ومع ذلك إذا بقي الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة، عندئذ عليه ترتيب موعد مع الأهل بشكل عاجل.

(5) البحث عن مكان آمن يوجد فيه الطفل بشكل دائم في المدرسة:

إن العلاج الناجح يعتمد بشكل كبير على التعاون الكامل لعلمي الطفل الخائف من المدرسة. ومن المهم للمعالج أن تكون علاقته جيدة مع المدرسة، وأن يمتلك المعرفة الكاملة بالقضايا التربوية وذلك لكي يقيم بشكل واقعي مدى ملائمة المكان الذي يوجد فيه الطفل في المدرسة. وبشكل عملي فإن العديد من المعلمين يجيدون التعامل بشكل كبير مع مثل هذه الحالات، ولكن هناك قلة قليلة من المعلمين ومن يفضلون في القاء الحمل أو المشكلات الموجودة في المدرسة على مؤسسات أخرى خارج المدرسة. إن مواقف المعلم والجامعة التي يوجد ضمنها الطفل الخائف من المدرسة، ومرؤوفة البرنامج المدرسي، وتتوفر المساعدة العلاجية، وهدوء غرفة الصدف، وتتوفر وسائل الرعاية للطفل داخل المدرسة، كل هذه الأمور وغيرها يجب أن تبحث وتفهم قبل البدء بمقابلة الآباء والطفل.

٦) القضايا التي تتعلق بسير العملية العلاجية:

غالباً ما يتطلب العلاج الناجح إعطاء أهمية كبيرة للتتفاصيل، ومن المهم جداً جمع كل المعلومات الضرورية قبل مناقشة الخطة العلاجية. ولذلك يجب الاهتمام بالقضايا العملية التي من المحتمل أن تفسح المجال لجمع المعلومات أو أن تقييد عملية جمع المعلومات.

٧) تقييم دافعية الطفل للعلاج:

قد تعطي خلفية المعلومات المقدمة من قبل المعالج وأعضاء فريق العمل العلاجي الآخرين دلالات مفيدة حول دافعية الأبوين والمعلم من أجل المساعدة، إذا تم إيجار الأسرة على طلب الاستشارة من قبل المدرسة والخدمات الاجتماعية أو المسؤولين عن الخدمات التربوية العامة وذلك بسبب تغيب الطفل الدائم عن المدرسة، فإن الأبوين عندئذ قد لا يرحبون في المساعدة أو قد يرفضون التعاون ويكون بالتالي موقفهم عدائياً أو رافضاً للمساعدة. وعلى النقيض من ذلك فإن الأبوين الذين يوجد لديهم رغبة كبيرة لتقدير النصائح والمساعدة قد يضططون على المعالجة لإيجاد حل سريع لمشكلة ابنهم.

في الواقع إنك من المحتمل أن ترى مدى واسع من الآباء بدءاً بالأباء الرافضين وغير المتعاونين أبداً إلى الآباء المنشترين والذين يرحبون بتقديم النصائح والاقتراحات، إن بعض هؤلاء الآباء قد يكونون راغبين في التعاون ولكنهم يقاومون أو يصدرون الخلط العلاجية لأنهم يخافون من أن العلاج قد لا يكون ذا نفع كبير ويخشون أن تزداد حدة المشكلة لدى أبنائهم. ومنذ البداية لابد للمعالج أن يشير مشارع الأبوين وذلك بالاستماع الدقيق لما يقولونه بالإضافة إلى ملاحظة الدلالات الضمنية في العبارات التي يقولونها ونبرة الصوت ولغة الجسد.

(8) السرعة في التدخل:

يجب المعالج أو المرشد النفسي التدخل بأقصى سرعة ممكنة، بينما الأحداث التي تقود إلى المشكلة جديدة في عقول كل فرد، القضايا والمشاعر ومن المحمّل أن تكون القضايا والمشاعر في هذه المرحلة أكثر افتتاحاً وسهولة المثال لفرض البحث، علاوة على ذلك إذا كان من الممكن علاج المشكلة مبكراً قد تكون هناك فرصة أقل لظهور عوامل ثانوية من شأنها أن تجعل العلاج أكثر صعوبة.

(9) التوقيت ودرجة التقدم:

بما أن المشكلات المرتبطة بالخوف المرضي من المدرسة عادة ما تكون معقدة للغاية وحقيقة فإن جمع المعلومات بصورة منهجية تتناول كل الجوانب ذات الصلة بالمشكلة فهي مضيعة كبيرة للوقت. لذلك فمن الهام توفير وقت كثير في مرحلة التشخيص الأولى، إن تركيز العلاج في جلسة أو جلستين مطولتين يمكن أن تكون ذات فعالية كبيرة وذلك بتقليل الزمن المطلوب للجلسات اللاحقة. إن سلسلة من الجلسات القصيرة والمترتبة والمتقاربة زمنياً يمكن أن تكون فعالة أيضاً. إن كلتا الطريقتين تبلغ ضمانتها الأطراف المشركة في علاج آني للمشكلة التي يتم التعامل معها بجدية وبسرعة وإن توفير الوقت الكافي وتوخي الدقة في العلاج يمكن أيضاً أن يزيد الثقة عند المعالج ويسهل بناء العلاقة، والجلسات التشخيصية الأقصر ذات الوقت المحدد والتي تنتهي فجأة يمكن أن تعرض لمزيد من القلق مما يزيد من هيجان أو توثر العملاء أكثر من بداية المشكلة لديهم، علاوة على ذلك بما يفهم العمالء على أن المعالج لديه اهتمام قليل بمشكلاتهم وهو فقط يقوم بعمله كأداء واجب لا أكثر ولا أقل. وأخيراً فإذا كانت الجلسات متباينة زمنياً يمكن أن يحدث تأخير لا ضرورة لها في التخطيط لعودة الطفل للمدرسة. وطالما أن الطفل تحت العلاج، فإن الآباء والطفل يشعرون بالأمان نتيجة لعدم التعرض للمشكلة الأساسية عند الطفل إلا وهي عودته إلى المدرسة.

إذا كان من الممكن عدم تحديد زمن معين للعلاج بشكل مثالي، فإنه يجب أن يخصص يوم كامل لمقابلة كل الأطراف المعنية بشكل منفصل وفي مجموعات، ويدل ذلك فإن جلسات التخطيط العلاجية والتشخيصية يمكن أن تكونا مستمرة.

(10) مكان المقابلة:

إن استثمار جهد كبير في تنظيم المقابلات التشخيصية الأولى في المدرسة له أهمية كبيرة، إذا طلب الأبوان المساعدة يجب على المرشد النفسي التأكيد عليهم أنه ينبغي إحضار ابنهم إلى المدرسة حتى ولو بالقوة، في بعض الحالات يمكن للأخصائي الاجتماعي أو الموظفين في الخدمات التربوية العامة المساعدة في هذه العملية، ونكن طالما أن هناك إمكانية فمن الأفضل أن يترك الأمر لأفراد الأسرة لتنظيم مصادرهم الخاصة والتي تتضمن الأصدقاء أو الأقرباء عند الضرورة.

ويجب على المرشد النفسي أن يتوتى عنابة كبيرة بتوسيع البيئة المدرسية، وذلك بأن يتم توفير مكتبين هادئين لإجراء المقابلات فيهما، وكذلك يجب التأكيد من وجود المعلمين الأساسيين حتى يستطيعوا أن يتدخلوا أو أن يشتركون في العلاج في الأوقات المناسبة. إن إحضار الأبوين وال المتعلمين والطفل معاً إلى الموقف الذي يسبب المشكلة، فيه العديد من الفوائد، نذكر من أهمها ما يلي:

1. إن وجود الأطراف الثلاثة معاً (الأبوين، المعلمين، الطفل) من شأنه أن يبلغ رسالة تفاؤل، فكأنما يقول المعالج إنه رغم الصعوبات يعدّ إحضار الطفل إلى المدرسة للمقابلة أمر عقلاني جداً. إن زيارة المعالج منزل الطفل أو إحضار الطفل إلى العيادة للعلاج كأنما يوحى بأن الطفل لديه مشكلة كبيرة تترجم أنه لا يستطيع أن يعالج داخل المدرسة، وهذا من شأنه أن يعتقد هذه المشكلة.
2. إذا استطاع الأبوان إحضار الطفل إلى المدرسة للعلاج رغم معارضته الشديدة فإن هذا تعتبر إشارة جيدة على أن الأهل راغبون بشدة في عودة طفلهم إلى المدرسة، وأنهم يستطيعون تطبيق إجراء المراقبة عند الضرورة.

قضايا تشخيصية وعلاجية

3. إن وجود الآبوين في الموقف العلاجي يمكن أن يقدم لهم خبرة تعلم جيدة، وتكتشف لهم مشكلات لم يكونوا قد توقعوها، هذه المشكلات يمكن أن تناقش مع المعالج فيما بعد.
4. قد تكشف عن معلومات بشأن هل مخاوف الطفل ناجمة عن قلق الانفصال والخوف من ترك المنزل أو الخوف من المدرسة.
5. إن مدى وشدة وطبيعة قلق الطفل المرتبط بالمدرسة يمكن أن يكشف النقاب عنه، ويبحث بسرعة وذلك بغية إرضاء الآبوين.
6. إن سوء فهم المدرسة من جانب الآبوين يمكن أن يزاحى من خلال المناقشة، وبذلك لا يفكر الآبوان كثيراً في الأمور الناجمة عن سوء الفهم أو الاعتقاد الخاطئ (إمكانية أن يكون للمدرسة دور في إيجاد الخوف المرضي عند طفلها).
7. إذا تم توضيح المشكلات الخاصة بالطفل لدى الجميع، وذلك من خلال إصرارهم على عودة الطفل لمدرسته الحالية، عندئذ يمكن أن تصاغ خطة علاجية على الفور.
8. وفي بعض الأحيان قد يحضر الآبوان إلى المدرسة من أجل المقابلة ولكنهم لا يحضرون طفليهما معهم، إن السبب الكامن وراء عدم حضور الطفل من قبل الآبوين يجب أن يبحث بدقة، إن بعض الآباء لا يستطيعون التعامل مع المزاج المشاكِس والمسيطر لابنِهم والتهديدات الشفهية والابتزاز العاطفي الذي يبديه الطفل، وقد يكون للأبوين مصلحة في الحفاظ على مشكلة الطفل، في هذه المرحلة يكفي أن تقول أن زيارة متابعة للطفل في المنزل مقابلته مع إعطاء موعد لاحق في المدرسة وذلك للتخطيط لطريقة العلاج غالباً ما تحل المشكلة، في بعض الأحيان قد يحتاج الآبوان إلى مساعدة خارجية وذلك لإحضار طفليهم إلى المدرسة.
9. أحياناً قد تشير البيانات الاستشارية الأولى إلى أنه يتوجب على الطفل تغيير المدرسة، وفي هذه الحالة يجب على المعالج أن يقوم بزيارة للمدرسة لمناقشة هذا الأمر مع معلمي الطفل، بعد ذلك يجب أن يزور منزل الطفل مقابلته مع آبويه، ومن ثم يقرر أين ينبغي أن يحضر الطفل (في أي مدرسة)، وبعد ذلك

على المعالج أن يهين الأجواء في المدرسة الجديدة، ومن ثم دعوة الأبوين والطفل للحضور إلى جلسة مشتركة مع الطبيب النفسي والمعلمين مع الأخذ بعين الاعتبار مقابلة كل طرف من الأطراف بشكل منفصل (على انفراد)، لأن هناك فوائد واضحة في إجراء مقابلات منفصلة مع الطفل والأبوين والمعلمين قبل إحضارهم جميعاً للمقابلة مع بعضهم بعضاً. ليست الأحداث التي تقود إلى المشكلة هي الأكثر أهمية، إنما الطريقة التي ينظر بها المشتركون في العلاج (الطفل، الأبوان، المعلموون) لهذه الأحداث هي التي يمكن اعتبارها الأكثر أهمية في العلاج. طبعاً من المحتمل أن الطفل والأبوين والمعلمين وكل طرف من هذه الأطراف تديه وجهة نظر مختلفة جداً عن وجهة نظر الآخر. كل طرف من هذه الأطراف قد ينتقي بعض الجوانب للمشكلة للحديث عنها وأيضاً يحاول أن يعظم بعض الأحداث، بينما قد يهمل بشكل كلي أحداثاً أخرى تبدو له أنها ليست ذات أهمية. إن المشكلة أو بالأحرى المهمة التي تواجه المعالج هنا هي أن يكون قادرًا على استخلاص كل وجهات النظر المختلفة وذلك حتى يتم فهم مشاعر كل طرف من الأطراف المشتركة في العلاج.

غالباً ما يحاول كل طرف من الأطراف أن يجعل المعالج يميل إلى وجهة نظره هو، ويحاول قدر المستطاع إقناعه بأنه هو على صواب، وبالتالي يتطلب من المعالج دعم موقفه والتأكيد عليه. يجب على المعالج قدر المستطاع أن يكون بارعاً في المراوغة بحيث يظهر لهذا الطرف أو ذاك أنه متعاطف معه، ولكن ليس بالضرورة أن يتفق معه بالرأي.

إن المقابلات التي تجري على انفراد تمكن المعالج من إقامة علاقات مع كل طرف من الأطراف، بينما الجلسات المشتركة لا تتمكنه من ذلك. وغالباً ما يكون التماض مع أحد الأطراف على حساب الآخر مزعجاً للطرف الآخر الذي يكون تديه وجهة نظر معاكسة، هذا قد يوحى بأن المعالج منحاز إلى طرف من الأطراف ولا يقوم بجمع المعلومات منهم بطريقة حيادية، وقد يسوء الأمر أكثر من ذلك يؤدي إلى عدم تعاون بعض الأطراف مع المعالج وإخفاء مشاعرهم الحقيقة

قضايا تشخيصية وملجوية

وعدم تقديم المعلومات الجوهرية، وحالاً يحصل المعالج على صورة واضحة للأحداث الهامة، وكيف ينظر المشتركون في العلاج إليها، فإن الخيارات العلاجية يتم بحثها بدقة، وكل طرف من الأطراف يتم تهيئته بشكل ملائم للجلسة العلاجية المشتركة.

يوضع المعالج أحياناً تحت ضغط غير معقول للموافقة على وجهة نظر معينة للمشكلة وإذا حصل هذا يجب أن يستخدم المعالج اللغة المناسبة ويحرص على هذا، إذا حصل هذا يجب على المعالج أن يقول: "أنت أجد صعوبة في هذه المرحلة لكي أقرر الموافقة أو عدم الموافقة وذلك لأنني أحتاج إلى مزيد من المعلومات...."

(11) أسلوب المقابلة:

العملاء المختلفون (المتنوعون) لديهم توقعات مختلفة من المعالج، فالآباء القلقون جداً والذين لديهم دافعية كبيرة للعلاج قد يرغبون في أن يلعب المعالج أو يأخذ دور الخبرير الذي يقدم لهم حلولاً سريعة، وعلى النقيض من ذلك فإن العائلات التي تجبر على العلاج قد لا يعجبهم هذا الدور الذي يريد أن يلعبه المعالج، وفي هذه الحالة يجب على المعالج أن يفكري في كيفية أو أسلوب التعامل مع هذه الأسرة. إن هذا قد يعني تأسيس فهم مختلف جداً للمشكلة بالمقارنة مع وجهة نظر المرشد، وفي هذه المرحلة قد يكون من المناسب للمعالج أن يقول الكلام التالي:

"حسناً أنا أقدر امتعاضكم لرؤيتى، وأنتم أنتم لم ترحبوا في طلب المساعدة مني ولكنني بما أنت الآن سوية قد يكون من الأفضل لنا أن نبحث في سبب فرض الاستشارة عليكم".

في مراحل التشخيص الأولى تجمع الآراء على أنه من الأفضل أن يتبنى المعالج دور حيادي تماماً، حيث يجب عليه أن يعمل كباحث تجريبي متعاون، والعملاء يؤدون دوراً هاماً وفعالاً في توضيح المشكلات التي يعانون منها؛ إن دور

المعالج كخبير ووجه واثق من نفسه في اتخاذ قراراته يمكن أن يدخل هذا الدور في مرحلة التخطيط للعلاج أو قبل ذلك إذا تطلب الموقف ذلك.

إن الانتقال من دور المعالج الحيادي إلى دور المعالج الخبير أسهل بكثير من الانتقال من دور المعالج الحيادي إلى دور المعالج الخبير أسهل بكثير من الانتقال بالعكس من دور الخبير إلى دور الحيادي إذا فرض على المعالج الخبير أن يلعب دور الخبير في مراحل مبكرة من العلاج، عندئذ يجب عليه أن يقول للعائلة مايلي:

"أنا أدرك أنكم تريدون المساعدة بسرعة وأنا أتفق معكم بالتأكيد على أهمية هذا الأمر، ولكن دحتاج أن نجمع كل المعلومات ذات الصلة قبل أن نتأكد من كيفية المتابعة في العلاج".

12) خفض القلق:

إن الأعراض المزعجة المصاحبة للمخوف المرضي من المدرسة غالباً ما تؤدي بالطفل والأبوين والمعلمين إلى دوامة من القلق، وفي الوقت الذي يتم اللجوء فيه إلى المساعدة الخارجية، يكون كل الأطراف المشاركة في العلاج متورون ومتهمون بشكل كبير، ومنذ البداية يحتاج المعالج أن يفكري في بناء علاقات يسعى من خلالها إلى تخفيض القلق المحيط بالمشكلة وإن الانتباه للنقاط التالية قد تبين أنها مفيدة لالمعالج من خلال مايلي:

1. حاول أن تتعامل مع العملاء بأسلوب يظهر أنك "لست متسرعاً" أو على عجلة من أمرك..
2. تمعن بدقة في كل القضايا المطروحة، وإن الانتباه للتفاصيل من الممكن أن يطمئن العميل، والعمل من خلال كل القضايا المتنوعة والمئوية يمكن من خلالها خفض الحساسية تجاه بعض المشكلات.
3. اسع دائماً إلى التوضيح إذا اقتضت الضرورة، على سبيل المثال: "لست متائداً" من أنتي فهمت ما تقصد. هل باستطاعتك أن تتكلم أكثر عن هذا الأمر؟"

وحاول أن تعيد شرح ما قاله العميل وذلك للتأكد من أن المعنى قد وصل إليك بشكل جيد، على سبيل المثال: "أنت إذا" تريد أن تقول كذا وكذا ..".

إن هذا من شأنه أن يوصل رسالة إلى العميل أن ما يقوله مفهوم جداً للمعالج أي لك وممكن هنا للعميل أن يصحح إذا وجد أن هناك سوء فهم من جانبك.

1. يجب عليك أن تساعد الآباء على شرح المشكلات التي يعاني منها طفلاهما على أنها مؤقتة ومفهومة من وجهة نظر التطور الطبيعي. اشرح لهم نموذج الضغط المضاد، وأشركهم في شرح كيف يمكن للخوف المرضي من المدرسة أن يتطور. وحاول أن تشجع الآباء للنظر إلى الخوف المرضي من المدرسة على أنه خبرة تعلم بالنسبة للطفل وذلك بأن تقول لهم: "هناك أوقات عديدة في الحياة يمكن أن تكون صعبة على الإنسانوإنك إذا ساعدتمن طفلهما على تجاوز هذه المشكلة فإن هذا من شأنه أن يكون بمثابة تحضير الطفل لواجهة الضغوط والتجارب الصعبة في المستقبل". وبالمقابل إذا لم يتم علاج الخوف المرضي من المدرسة فإن الطفل سيتعلم تجنب أية عقبة أو مشكلة تظهر له في مستقبل حياته بدلاً من مجابتها وإيجاد حل لها.

2. حاول أن تساعد الآباء على تقليل مشاعر الذنب التي قد يشعرون بها تجاه أي تقصير يحق طفلاهما، إن العديد من الآباء يلومون أنفسهم ويعتبرون أنفسهم سبباً في الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها أطفالهم. إن بعض الآباء قد يقولون: "السبب الرئيسي للصعوبات التي واجهت ابني هو أنا". عندئذ يسدو ضرورياً أن تتدخل وتقول للأبوين: "أنت لم تتعتمدوا أن تفعلوا ذلك وبالتالي لا داعي لكني تلوموا أنفسكم كثيراً". هنا من جهة ومن جهة أخرى إن المشكلات التي عانى منها طفلكما ليست جميعها بسببكما: بالأطفال مختلفون مزاجياً منذ الولادة، هناك من الأطفال من يولد وهو أكثر حساسية وعرضة للتاثير من غيرهم وإن هذه التغيرات العقلانية قد تساعد الآباء على التخفيف من حدة مشاعر الذنب تجاه طفلاهما.

3. كن مرحًا قادرًا على الاستطاع، فإذا كنت جدياً "كثيراً" وتأخذ الأمور بمنتهى الجدية فإليك عن غير قصد ستساهم في تعزيز التوتر والقلق عند فريق العمل المشترك في العلاج، وعلى التقىض من ذلك إذا كنت مرحًا" للغاية ودائماً المزاج والضحكة فإن هذا قد يوحي بأنك غير مهم ولا تأخذ الأمور على محمل الجد، لذلك فالاستخدام الفعال والمدروس للمزاج يمكن أن يكون ذو فائدة كبيرة.

(13) الأمور التي تتعلق بمحظى العلاج:

إن الفصول السابقة قد ركزت على الشروط السابقة للعلاج، والأمور التي من المحتمل أن تعيق أو تعرّض جمع المعلومات الكافية ذات الصلة وذلك للتخطي في العلاج الفعال. إن هذا القسم سيرتكز أو سيلقي الضوء على أنواع الأسئلة التي تحتاج إلى البحث ونوع الأحداث التي من الشائع أن تثير أو تبقي على الخوف المرضي من المدرسة.

إن استخدام استماراة سجل الخوف المرضي من المدرسة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتسجيل المعلومات. ونموذج لهذه الاستماراة معروض في ملحق هذا الكتاب. لكي يتم الاستفادة بالشكل الأمثل من استخدام المقابلة الأولية مع الطفل وأبويه من المفيد أن تحصل على معلومات مفصلة مسبقة من المدرسة ومن المؤسسات الأخرى المشتركة في أمر هذا الطفل، وخلال مراحل جمع المعلومات، يحتاج الطبيب النفسي لتوضيح الوصف غير الواضح بشكل دائم؛ وذلك حتى يتم فهم كل القضايا والشكالات ويتم القبول بها من قبل الأطراف المشتركة جميعها.

توجيهات وإرشادات:

يبدو من العرض الذي قدمناه عن الخوف المرضي من المدرسة لدى الطفل باعتباره يمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تشكل مصدراً من مصادر الضيق للعاملين في المدرسة والأسرة والطفل، وهذا السلوك الذي يظهر لدى الطفل

قضايا تشخيصية وعلاجية

والمتجلّي في رفضه النهاي إلى المدرسة - نتيجة لأسباب كثيرة - متذرعاً بحجج وشكاوي بدئية في الغالب، سوف ينعكس هذا على توافقه النفسي والاجتماعي وتحصيله الدراسي إذا لم يعالج بشكل فوري.

إن المرشدين في المدرسة الابتدائية يجب أن يكونوا على وعي جيد بهذه المشكلة التي تبدو لدى بعض الأطفال في سن حياتهم الأولى، وخصوصاً في عمر المرحلة الابتدائية من التعليم، وذلك حتى يتعاملوا مع الطفل الرافض للمدرسة بشكل يساعدهم على العودة إلى المدرسة بشكل طبيعي.

أما الأمور التي يجب على المرشد النفسي المدرسي أن يأخذها بالاعتبار هي التالية:

أولاً: يجب أن يتلقى الطفل الخائف من المدرسة اهتماماً مباشراً. فكلما بقيت مشكلة لفترة زمنية أطول دون تدخل أو معالجة، كلما أصبحت مزمنة ومستعصية للحل، لذلك فعلى العاملين في المدرسة جميعهم بما فيهن المرشد النفسي المدرسي أن يكونوا يقظين للأعراض والعلامات الأولى للخوف من المدرسة مثل: التذمر الشكاوي الجسدية والغياب المتكرر.

ربما يلاحظ المربيون والمرشد أن الطفل الذي يتغيب من (2-3) أيام في الأسبوع، ولكن الربط بين عمليات الغياب هذه والخوف من المدرسة يمكن الاتساع إذا استطاع المرشد مراقبة أو ملاحظة هذه المشكلة، فإن هذا الأمر الذي يقوم به المرشد المدرسي يجب للأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة من مسائل كثيرة. لذلك على المرشد أن يقوم ببرنامج تدريسي مختصر كجزء من الاجتماعات السنوية التي تعقد قبل بداية السنة الدراسية، وأحياناً في منتصف السنة الدراسية لاباء الأطفال والمعلمين لتعريفهم بهذه المشكلة وكيفية التخلص منها.

ثانياً: وحسب رأي "فورست" (1969) فإن المعلمهون المفتاح لحل مشكلة رفض المدرسة لدى الأطفال الذين يعانون منها فلما علمنوه يجب أن يكونوا واعين بأن الجو المدرسي يجب أن يكون معززاً إيجابياً للأطفال من أجل التخفيف من مخاوفهم،

وخصوصاً مخاوف الانفصال عن الوالدين. ويجب أيضاً على المعلمين أن يشجعوا على أن يكونوا حازمين وصبورين ولطيفين عند الاحتكاك بالأطفال، من أجل أن يشعروا بالأمان في ظل هذا المناخ الدافع إلى الأمان، إضافة إلى ذلك فعل المرشد النفسي المدرسي أيضاً أنيساعده في ذلك من خلال تشجيع المعلمين على اتباع الممارسات التربوية الجيدة أثناء تعاملهم مع الأطفال الذين يعانون من الخوف المرضي من المدرسة، وإقامة ندوات للمعلمين يشرحون من خلالها الأساليب التربوية والنفسية المناسبة أثناء التعامل مع الطفل، كما ينبغي عليه (أي المرشد المدرسي) أن يقوم بدور الاستشارة النفسية للأباء بخصوص سلوك ابنائهم الرافض للمدرسة.

ثالثاً، يجب على المرشدين أن يتوجهوا طريقة انتقائية لعلاج الخوف المرضي من المدرسة، وأن يكوثوا مقتنيين بأراء كل الأفراد الذين لهم صلة بالطفل (المعلم والأب والأم)، وأن يأخذوا هذه آراء بعين الاعتبار عند وضع المخطط العلاجي للطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة. أما أهم الإرشادات النفسية والتربوية للأسرة والمعلمين من أجل حل مشكلة الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة، فيمكن إجمالها في الآتي:

أولاً: ما يخص الأسرة:

- إذا كان عصاب الطفولة هو الخوف المرضي بأشكاله المختلفة - كما يقول العلماء - فإنه ينبغي على الآباء فهم نفسية الطفل في مراحل نموه المختلفة، وتجنب تخويف الطفل بالمعلم أو بغرفة القيثان لأن هذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى رفض الطفل كلياً الذهاب إلى المدرسة.
- العمل على إكساب الوالدين لأطفالهم اتجاهات إيجابية نحو المدرسة، لأن في هذا الأمر ما يساعدهم (أطفالهم) في تقليل حالات الغياب المتكررة عن المدرسة.
- يقوم الآباء في بعض الأحيان دون قصد بتعزيز الخوف المرضي من المدرسة لدى أطفالهم من خلال الاهتمام الزائد بالأعراض المرضية المصاحبة للخوف من المدرسة، لذلك يجب على الآباء التوجّه مع الطفل إلى الطبيب قبل وبعد

قضايا تشخيصية وعلاجية

- الدوام المدرسي فقط، أما الذهاب إلى الطبيب أثناء ساعات المدرسة فقد يشجع هذا الأمر على تغيب الطفل عن المدرسة.
4. يجب على الوالدين التحدث مع طفلهما الرافض للمدرسة بغية تحديد مصدر مخاوفه والعمل على معالجتها بأسلوب علمي.
5. إذا لاحظ الأب أو الأم أن الأعراض المرضية التي يتذمّر بها الطفل من أجل عدم رغبته في الذهاب إلى المدرسة على أنها أعراض غير حقيقة أو أعراض متوجهة (بناء على الفحص الطبي) فينبغي على الآباء في هذه الحالة إيجار الطفل على الذهاب إلى المدرسة، لأن الطفل في بعض الأحيان قد يأخذ قلق الوالدين بشأن وضعه كتجربة مشروع يعزز رفضه للذهاب إلى المدرسة والبقاء في المنزل إلى جانبيهم.
6. إذا استمرت المشكلة لدى الطفل لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر فيجب على الوالدين عرض الطفل الرافض للمدرسة على المرشد النفسي، لأنها ربما تكون مشكلة انفعالية بشكل حقيقي تستدعي التدخل السريع لحلها.
7. على الوالدين أن يهياً الطفل للالتحاق بالمدرسة من خلال حديثهما عنها ويصحّيّاه إيماءً عدة مرات قبل بدء الدراسة، ويعزفاه على بعض الرفاق الذين سيذهبوا معه سوية إلى المدرسة وخصوصاً أطفال الجيران.
8. أن يبدي الوالدين أقل قدر ممكن من الاهتمام بالأعراض الجسمية التي يشكوا منها الطفل الخالق من المدرسة إذا تأكّداً من سلامته العضوية، لأن آية جرعة زائدة من العطّاف من جانب الأم القلقة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.
9. ينبغي على الوالدين أن يكونا حازمين وصارميين في قرارهما بخصوص انتظام الطفل في الذهاب إلى المدرسة، وغير مدّعين أو معزّزين لأي سلوك يرتبط برفض الطفل الذهاب إلى المدرسة مثل: الشكاوى البدنية المختلفة التي يعبر عنها الطفل لحظة ذهابه إلى المدرسة، إذا كانا على يقين تام بسلامة ابنهم الصحية.
10. من واجب الوالدين معرفة قدرات وأمكانات أطفالهم، وعدم مقارنة أدائهم بأداء الآخرين، لأن هذه المقارنة قد تخلق عند أطفالهم شعوراً بالعجز، وضعف الثقة

- بالإضافة، وهذا الأمر يعده مناخاً خصباً لخواوف الطفل من المدرسة وانخفاضاً في أدائهم التحصيلي.
11. إذا كانت البيئة الأسرية مستقرة من الناحية الاجتماعية والنفسية، فإنها تخلق عند الطفل شعوراً بالانتماء، وتعزز ثقته بنفسه وبآخرين، لذلك يجب على الآباء الابتعاد عن التصريحات والخلافات مع بعضهم بعضاً داخل المنزل أسام الأطفال؛ لأن هذا يفقد الطفل ثقته بنفسه ويمن حوله، وهذا ما يعزز خواوفه من البيئة المحيطة به.
12. يجب أن تكون سلطة الوالدين موجهة ومحببة لسلطة مستبدة قائمة على القمع والتخييف، لأن السلطة القائمة على المحبة والود تخلق إنساناً آمناً قادرًا على التوافق مع الظروف المختلفة.
13. الاهتمام بتوعية الآباء بالشكلات النفسية المختلفة التي يتعرض لها الأبناء، وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال عقد الندوات وتوزيع النشرات الخاصة بذلك من قبل المرشد النفسي المدرسي في بداية كل عام دراسي، وهذا الإجراء من شأنه أن يصنع جسراً بين المدرسة والمنزل حماية للطفل من الوقوع في حبائل الاضطراب النفسي التي لا تحمد عقباه.

ثانياً: فيما يتعلق بالمدرسة:

1. وإذا كان مفتاح الحل لمشكلة الطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة تكمن في المدرسة أو المعلم - كما ذكرنا سابقاً فإنه ينبغي أن تتوفر فيه الصفات الشخصية والمهنية والاجتماعية والنفسية التي تساعده على تجاه مهمته كمربٍ، وأهم هذه الصفات: الثبات أو الاتزان الانفعالي والشعور بالأمن وقدرته على تقبيل التلاميد ومعاملتهم معاملة حسنة وتكوين علاقة طيبة معهم في مناخ يسوده التقبل والثقة المشتركة.
2. الاهتمام بالإعداد المهني والأكاديمي للمعلم، والذي يساعد هذه الأمور على مواجهة المشكلات التي تظهر لدى الأطفال بطريقة حكيمه أو الكشف المبكر عن هذه المشكلات من أجل إحالتهم إلى المرشد النفسي المختص.

قضايا تشخيصية وعلاجية

3. ينبغي على المعلم تجنب العقاب القاسي والشديد في السن المبكرة من عمر الطفل حتى يتتجنب احتمال ظهور المخاوف التشريعية لدى الطفل تجاه المدرسة.
4. على المعلمين تزويد التلاميذ بـ المواقف والخبرات التعليمية الصحيحة بأسلوب تربوي ونفسي مريح ومتنااسب مع قدرات التلاميذ وميولهم التي عن طريقها تحبب التلاميذ بالتعلم، وبالتالي تزيد ثقتهم بالمدرسة التي ينتمون إليها.
5. جعل العلاقة بين الطفل والمعلم قائمة على الحب والود والتعاون؛ لأن الطفل بحاجة إلى الحب والانتماء والأمان يقدر حاجته لرغيف الخبز وخاصة في هذه المرحلة العمرية بالذات.
6. الاهتمام بالصحة النفسية والتربوية لأطفال المدارس الابتدائية، وذلك عن طريق الأفلام والمناهج البسيطة - البعيدة عن الحشو والتكرار بهدف تعريف الطفل بالعادات والسلوكيات السليمة، مع تعريفهم بالمشكلات التي قد يتعرضون إليها في هذه المرحلة العمرية، والعواقب الوخيمة الناجمة عن هذه المشكلات.
7. ينبغي على المدرسة تأمين سجلات ملاحظة (بطاقات ملاحظة - خاصة بكل تلميذ)، وهذه السجلات تعنى بمسائل الصحة النفسية والتربوية لكل تلميذ من تلاميذ المدرسة بهدف مساعدة المرشد النفسي في المدرسة على تحديد بداية ظهور المشكلة، على أن يتم تغذية كل سجل بالمعلومات عن طريق: المعلم، الأقران، الأخصائي الاجتماعي، الوالدين، المرشد النفسي.
8. ينبغي على المربين جعل جو المدرسة والفصل الدراسي جوًّا اجتماعياً محبياً للתלמיד يسوده الحب والمشاركة، والحرية، والتعبير عن النفس، وذلك من خلال الأنشطة المدرسية المختلفة التي تهدف إلى مواجهة حاجات التلاميذ وإشباعها بالطريقة المثلث.
9. توفير الرعاية الصحية على مستوى النفسي والتربوي لتلاميذ المدارس الابتدائية وذلك من خلال وجود المرشد النفسي المدرسي في هذه المرحلة التعليمية أسوة بمرحلة التعليم الشانوي والإعدادي، لأن لكل مرحلة عمرية

مشكلاتها، ومتطلباتها، و حاجاتها، وإذا عرفنا أن هناك (5%) من التلاميذ المدارس الابتدائية يعانون من مشكلات مختلفة ومن ضمنها المخاوف بأشكالها المتعددة أدركنا أهمية وجود المرشد النفسي المدرسي في مرحلة التعلم الأساسي.

10. إنشاء العيادات النفسية الخاصة بمعالجة مشكلات الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة على أن تقوم وزارة التربية وكليات التربية بالإشراف على هذه العيادات أو المركز الإرشادي بحيث تهدف هذه المراكز الإرشادية إلى تقديم الخدمات الإرشادية والعلاجية للأطفال ووضع الحلول المناسبة لمشاكلهم المختلفة.

ثالثاً: المرشد النفسي المدرسي:

1. تشجيع الوالدين على ضرورة إجبار الطفل على الذهاب إلى المدرسة مع التوضيح لهم أن مخاوف طفلهما ستحتفي تدريجياً إذا عولجت العلاقات الاعتمادية بين الطفل والديه بشكل سليم.
2. تحجب التركيز على الشكاوى الجسمية إذا كان الوالدين متأكدان من سلامة حالة طفلهم الصحية.
3. تشجيع الوالدين على رؤية الخوف من المدرسة كخبرة تعلم بالنسبة للطفل، لأن هناك الكثير من الأحداث في الحياة يمكن أن تعالج.
4. مساعدة الوالدين على عقلنة مشاعرهم التي يعيشونها، لأن بعض الآباء يلومون أنفسهم عن المشكلات التي تحدث لأطفالهم.



الملاحق
أدوات تشخيصية وتطبيقية

ملحق (1)

استماراة تشخيصية للمخوف المرضي من المدرسة

الاسم: تاريخ المقابلة:

تاريخ الولادة: باليوم الشهر السنة:

المدرسة: الصفة:

العنوان: رقم الهاتف (إن وجد):

وصف المشكلة والصعوبات المتعلقة بها:

قصة ونموذج الخوف من المدرسة:

(1) كم امتدت الفترة التي رفض فيها الطفل المدرسة؟

العدد بالأسابيع:

(2) هل هذه المرة الأولى لرفض الطفل للمدرسة؟ نعم / لا

(3) هل هناك قصة حضور قليلة دون مبرر لرفض المدرسة؟ نعم / لا

(4) هل هناك ذكريات سابقة للمخوف من المدرسة؟ نعم / لا

(5) في أي عمر كان ظهور المشكلة للمرة الأولى؟

(6) كم عدد مرات الخوف من المدرسة التي عانى منها الطفل في الماضي؟

(7) الحضور التفصيلي المسجل للعام الدراسي الحاضر والعام الماضي؟

أنواع تشخيصية وتطبيقية

(8) هل هناك أي مظاهر نظامي تنموذج حضور المدرسة متعلق بقضايا مدرسية أو منزلية؟ نعم / لا

(9) كم شدة الصعوبات السابقة وكيف تم حلها؟

(10) هل يبقى الطفل بعيداً عن المدرسة مع موافقة الوالدين في بعض المراحل؟

نعم / لا

(11) عند عطلة المدرسة هل يبقى الطفل في البيت؟ نعم / لا

إذا أجاب الطفل بنعم:

..... من الشخص الذي يبقى معه؟

..... وماذا يفعل؟

أعراض مرافقته:

(1) هل المحاولات لحضور الطفل إلى المدرسة أدت إلى:

أ. المعاناة بالشعور بالمرض بدون سبب عضوي واضح؟ نعم / لا

ب. البكاء والاحتجاج (الرفض)؟ نعم / لا

ج. علامات جسدية للقلق مثل: شحوب الوجه، الارتعاش، قيء، الهرب بشكل

مفرغ؟ نعم / لا

د. ثورات غضب مزاجية شديدة؟ نعم / لا

هـ. نوم عام والاكتئاب؟ نعم / لا

و. لا يوجد قلق وتوضح؟ نعم / لا

(2) هل يأكل الطفل بشكل طبيعي؟ نعم / لا

(3) هل ينام الطفل بشكل طبيعي؟ نعم / لا

الملاحمق

- (4) هل عادات التقوط طبيعية؟ نعم / لا
- (5) هل يبخل الفراش أو لديه مشكلات بوال متكررة؟ نعم / لا
- (6) إذا كان لدى الطفل أي شكاوى مرضية لاحظ الأعراض وذكرها بشكل مفصل
- (7) هل يظهر لدى الطفل أي دليل لاضطراب سلوكي: حذب مستمر، التجول بعيداً عن البيت، السرقة، التحطيم، فعاليات جنسية غير مناسبة؟ نعم / لا
- إذا أجاب الطفل بنعم:

شرح هذا الاضطراب الذي يشكو منه الطفل بالتفصيل.....

قضايا طبية:

- (1) هل لدى الطفل أعراض جسدية؟ نعم / لا
- (2) هل تم استقصاء أعراض الطفل الجسدية بشكل دقيق؟ نعم / لا

إذا أجاب الطفل بنعم:

- أ. هل الطفل لائق صحياً للمدرسة؟ نعم / لا
- ب. ما المدة التي أعد فيها الطفل من أجل المدرسة؟ شهر أو أكثر
- ج. هل نتائج الفحوص الطبية كاملة؟ نعم / لا
- د. هل تم إتمام نتائج الاختبارات الطبية؟ نعم / لا



سلوك الطفل في المنزل:

- (1) في البيت، هل الطفل عادةً عنيد، حزور، متسائل، مطبع، مستكين، مكتتب، نائم، غير أنيس (لطيف العرش)؟ اذكر ذلك:
.....
- (2) هل هناك أي انفصال متعلق مع احترام للأب - الأم - أعضاء الأسرة الآخرين؟
نعم / لا
.....
- (3) إذا أزيل الضغط لحضور المدرسة، فهل يظهر سلوك الطفل في المنزل بشكل طبيعي؟ نعم / لا
.....
- (4) هل يستطيع الطفل أن يمشي قريباً من بوابات المدرسة في الليل أو في عطلة نهاية الأسبوع دون أن يظهر أي علاقات للتوتر؟ نعم / لا
.....
- (5) هل لدى الطفل اتصال طبيعي مع الأقران في الأمسيات، أو في عطل نهاية الأسبوع؟ نعم / لا
.....
- (6) ماذا يحدث في كل صباح قبل ذهاب الطفل إلى المدرسة، صفة بشكل دقيق
.....

تفاصيل القلق المتعلق بالبيت:

- مرض جسدي عقلي لدى: الأب، الأقارب المقربين جداً من الطفل، الأصدقاء، حيوانات الأليف.
- موت الأب - موت أحد الأقارب - موت أحد الأصدقاء
- اهتمامات صحية مع احترام وتقدير للطفل.

قضايا القلق الاجتماعي:

- الانفصال المفاجئ عن الأم.
- الانفصال المفاجئ عن الأب.
- الانفصال المفاجئ عن الأصدقاء الحميمين أو الأقارب (كما يحدث عند تغيير المدرسة أو البيت).

الملحق

- عدم التوافق الزوجي (الأسري).
- ولادة طفل جديد.
- طفل أصغر في البيت يتطلب انتباه أكبر.
- أمور أخرى من فضلك حدها ...

قضايا متعددة في البيت:

- حوادث (مكحريق في البيت).
- قلق مادي.
- قضايا أخرى من فضلك حدها.

تفاصيل القلق المتعلق بالمدرسة:

- أن يكون الطفل منزعجاً أو معاقباً.
- أن يكون متذرياً من نشاطات رياضة.
- مرض أثناء النهاب للمدرسة.
- قضايا أخرى من فضلك حدها.

قضايا القلق الاجتماعي في المدرسة:

- تغيير المدرسة.

هل حدث هذا من قبلنعم / لا

- الامتحانات - الاختبارات.

(أية مشكلات في هذا المخصوص)نعم / لا

- تسميع في الفصلنعم / لا
- أن يكون الطفل منبوذاً من المدرسیننعم / لا

- يعمل أخطاء داخل الصفنعم / لا
- يكره مدرسين معينيننعم / لا
- تغير المعلم بمعلم آخرنعم / لا
- الإغاثة في باحة المدرسة من قبل الرفاقنعم / لا
- الشعور بالوحدة في ساعات: القداء، الفرص (الفسحة)نعم / لا
- الانفصال المفاجئ عن الأصدقاء (كتغير المجموعة - الفصل - المدرسة) أو تكونه في مجموعة دراسية عالية المستوى أو في مجموعة دراسية منخفضة المستوىنعم / لا
- الضجيج (بمعنى أن الطفل يتضايق من الأصوات العالية)نعم / لا

قضايا الرهاب المتعلقة في البيت:

- (1) هل الوالدان يعانيان بشكل مفرط من:
 - ا. شكاوى عضوية نفسيةنعم / لا
 - ب. قلق بسيط متعلق بالمدرسةنعم / لا
- (2) هل الطفل سعيد؟نعم / لا
 - ا. هل يتمتع الطفل بحرية شخصية أكبر في البيت؟نعم / لا
 - ب. هل يتلقى الطفل تهديدات خاصة عند انتهاء المدرسة؟نعم / لا
- (3) هل الآباء غير قادرین أو لا يريدون أن يأخذوا الطفل إلى المدرسة؟
 - نعم / لا

إذا كانت الإجابة بنعم:

صف هذا الأمر بشكل كامل.....
.....

السلاحق

(4) قضايا أخرى:

(ا) قضايا الحماية (الرعاية) المتعلقة بالمدرسة:

1. هل مكان الطفل في المدرسة غير مناسب؟ بسبب:
.....نعم / لا
2. رفض الإدارة.....نعم / لا
3. وجود ندله لا يغليه يكون له صعوبات مع المجموعة.....نعم / لا
4. صعوبات واسعة مع المنهج المدرسي.....نعم / لا
5. يحتاج لأن يقطع مسافة غير معقولة للوصول إلى المدرسة.
.....نعم / لا
6. قضايا أخرى.

(ب) العائلة: (البنية والعلاقات):

1. من الذي يعيش الطفل معه: الأم، زوج الأم، زوج الأب، مشارك لآخرين.
2. عدد الأخوة والأخوات: ذكور.....إناث:
3. الوضع في الأسرة: مستقر، غير مستقر.
4. هل للأسرة صلات وثيقة مع:

- جدته من جهة الأم. () جده من جهة الأم. ()
- جدته من جهة الأب. () جده من جهة الأب. ()

5. علاقات والديه (بين الأب والأم):

- علاقة جيدة () – عدم توافق ()
 - طلاق () – انفصال ()
- أب يعيش وحيداً من خلال موت الزوج أو الزوجة نعم / لا
- يعيش الآباء المنفصلون قريباً من بعضهما، نعم / لا

6. هل يرى الآباء المنفصلون أو المطلقون بشكل:

- متكرر ()
- من وقت لآخر ()
- أبداً ()

7. مظاهر مهمة أخرى:

عوامل متعلقة بالآلام والآباء:

(1) ميزات الأبوين:

التكبر، الحماية الزائدة، عدم التأثير، عصبيين، قصة مرض عقلي، يشعر بالذنب

متكييف بشكل حسن.

(2) هل هناك حوادث ذات معنى في قصة الأم تشير إلى:

فرط الحماية - فرط الملاطفة.

ا. هل الطفل المرغوب فيه بشكل كبير من قبل الوالدين؟.....نعم / لا

ب. سيرة مرض مهدد لحياة الطفلنعم / لا

ج. مصاعب في الحمل.....نعم / لا

د. فقد سابق لطفل.....نعم / لا

ه. مشكلات عقم سابقةنعم / لا

و. قصة اصحثاب بعد الولادة أو المشكلات نفسية أخرى.....نعم / لا

ز. خبرات غير ملائمة في طفولة الأم الخاصةنعم / لا

ح. علاقة زوجية غير سعيدة.....نعم / لا

ط. قضایا انفصال غير محلة بالنسبة لأبوی الأمنعم / لا

الملحق

- ي. ذكريات مؤلمة (للام) من أيام المدرسة.....نعم / لا
 ك. خبرات انفصال مؤلمة.....نعم / لا
 ل. أمور أخرى.

(3) هل هناك حوادث ذات معنى في سيرة الأب لها تأثير على مصاعب الطفل
 ومصاعب عائلية أخرى.....نعم / لا

- ا. ذكريات مؤلمة (للام) في أيام المدرسة.....نعم / لا
 ب. قصة غير ملائمة مع الآبويننعم / لا
 ج. متطلبات عمل شاق (ساعات عمل طويلة وغير نظامية، مكان العمل بعيد)
 د. مشكلات زوجية.
 ه. مشكلات طبية (صحية)
 و. مشكلات أخرى.

دافع الآبوين لحل مشكلة خوف الطفل من المدرسة:

(1) موقف الآبوين من رفض الطفل للمدرسة:

- غير مهمتين () - بالتعاطف مع الطفل ().
- قلق شديد () - التقلب وعدم الثبات ().
- أمور أخرى.

(2) هل الوالدان أو أحدهما راغبان في تلقي المساعدةنعم / لا

..... إذا أجابوا بـلا، فلماذا؟

(3) هل لدى الوالدين ثقة في المدرسة التي يدرس فيها طفلهما وبالقائمين عليها؟
نعم / لا

..... إذا أجابوا بـلا (لا) فلماذا؟

MOHAMED GHATAB

4) هل لدى الوالدين ثقة في المدرسة الجديدة والقائمين عليها؟.

نعم / لا.....

5) هل هناك أحد من الأطفال الآخرين في الأسرة قليلي الحضور في المدرسة؟

نعم / لا.....

6) ما الخطوات التي اتخذها الوالدان لحل المشكلة؟.

7) وما النتائج الناجمة عن ذلك؟

8) هل هناك ضغوط أسرية إضافية، مثل:

- مرض عند الأم، الأب
- قلق مادي
- ضغوط عمل
- مشكلات مع الأطفال الآخرين، والأقرباء
- أمور أخرى.

المدرسة:

• رغبة الإدارة في التغلب على مشكلات التلميذ.

• موقف الإدارة تجاه مشكلة الطفل:

رمزية - واقعية - قلقة - غير ثابتة - غير متعاونة - رافضة - أمور أخرى.

• أي أعضاء هيئة التدريس الأكثر اهتماماً بحل مشكلات الطفل؟

• ما الخطوات التي اتخذها مدرسون الطفل لحل المشكلة؟

تنظيم المدرسة:

• من الشخص المسؤول في المدرسة؟.

• هل هناك ثبات في تغيير بيت الطفل أو مجموعة التدريب؟.

• هل يغير الطفل المجموعات من أجل موضوعات نوعية؟

الملاحم

الطفل:

أ) الميزات الشخصية والعقلية:

يضم على أساسه معلومات الاستبيان وتعليقات المعلم.

1. لاحظ السلوك في المدرسة والبيت.
2. لاحظ تفاصيل الذكاء.
3. تفاصيل الإدراك - مساحة القوة والضعف.
4. ميزات الشخصية.

ب) الموقف من الخوف المدرسي:

- هل يتقبل الطفل أن هناك مشكلة
- كيف نظرته لتجنب المدرسة
- هل استجابته معقولة لمطالبات وضفوط غير معقولة؟
- كيف يشعر الطفل بالوضع وكيف يكون حله؟

التاريخ الدراسي:

- المدارس التي درس فيها التاريخ المشكلات
- حوادث ذات مغزى في الحياة الطفل.
- مشكلات أثناء الولادة.
- انفصام الأب والأم.
- مرض حقيقي.
- قصة خوف مربها الطفل في السابق.
- قصة مشكلات نفسية جسدية - شقيقة - الريو الخ.
- معالجات سابقة
- الأخصائيون الذين تم استشارتهم

- المعالجة والنتيجة
- ملاحظات أخرى:

/ / / التاريخ:

المرشد النفسي



ملحق (2)

استماراة المقابلة الإكلينيكية

(خاصة بالطفل الذي يعاني الخوف المرضي من المدرسة)

أولاً، بيانات عامة:

..... الجنس العمر:

المدرسة: الصفة الشعبة:

ثانياً، العلاقة بالوالدين: (الأسئلة بلغة الطفل)

- كلامني عن أبوك، هل هو بيعمل أم لا؟
- كيف صحته؟
- كلامني عن علاقتك مع أبوك؟
- ياترى كيف بعاملك أبوك بقسوة أم بحب واحترام.
- أنمك بتعمل أم لا؟
- إذا كانت تعامل ما هو عملها؟
- كلامني عن صحة أمك هل هي جيدة؟
- كيف بتعاملك أمك في البيت بقسوة أم بحب وحنان؟
- يا ترى مين بتتحسن أنك قريب منه أكثر من الآخر أبوك أم أمك، ولماذا؟

-
- ومنين بتتحسن أنك بعيد عنه؟ ولماذا؟
 - ياترى من هو القاسي عليك أكثر من الآخر، أبوك أم أمك؟ ولماذا؟

-
- كيف ينظر أبوك إليك؟ هل أنت جيد في نظره أم لا؟
 - كيف ترى صورة والدك؟
 - كيف تنظر أمك إليك؟ هل أنت طفل حليب في نظرها أم لا؟
 - كيف ترى صورة أمك؟ هل هي جيدة أم لا؟

ثالثاً: الأخوة:

- كم عدد أخواتك الأولاد والبنات؟
- اذكرهم واحد واحد من الكبير حتى الصغير؟
- كلمني عن كل واحد منهم، مين فيهم بيشتغل ومين بيدرس؟
- في حد من أخواتك الأولاد أو البنات يبقى مردض كثير؟
- من هو الأخ الذي تحبه أكثر من الآخر؟ ولماذا؟
- مين ياترى من أخواتك الصبيان أو البنات بيتحانق معك أكثر؟
- ياترى كيف علا قتك مع أختك؟ كيف بيعاملوك، وكيف بتعاملهم في البيت؟
- في حد من أفراد أسرتك بتضايق منه؟ ولماذا؟
- هل بتحس إنك مبسوط مع أهلك في البيت؟

رابعاً: مفهوم الطفل عن ذاته:

- أريد منك أن تكلمي عن نفسك
- هل بتحس أن جسمك قوى مثل بقية الأطفال؟
- آيه اللي عايز تعامله لما تكبر (آيه تحب أن تكون لما تكبر)

خامساً: المشكلات النفسية والصحية:

- هل حدث لك أمر سئ في حياتك؟
- هل حدث أن مرضت ودخلت المستشفى؟
- آيه اللي بيخليلك قلقان ومتضايق طول الوقت؟
- هل هناك أشياء بتخاف منها؟
- ما هي؟



سادساً: الاهتمامات:

- مالأشياء اللي بتحبها أكثر من غيرها؟.
- عندما تكون في المنزل ما الأشياء اللي بتحب تلعب بها؟.
- من الذي ترغب أن تلعب معه من أصحابك أكثر الوقت؟ ولماذا؟.

سابعاً: النوم والأحلام:

- خبرني عن نومك، هل بتتلام سويس أو لا؟.
- هل ساعات بتقوم من النوم مفروزة؟.
- هل هناك أشياء دائمًا تحلم بها؟.
- هل هناك حلم معين بتحلم فيه؟.
- حدثني عن حلم بيتكرب في نومك كثير؟.

ثامناً: الخبرات المدرسية:

- كم عمرك لما ذهبت أول مرة إلى المدرسة؟
- كيف كان شعورك وأنت رايك أول مرة للمدرسة؟
- هل كنت بتحب تروح كل يوم؟
- كلمني عن علاقتك مع زميلك في المدرسة؟ في حد منهم بتخاف منه؟
- في حد من زمايلك بيضررك أو بيتخانق معك وأنت في المدرسة؟
- هل بتفكك كثير في البيت لما تكون في المدرسة؟
- آيه اللي بيخليلك متضايق لما تكون في المدرسة؟
- كلمني عن علاقتك مع المعلم... وهل هو سويس معاك أم لا؟
- ياترى آيه الموارد اللي بتحبها أكثر من غيرها... ولماذا؟
- ما الأشياء الحلوة اللي بتحبها في المدرسة؟
- ما الأشياء غير الكويسة في المدرسة؟
- ياترى مين أكثر واحد بتحبه في المدرسة؟ ومنين أكثر واحد بتكرهه؟

أدواء تشخيصية وتطبيقية

- متى بدأت تكره المدرسة .. ولماذا؟
- في أشياء بتمعنـك من أنت تردد المدرسة ... آيه هيه؟
- سلمـني من المسؤول عن مشكلاتك في المدرسة؟

ملاحظات أخرى:

المرشد النفسي



الملاحق

ملحق (3)

استماراة دراسة الحالة (خاصة بأم الطفل)

بيانات عامة:

اسم التلميذ.....العمر.....الجنس: ذكر / أنثى

الصف الدراسي:المدرسة:

عمر الأم.....عملها:المستوى التعليمي:

عمر الأب:عمله:المستوى التعليمي:

الأسئلة التالية تجيب عنها أم الطفل:

(1) كم عدد الأولاد الذكور والإناث لديك؟ اذكرهم بالترتيب حسب ميلاد كل

واحد منهم:

الاسم	الجنس	العمر	العمل المدرسة	مستوى التعليم	ملاحظات أخرى
					1
					2
					3
					4
					5



(2) ما ترتيب طفلك الذي يخاف من المدرسة بين أخوته؟

الأول، الثاني، الثالث، قبل الآخرين، الآخرين.

(3) ما المدة الفاصلة بين كل حمل وآخر؟

سنة، سنتان، ثلاث، أكثر من ثلاث.

(4) هل تعرضت لأية أمراض حادة أثناء حملك بهذا الطفل؟ نعم / لا / أحياناً

(5) هل كان الحمل بهذا الطفل مرغوباً به من قبلك ومن قبل الوالد؟ نعم / لا

(6) هل جاء الحمل بهذا الطفل بعد عقم طويل؟ نعم / لا /

(7) كيف كانت طبيعة الولادة بهذا الطفل؟ طبيعية، حسراً

(8) أين تمت الولادة؟ المنزل، المستشفى

(9) هل مررت بأية مشكلات صحية بعد الولادة؟ نعم / لا

(10) ما الطريقة التي اتبعتها في الرضاعة طفلتك؟ طبيعية، متنامية

(11) ما المدة التي ترضعي بها اطفالك في العادة؟ سنة، سنتان، أكثر من ذلك 12.

(12) ما الطريقة التي تتبعينها في قطام اطفالك عادة؟ بشكل تدريجي، بشكل سريع

(13) ما الطريقة التي اتبعتها في قطام هذا الطفل؟

(14) هل هناك أحد من الأقارب يسكن معكم في المنزل؟ نعم / لا

إذا كانت الإجابة بنعم الأكزي:

مستوى التعليم	المهنة	درجة القرابة	الجنس	العمر	الاسم

الملحق

15) هل حدث وأن حصل في الأسرة أو أقرباء الأسرة حالة وفاة في الفترة التي بدأ يشعر فيها الطفل برفض المدرسة؟ نعم / لا

16) هل عانى الطفل من أية أمراض أو حوادث مؤلمة أثناء فترة الرضاعة؟ نعم / لا

17) هل عانى هذا الطفل من أية مشكلات غير طبيعية في الأمور التالية:

- التسنين.
- الحبو.
- المشي.
- الكلام.
- ضبط عمليات الإخراج (التبول اللاإرادي).

18) إذا كان قد عانى الطفل من أية مشكلة من المشكلات السابقة؛ اذكرى ذلك بالتفصيل.

19) هل اتسم سلوك الطفل في السنوات الأولى من حياته، وقبل الذهاب إلى المدرسة بـ:

- ثورات الغضب.
- البكاء الشديد لأتفه الأسباب.
- الحركة الزائدة (النشاط الزائد).
- الخجل والانطواء.
- العناد الشارد.
- نقص في الانتباه.
- الخوف الشديد من الأشياء الغريبة.
- الجلوس دائمًا بقرب من يحبهم.



..... إذا كان قد عانى من أية سلوكيات السابقة، اذكر ذلك بالتفصيل

(20) هل التحق الطفل بالحضانة؟ نعم / لا

إذا كانت الإجابة بـنعم.

(21) كم كان عمره؟

(22) كيف كانت ردود فعله في اليوم الأول لذهابه إلى الحضانة أو الروضة؟ صفي ذلك:

.....
.....
.....

(23) كم كان عمره عند دخوله المدرسة الابتدائية؟

(24) كيف كانت استجابته للمدرسة؟

.....
.....

(25) هل عانى من مشكلات نفسية أو انفعالية أو اجتماعية في الأشهر الأولى من دخول المدرسة الابتدائية؟ نعم / لا

(26) كيف كان ينظر إلى المدرسة، المدرسين، الأقران في السنة الأولى من المدرسة؟ صفي سلوكه تجاه الآخرين:

.....
.....

الملحق

(27) هل كان سعيداً في تلك السنة؟ نعم / لا

(28) كيف كان مستواه الدراسي؟

(29) متى بدأت مشكلة رفض المدرسة بالنسبة لطفلك بالظهور؟ تحدثي عنها بالتفصيل.

.....
.....

(30) ماهي الأعراض التي كان يشكو منها؟ صفيها بالدقة.

.....
.....

(31) كيف واجهت الأسرة هذه المشكلة لدى الطفل؟

(32) كيف كانت استجابته لتلك الإجراءات المتخذة من قبل الأسرة للحد من هذه المشكلة؟ ..

.....
.....

(33) ما هي الأوقات التي يقل فيها ظهور سلوك الرفض للمدرسة لدى الطفل؟

.....
.....

(34) ماهي الأوقات التي يقل فيها هذا السلوك؟

(35) هل لدى الطفل اخوة اظهروا سلوك الرفض للمدرسة والخوف منها من قبل؟

نعم / لا ..

(36) هل عانى الطفل من أية أمراض قبل ظهور سلوك الرفض لديه؟
نعم / لا

(37) هل هناك أي مشكلات حدثت على الصعيد الأسري قبل ظهور سلوك الرفض
للمدرسة من قبل الطفل؟ نعم/لا

إذا كانت الإجابة بنعم، اذكرى تلمسك المشكلات والأحداث بشيء من التفصيل

(38) عندما يرفض الطفل الذهاب إلى المدرسة هل يبقى في المنزل طوال
النهار نعم / لا

(39) 41- عندما يعود الطفل من المدرسة بحجة أنه مريض، هل تلاحظني زوال
الأعراض المرضية التي تساعد في
نعم / لا

(40) في الإجازات والمعطل، هل يبقى في البيت معظم
الوقت؟ نعم / لا

(41) من هم الشخص المتعلق به الطفل في المنزل؟ و لماذا؟

(42) ما هي الشكوى الدائمة التي يظهرها الطفل كل يوم قبل ذهابه إلى المدرسة؟

(43) عندما يتم إجبار الطفل على الذهاب إلى المدرسة، فما هي العلامات السلوكية
التي تظهر عليه؟ اذكرها:



الملاحم

- (44) إذا تمت الموافقة على طلبه بعدم الذهاب إلى المدرسة، فهل تزول الأعراض التي
كان يشكو منها؟نعم / لا
- (45) هل حدث وأن اشتكي الطفل من أمراض معينة قبل الذهاب إلى المدرسة، وتبين
بعد الفحص الطبي أنه خال من الأمراض العضوية؟نعم / لا
- (46) هل يتسم سلوك الطفل في أوقات خارج الدوام المدرسي بـ:
- (47) العناد، طيب المعاشر، مطبع، مكتتب، متواكل، سليمي، عدواني
- (48) هل يستطيع الطفل السير بجانب سور المدرسة في أيام الإجازات والعلطل دون أن
يشعر بالخوف؟نعم / لا
- (49) هل حدث وطلبتي منه، أو طلب منه أحد أفراد الأسرة المرتبط بهم أو المتعلق بهم
البقاء في البيت بدلاً من الذهاب إلى المدرسة؟نعم / لا
- (50) هل حدث وأن غير الطفل مدرسته أو صفته قبل ظهور أعراض رفض المدرسة؟نعم / لا
- (51) هل جاء الطفل يشكو من أنه يخاف من بعض المدرسین في المدرسة؟نعم / لا
- (52) هل جاء الطفل يشكو إليك من أنه يخاف من بعض الأطفال في المدرسة؟نعم / لا
- (53) ما هي المواد الدراسية التي يحبها الطفل؟نعم / لا
- (54) ما هي المواد الدراسية التي يكرهها في المدرسة؟نعم / لا
- (55) هل يعاني الطفل من صعوبات في الدراسة؟نعم / لا
- (56) هل ينام الطفل نوماً عميقاً ومريحاً؟نعم / لا
- (57) هل حدث وأن صحي من نومه وهو مفزع بسبب حلم مرعبه؟نعم / لا
- (58) حدثتني عن المناخ الأسري الذي يعيش فيه الطفل؟نعم / لا
- (59) هل توجد صراعات وخلافات بينك وبين والدك داخل المنزل، ويكون الطفل
ملاحظ لها؟نعم / لا
- (60) كيف يمكن وصف علاقة الطفل بك؟نعم / لا
- (61) كيف علاقته بأخته؟نعم / لا


- (62) كيف يمكن وصف علاقته بأقرانه خارج المدرسة؟
(63) هل يخاف من أشياء معينة غير مسألة رفض المدرسة؟ نعم / لا
(64) هل أحد من أخوته سلك هذا السلوك في السابق؟ نعم / لا
(65) هل يوجد أحد في الأسرة يعاني من أمراض معينة (مزمنة)؟ نعم / لا

إذا كانت الإجابة بنعم، فهل هذا الشخص متصل به الطفل بشكل واضح؟

نعم لا

- (66) كيف ينظر الطفل إلى نفسه؟
(67) كيف ينظر إلى براييك؟
(68) كيف ينظر إلى والده؟
(69) كيف ينظر إلى أخوته؟

- (70) كيف ينظر إلى مدرسته، أستاذته، رفاقه؟
(71) ما هي المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الطفل براييك؟
(72) من المسئول عن سلوك رفض الطفل للمدرسة براييك؟
(73) ما هي الحلول المقترحة التي قدمتها الأسرة للطفل للتخلص من هذه المشكلة؟
- (74) كيف كان تجاوب الطفل مع هذه الحلول؟
(75) هل توقعات خوف الطفل حقيقة؟ وما الأسباب؟



الملاحت

.....(76) ما هو رأي المدرسة في هذه المشكلة؟

ملاحظات أخرى:

.....

.....



ملحق (4)

مقياس الخوف المرضي من المدرسة

بيانات التلميذ:

الاسم: العمر: الجنس:

اسم المدرسة: الصنف (الفصل) الدراسى:

اسم الأب: عمله: مستوى التعليمى:

اسم الأم: عملها: مستواها التعليمى:

عدد الأخوة: ترتيبه: منطقة السكن: ريف / مدينة

تاریخ اجراء الاختبار: / / الدرجة الكلية:

التعليمات:

في الصفحات التالية مجموعة من العبارات تتعلق بتكيفك داخل المدرسة وخارجها، والمطلوب منك ملئي:

أن تقرأ (قستمع إلى) كل عبارة من العبارات بشكل جيد، ثم تجيب عن كل عبارة بصراحة، دون خوف أو خجل.



الملاحم

وأمام كل عبارة ثلاثة إجابات يمكن أن تتطابق إحداها عليك:

- إذا كانت العبارة تتطابق عليك بدرجة كبيرة، ضع علامة (/) تحت الخانة **كثيراً**.
- وإذا كانت العبارة تتطابق عليك بدرجة متوسطة، ضع علامة (/) تحت الخانة **حياناً**.
- أما إذا كانت العبارة تتطابق عليك بدرجة قليلة، فضع علامة (/) تحت الخانة **نادراً**.

هذه العبارات ليست امتحاناً لك، ولذلك لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

- لا تضع أكثر من علامة (/) أمام كل عبارة.
- لا تترك أي عبارة دون أن تحدد موقفك منها.

ملاحظة: يمكن الرجوع للمؤلف للحصول على بيانات المقاييس وطرق تفريغ وتفسير العبارات.

نادراً	حياناً	كثيراً	العبارات	م
			بخاف أسأل المعلم أي سؤال في الصف.	1
			بخاف أغلط في الإجابة عندما يسألني المعلم في الصف.	2
			الضائق جداً لما العطلة تنتهي.	3
			في الصف هناك أولاد بيجاووا بغلط وغير خايفين، ولكن لا استطيع أعمل مثلهم.	4
			يخاف من مدير المدرسة لما يكلمني.	5
			يخاف من الامتحان حتى ولو سكتت مستعداً له.	6
			يضايقني كثيراً بعض الأولاد الأكبر مني في المدرسة.	7
			يسخر مني الأولاد عندما لا استطيع الإجابة عن سؤال بشكل صحيح.	8
			يخاف أتكلم مع أي حد من الأولاد في المدرسة.	9

م	العبارات	كثيراً	أحياناً	نادراً
10	يخاف من الرسوب في نهاية العام الدراسي.			
11	يخاف من والدي لما أخذ درجة سيئة في الامتحان.			
12	يابق متضايق طول ما أنا موجود في المدرسة.			
13	اتضايق كثيراً لما أقرأ الدرس أمام الأولاد في الصيف.			
14	اتعجب العلم لما ينكرون في الباحة			
15	لما يكون عارف الإجابة عن السؤال اللي طرحة العلم بخاف ارفع أصبعي			
16	يخاف من المدير أو العلم لما أذهب إلى المدرسة متأخر.			
17	اتضايق كثيراً لما يهزاوني العلم أمام الأولاد.			
18	أشعر أن الأولاد في المدرسة لا يحبونني.			
19	يخاف كثيراً للعب مع الأولاد أحسن ما يضر رونى			
20	بشكير كثير ببابا او ماما لما يكون في المدرسة.			
21	دعب بكل يوم الصبح يطلع بسرعة علشان أروح المدرسة.			
22	يشرد بكثير طول ما أنا موجود في المدرسة.			
23	بشعر بالخوف الشديد، وأنا رايح المدرسة يحصلني أمر سيء.			
24	في المدرسة دعب أبينى نوحدي.			
25	تكون صحتي جيدة تكل يوم الصبح أروح المدرسة.			
26	أحياناً يقول للمعلم أني تعبان واريد أرجع البيت مع أني يكون غير تعبان.			
27	يزول الألم الذي كنت أصاني منه لما أرجع البيت.			
28	أشعر بالضيق لما كل يوم أروح المدرسة.			
29	أيام المدرسة بتكون شهيتى للطعام سينية.			
30	بخاف أصلع اللوح (السيورة) لما يطلب مني المعلم			
31	يخاف من المعلمين الجديد اللي بيدخلوا المدرسة لأول مرة.			
32	لا أحب الذهاب إلى المدرسة.			
33	بخاف من الأولاد الأكبر مني.			
34	بخاف من المعلم لما أنسى الواجب المنزلي في البيت.			
35	قلبي بيدق بسرعة لما يقرب دوري في التسميع.			

الملاحم

نادرًا	أحياناً	كثيراً	العبارات	م
			يحس برعشة لما أشاهد في التلفزيون أولاد في المدرسة.	36
			أشعر بالنشاط كل يوم أذهب فيه إلى المدرسة.	37
			لما يأتي أحد والدي إلى المدرسة أشعر برغبة بعدم تركه.	38
			كل ما أحياول مكتابة الواجد المنزلي أحس بالصداع الشديد.	39
			أحس أني غير سعيد مثل بقية الأولاد في المدرسة.	40
			لا أحب أن أذهب في الرحلات التي يتعلّمها المدرسة.	41
			انتصاري جداً لما يسألني أحد الوالدين عملت أيمه في المدرسة اليوم.	42
			أحس برعشة في جسمي كل ما أقرب من صفي.	43
			أحياناً أذهب التمارض حتى لا أذهب إلى المدرسة.	44





MOHAMED KHATAB

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- (1) احمد عبد الخالق (1994): الدراسة التطورية للقلق. جواليات كلية الآداب. الحوئية الرابعة عشرة، الرسالة المسعون، جامعة الكويت. الكويت.
- (2) احمد عكاشه (1992): الطب النفسي المعاصر. القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية.
- (3) أندره لو شال (1988): القلق والاحصر. ترجمة: وجيه اسعد. دمشق. وزارة الثقافة
- (4) أوتوفينخل (1969): نظريات التحليل النفسي في العصاب. الجزء الأول. ترجمة صلاح مخيم وعبد ميخائيل رزق. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية
- (5) أوتوفينخل (1969): نظريات التحليل النفسي في العصاب. الجزء الثاني. ترجمة صلاح مخيم وعبد ميخائيل رزق. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية.
- (6) آنا فرويد (1974): الآنا وميكانيزمات الدفاع. ترجمة: صلاح مخيم وعبد ميخائيل رزق. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية.
- (7) إيزنكي (1969) الحقائق والوهم في علم النفس. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- (8) باترسون (1981): نظريات الإرشاد والعلاج النفسي. الجزء الأول. ترجمة حامد الفقي. الكويت. دار القلم.
- (9) ب ب وولان (1985): مخاوف الأطفال. ترجمة: محمد عبد الظاهر الطيب. الإسكندرية. دار المطبوعات الجديدة.
- (10) ج ماكبيرد (1960): الخوف. ترجمة: سيد محمد غنيم. القاهرة. دار الفكر العربي
- (11) جون بولبي (1991): سيكولوجية الانفصال. ترجمة: عبد الهادي عبد الرحمن. بيروت دار الشروق.
- (12) جاسم الكتيري، راشد سهل (1992): الخوف المدرسي، رسالة الخليج العربي. العدد (40). الرياض. السعودية


- (13) حامد عبد السلام زهران (1977): التوجيه والإرشاد النفسي. طبقة ثانية. القاهرة. عالم الكتب.
- (14) (1975): علم نفس النمو الطفولة والراهقة. الطبقة الثالثة. القاهرة. عالم الكتب.
- (15) (1978): الصحة النفسية والعلاج النفسي. القاهرة. عالم الكتب
- (16) حسام الدين عزب (1982): العلاج السلوكي الحديث - تعديل السلوك. طبعة ثانية. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية.
- (17) دافيد شيهان (1988): مرض القلق. ترجمة: عزت شعلان. مجلة عالم المعرفة. العدد(124)، نisan. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت.
- (18) ديفيد مارتن (1973): العلاج السلوكي والظاهرياتي. ترجمة: صلاح مخيم. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية
- (19) رياض العاصمي (1998): أثر العلاج النفسي المصاحب للتغذية المرتدة في خفض حدة اضطراب القلق العام لدى المترددين على العيادة النفسية. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربوية.
- (20) (1995): دراسة كلينيكية للبنية النفسية للأطفال الذين يعانون الفوبيا المدرسية في المرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية.
- (21) (2001): عالم النفس المرضى؛ دمشق. مطبوعات الإدارة السياسية.
- (22) مخاوف الأطفال. دراسة تطورية (2002) قيد النشر.
- (23) ويشارد سوين (1979): علم الأمراض النفسية والعقلية. ترجمة: احمد عبد العزيز سلامه القاهرة. دار النهضة العربية.
- (24) سامية قطان (1980): كيف تقوم بالدراسة الإكلينيكية. الجزء الأول. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية.

المراجع

- (25) (1982)، الأمراض النفسية والعقلية في المعاجم والموسوعات النفسية القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية.
- (26) سيموند فرويد (1989)، الكف والعرض والقلق. ترجمة: محمد عثمان. الطبعة الرابعة القاهرة. دار الشرق.
- (27) سير جون انجلش، صير الدببرسون (1958)، مشكلات الحياة الانفعالية. ترجمة: هاروق عبد السلام وأخرون. القاهرة. دار الثقافة.
- (28) شيفرومليمان وشاركز هوارد (1989)، مشكلات الأطفال والراهقين وأساليب المساعدة فيها. ترجمة تسنيمة داود، نزيه حمدي. عمان (الأردن). مطبعة الاتحاد.
- (29) عبد العزيز القوصي (1975)، الصحة النفسية. الطبعة الخامسة. القاهرة. مطبعة السعادة.
- (30) عباس محمود عوض، مدحت عبد الحميد (1990)، الخوف المرضي من المدرسة - دراسة عاملية، مجلة علم النفس، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة ص(42 - 63) القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- (31) عباس محمود عوض (1990)، قلق الانفصال لدى الأطفال. دراسة عاملية، في بحوث المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مصر، الجزء الأول، ص: (97 - 107). القاهرة الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
- (32) عبد الرحمن عيسوي (1992)، أمراض العصر للأمراض النفسية والعقلية. الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية.
- (33) عبد الرحمن عيسوي (1990)، علم النفس الطبي. الإسكندرية. منشأة المعارف.
- (34) عزيز حنا داود وآخرون (1991)، الشخصية بين السواء والمرض. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية.
- (35) عبد الرحمن سيد سليمان (1988)، دراسة مقارنة لأثر اسلوبي التحصين التدريجي واللعب غير الموجه في تناول المخاوف المرضية من المدرسة لدى أطفال المرحلة الابتدائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية.


- (36) (1994): الخوف المرضي من المدرسة في ضوء نظرية
قلق الانفصال رؤية تحليلية نقديّة، مجلة الإرشاد النفسي، العدد: الثالث،
السنة الرابعة ص: (89 - 57) مركز الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس،
كلية التربية.
- (37) (1996): الفئيات العلاجية السلوكية للمخاوف
المرضية من المدرسة (عرض وتقديم)، مجلة علم النفس، العدد: السادس و
الثلاثون، السنة العاشرة، ص (162 - 140)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة
للكتاب.
- (38) عبد المنعم الحفني (1995): الموسوعة النفسية. القاهرة، مكتبة مدبولي
- (39) عبد الستار إبراهيم وأخرون (1993): العلاج السلوكي للطفل، أساليبه
ومنماجه من حالاته، عالم المعرفة العدد (1980) المجلس الوطني للثقافة و
الفنون والآداب. الكويت
- (40) عبد الحميد عبد الرحيم (1965): مبادئ علم النفس التربوي، القاهرة مكتبة
النهضة المصرية
- (41) هاروق أبو عوف (1982): رهاب المدرسة . العوامل المؤدية لظهور وأساليب علاج
للشخص منه. القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.
- (42) فايز قنطرار (1994): الأمومة -نمو العلاقة بين الطفل والأم، عالم المعرفة،
العدد (166)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت.
- (43) لويس سكامل ملكية (1992): علم النفس الإكلينيكي. التشخيص والتنبؤ في
الطريقة الإكلينيكية الجزء الأول، طبقة خامسة، القاهرة، الهيئة المصرية
العامة للكتاب.
- (44) محمد شعلان (1979): الأضطرابات النفسية في الأطفال. الجزء الثاني،
الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية. القاهرة.
- (45) محمد عبد الظاهر الطليب وأخرون (1982): التعلم في التعليم الأساسي.
سلسلة علم النفس المعاصر -أبناؤنا وبناتنا. الجزء الثالث، الإسكندرية، منشأة
المعارف.

- (46) محمد قاسم عبد الله (2001): الصحة النفسية للطفل.
- (47) مالك سليمان مخول (1997): الطفولة والراهقة. منشورات جامعة دمشق.
- (48) ميخائيل يوسف أسعد (1986): علم الاختurbات السلوكية والنفسية. دمشق. مكتبة التوري.
- (49) ممدوحة سلامة (1987): مخاوف الأطفال وإدراكيهم للقبول / الرفض الوالدي، مجلة علم النفس، العدد الثاني، ص (54 - 6)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- (50) محمد شيخ حمود (1993): الإرشاد النفسي المدرسي. دمشق. جامعة دمشق.
- (51) نعيم الرفاعي (1982): الصحة النفسية دراسة في التكيف البشري. دمشق. جامعة دمشق.
- (52) (1982): العيادة النفسية - الاتجاهات المعالجة النفسية. الجزء الثاني. دمشق. جامعة دمشق.
- (53) نيفن زبور (1990) دراسة في سيكوديناميات المخاوف لدى عينة من الأطفال، مجلة علم النفس العدد (16)، ص (22 - 37) السنة الرابعة. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- (54) هيلين روس (1961) مخاوف الأطفال. ترجمة السيد محمد خيري، طبقة ثلاثة القاهرة مكتبة النهضة المصرية.
- (55) هجوبي وأخرون (1998) : الأطفال المشكلون. ترجمة: عدنان الأحمد و تاج السر عبد الله الشيخ - دمشق - دار مشرق - مغرب.
- (56) وليم الخولي (1977) : الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي. مصر. دار المعارف.
- (57) يوسف عبد الفتاح (1993) : مخاوف الأطفال ومفهوم الذات لديهم . دراسة مقارنة مجلة علم النفس، العدد (21) ص (72.62) السنة السادسة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.



- 1) Andrew R. Brulle, Thomas c Mcin Tyre and julia s Mills (1985): School Phobia: its education implications, journal Elementary school guidance And counseling, Vol (20), Iss 1 pp. 19 – 28, (oct).
- 2) Balter lawrence (1995): Understanding kids Ladies, Home Journal, Vol (102), p. 114, (oct).
- 3) Berger I, etal (1969): School phobia: its classification and Relationship To Dependency, J, of child psychology and psychiatry, vol, (1.), pp. 61
- 4) Berg, I, etal(1992): Abcence from school and mental healht. british journal of psychiatry, vol (161) pp. 154 – 166
- 5) Blagg, N (1987): School Phobia and its treatment. croom helm, With Methuer in c, london.
- 6) Bernstein A. Gail And carriem Bor Chorolt (1992): Anxiety Disorders of child hood and Adolescee agritical Review Brunner Mazedel, Ln c Newyork.
- 7) Bernstein A Gail And Gar finkel, D. (1988) Pedigrees functioning and psychopathology in Families Of School Phobia
- 8) children American Journal psychiatry vol (145) pp. 7.
- 9) broadwin, b. (1932) A contribution to the study of truancy. orthopsychiatry, vol(2), pp. 253-259.
- 10) Chazan, M. (1962): Schoolphobia, britishjournal of educational psychology, vol (32), pp. 2. 9 – 217.
- 11) Chapel, J. (1967): Treatment of a case of school phobia by reciprocal inhibition psychiatric, association journal, vol (12) pp. 25 – 28

- 12) Colette, J and Gerald Young (ed) (199.): Children Rejetschool Views From Seven countries yaleuniversity press New haven And london.
- 13) Coober, m. g (1966a): School refusal: education reseach, vol (8), No(2), pp. 223 – 229.
- 14) Claelr broun (1986): Introductory psychology c. B. C. – Collage, P. 8. .
- 15) Davidson C Gerahd Etal johrm Neale (1982): Abnormal Psychology an Experimental Clinical approach johon wiley and sons New York.
- 16) Davidson, C. (196.): School Phobia as a manifestation of Family DisturbancE: its structure treatment, Journal of Child psychology and Psychiatry, vol (1-4), pp. 27. -287.
- 17) Davy, b (1960): The sources and prevention of mental, iii -healht in university s tudent. proc. roy. soc. med. 53(9) p. 26
- 18) Eysenck, H. J (196.): Behavior Therapy and the Neuroses Pergamon press, Newyork.
- 19) Francis g Last, G, Cynthia, Gretafrqncis &Michelhersen (1987): Separation anxiety And School Phobia: Comparison using D. S. M-111
- 20) GarVey, W. P & Hegernes, J. r (1966): Desensitisation Techniques in the treatment of School Phobia. American Journal of orthopsychiatry. Vol, (36), pp. 147- 152)
- 21) Geat A Raie (1979): school refusal, Educational Research,8, 2. PP. 115-127.
- 22) Hampe edwintelligence Aard, etal (1973): A School Phobia. journal of school psychology, vol, (11-1), pp. 66 – 7



- 23) Hisa, H (1984) Structural & strategic approach to school phobia refusal, psychology in school, vol (21) pp, 36. -367
- 24) Jack, H. Kahn and Jean, P. Nursten (1962): School Refusal: A comprehensive View of School Phobia and other failures of School Attendance. American, J, of orthopsychiatry, vol (32) pp. 707 – 715.
- 25) Johnson, D. Adelaide (1941): School phobia, American Journal orthopsychiatry. Vol (11-3), pp. 702 – 711.
- 26) James, Cocklee, L (1992):
- 27) Kelly, E, W (1973): School phobia, A review Of theory and treatment psychology in the Schools, Vol (15), pp. 33 – 42
- 28) Kennedy, W. A (1987): Over coming fear of School. U. S, news and world report, vol (103), p. 81 (sept).
- 29) Levental, T, & Sills, M. (1964): Self-image in school phobia, american journal orthopsychiatry, 34, 4, pp. 658-659.
- 30) Leo Kanne, R, et al (196.) Child psychiatry third – Edition Secand Printing, charles cthomus publisher, u. S. A. pp. 712 – 715.
- 31) Lentz kentz (1985): Fears and worries Of young children, as expressed in a Contextual Play setting, journal of child psychology- psychiatry, pp. 981 – 987.
- 32) Last, G, Cynthia, gretarqncis & Michelhersen (1987): Separation anxiety And School Phobia: comparison using d. s. m-111 criteria, American Journal psychology, vol (144) No (5) pp. 653 – 657.
- 33) Lall, G Ranie & Lall, M. Bernard (1979): School phobia: its Real And growing, journal in structar, vol(89), No (2), pp. 96 – 98, (Sept).
- 34) Martin Borclay(1981): Abnormal Psychology london.

- 35) Martin Herbert (1978): conduct Disorders Of child hood and adolescence, jahn wiley and sons, Newyork.
- 36) May, R. Jerry(1977): Behavior Therapy, Reno, Vol (8), n (2), pp. 15. – 159.
- 37) Marks, J. (1988): We have a problem, J, of Parents, vol (112) pp. 86-87, (sept).
- 38) Nessel raod, J. Stronider (1984): School refusel in young children, j, of, education international, june, u. s. west virginia.
- 39) Noel K free, et, al (1993): Separation arxiety I n panic disorder, American Journal psychiatry, vol (15.), N(4), pp. 595 – 6. 5. (Apr).
- 40) Rosenberg, J. (1993): When kids Say no to School. Good House keeping. Vol (216), p. 118.
- 41) Talbot M. (1957): school phobia, panic in school phobia, AmeRican Journal of Orthopsychiatry, Vol (27) pp. 286 – 295.
- 42) Segal.J. (1986): Whenour Child fears school, parents, vol(61), p. 152(veb). 99
- 43) Steven .C. Richardsandlawrence .J. Siegel(1978): Behavioral treatment Of Anxiety States and Avoidance behaviorsim Children .Gardener, Press. inc. New York.
- 44) Sigman.B. Scott (1991): Theory and Its Application: A school phobia, New – Jerseey.
- 45) Sherman J and et, al (1985): School Phobia in amulti phobic family, child hood &Adolescent, Social Work journal, vol (2.), pp. 114 –124.
- 46) Sarason, I, g &Sarasonmb, r (198.)Abnormal psychology(3ed)newjersy. prentice-hall, inc

- 47) Tyerman, J Maurice (1969): Truancy. UnivErsity of london press, ltd.
- 48) Wold Fogel, Samuel John coolige and pauline, b. Hahn (1957): The Development meaqnag and management of School Phobia, American Journal of orthopsychiatry, vol (27), pp. 754 – 78.. .
- 49) Wold fogel Samuel, Ellen Tessman and paUlin b Hahn (1959): A program for early in tervention in school phobia, a merican jourral of orthopsychiatry, vol (29), No (2), pp 324 –332, (Apr).
- 50) Wolfe B (1984): Gender Imperative separation Anxiety And agoraphphobia in Wowen Integrative psychiatRy, vol (2). No (2) pp. 57-61.
- 51) Yates, J. (1975): Behavior Therapy, Wiley, New York.
- 52) Yule, hersov, I, &treseder, j. (1980): Behavioural treatments of school refusal. john wiley.
- 53) Yule, W, &Blagg, N (1994): School Phobia. international handbook in children And adolescents, edited by thomas, h. New York. pp. 169 – 179.



MOHAMAD KHATAB




MOHAMED KHATAB



MOHAMED KHATAB



MOHAMED KHATAB



لنشر والتوزيع



MOHAMAD KHATAB



النشر والتوزيع



MOHAMAD KHATAB

سيكولوجية الطفل الرافض للمدرسة



Bibliotheca Aesculapii



1241896



9 789957 586379



الإن - عمل - وسط البلد - شارع الملك حسين - مجمع المجمع التجاري
هاتف : +96264646470 ، فاكس : +96264646208

الإن - عمّان - مخرج المطار - صارع الكبساوية - مقابل كلية الفيصل
هاتف : +96265713906 ، فاكس : +96265713907
جوال : 00962-797896091

info@al-esar.com - www.al-esar.com

دار الاعصار العلمي